


Kapiele porównowe w domu



Jedyny sposób do zaspokojenia

inwazyjnych porównawczych kapieł

Wszystkie

W domu i w każdej porze roku

Wszystkie

Wszystkie

Wszystkie

Wszystkie

Wszystkie

Wszystkie

HENRYK MATTONI

Pracownia, Książka

Wszystkie

Praca (30 str.) zawiera 4 rozprawy po 1 ml.

Wszystkie

Kąpiele borowinowe w domu.

MATTONIEGO
WYCIĄGI BOROWINOWE
SÓL BOROWINOWA.
ŁUG BOROWINOWY.

Jedyny sposób do zastąpienia
mineralnych borowinowych kąpeli

łatwo i dogodnie

w domu i w każdej porze roku.

Mattoniego sól borowa
(suchy wyciąg)
w paczkach po 1 kilo.

Mattoniego ług borowinowy
(płynny wyciąg)
we flaszkach po 1 kilo.

HENRYK MATTONI

Francensbad, Karlsbad,

WIEDEŃ, Tuchlauben, Mattonihof, BUDAPESZT.

Paczka (30 kr. Porto) zawiera 4 skrzyneczki po 1 kil.
soli borowinowej.

MATTONI's

GISSHÜBLER

reinsten
alkalischer

SAUERBRUNN

Zdrowisko uznane od wieków jako skuteczne w chorobach **dróg oddechowych i przewodu pokarmowego**, w **dnie, nieżyt żołądka i pęcherza**. Nadaje się szczególnie dla dzieci, rekonwalescentów i pośród ciąży.

HENRYK MATTONI

Giesshübl-Puchstein

koło Karlsbadu (w Czechach)

Wiedeń, Francensbad, Budapeszt.

Mattoniego zakład zdrojowo-kąpielowy

Giesshübl-Puchstein

koło Karlsbadu w Czechach.

**Źródło pierwotne Mattoniego szczawy
Giesshübelskiej.**

Leczenie pneumatyczne i zapomocą wlewań.

Dla chorób nerwowych i piersiowych, ozdrowieńców
w nieżytach i gośceniach i t. d.

Najstrawniejsza
ze wszystkich wód zawierających arsen i żelazo
Naturalna mineralna

Woda Gubera
zawierająca
żelazo i arsen
ze **Srebrenicy** w Bośni

Według analizy, którą przeprowadził c. k.
z. a. prof. chemii lekarskiej radca dworu
Dr Ernest Ludwig, zawiera owa mineralna
woda na 10.000 części:

bezwodnika kwasu arsenowego 0.061
siarkanu żelazawego 3.734

.....

Wyłączne prawo rozsyłki posiadają firmy:

HENRYK MATTONI

Francensbad, Wiedeń, Karlsbad, Budapeszt.

— ♦ ♦ ♦ —

Paczka (30 kr. Porto) zawiera 6 flaszek wody
źródła Gubera.

KALENDARZ LEKARSKI

KRAKOWSKI

NA ROK

1894.

Na wezwanie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego

ułożył

Dz Franciszek Murdzieński,

Lekarz ordynujący Szpitala ś. Ludwika.



W KRAKOWIE,

NAKŁADEM KSIĘGARNI S. A. KRZYŻANOWSKIEGO.

1894.

SPIS RZECZY.

Przedmowa.	Str.
Kalendarz kościelny.	
Spis środków lekarskich, zawartych w podręczniku terap.	I
Podręcznik terapeutyczny	1
Nowe leki	132
Ważniejsze kraj. i zagraniczne zakłady zdroj.-kąpielowe	150
Wybór najodpowiedniejszych zdrojowisk do leczenia po- szczególnych chorób	168
Kąpiele z dodatkiem środków lekarskich	179
Szkodliwe połączenia leków	180
Najwyższe dawki środków leczniczych	181
Waga różnych dawek ,	182
Porównanie wag aptekarskich	182
Dawki przeciętne dla dzieci	183
Porównanie dawki leków	184
Ile kropli liczy się na gram	185
Leczenie zapomocą wziewań	185
Dawki środków używanych do wziewań	186
Leczenie zapomocą wstrzykiwań podskórnych	187
Tablica brzemienności	189
Otrucia ostre i sposób ratowania w tychże	190
Ratowanie pozornie zmarłych	195
Warunki przyjmowania obłąkanych do zakładów publi- cznych lub prywatnych	197
Rozbiór moczu	199
Kilka uwag o świadectwach lekarskich	205
Świadectwo sądowo-lekarskie	207
O sądowych oględzinach i sekcjach zwłok	208
Naczelne władze sanitarne	211
Władze sanitarne w Galicyi	211
C. k. krajowa Rada zdrowia	212
Izby lekarskie	213
Służba zdrowia w Galicyi	215
Alfabetyczny spis lekarzy	230
Alfabetyczny spis chirurgów	236
Ogólne przepisy pocztowe	238
Poradnik telegraficzny	241
Skala stemplowa	242
Notatki (4 kwartalniki w osobnych książeczkach).	

42 8195

W KRAKOWIE,

W DRUKARNI „CZASU“ FR. KLUCZYCKIEGO I SPÓŁKI
pod zarządem Józefa Łakocińskiego.





PRZEDMOWA.

Ael niniejszego wydawnictwa został osiągnięty: Rozchodziło się bowiem o wyrugowanie zagranicznych kalendarzy z rąk Lekarzy Polskich. Dowodem tego zupełne wyczerpanie nakładu zeszłorocznego kalendarza.

Obecnie byłoby moją powinnością rozszerzyć ramy wydawnictwa, ku czemu, dzięki życzliwości Sz. Kolegów współpracowników, materyału niebrak. Na przeszkodzie stoją jednak zbyt wielkie koszta nakładu. Kalendarz może liczyć na pokup jedynie w granicach Galicyi. cenzura rossyjska bowiem przystępu do Królestwa Polskiego wzbronila. Jeżeli tego-roczny znaczniejszy nakład pokryje koszta, będę w stanie na rok przyszły poczynić znaczniejsze dodatki.

Nie wątpię, że wszystkim PP. Kolegom przyjemne obudzę wspomnienie, podając wizerunek **Dra Ludwika Teichmanna**, kawalera ces. austr. orderów Franciszka Józefa i żelaznej Korony III klasy, c. k. Radcy rządowego, Profesora p. z. Anatomii, b. Prosektora Uniwersytetu w Getyndze, Członka czynnego i b. Wiceprezesa Akademii Umiejętności w Krakowie, Czł. kor. Tow. lek. warsz., Dziekana Wydziału lekarskiego w r. s. 1872/3, Rektora Uniwersytetu Jag. w r. s. 1877/8.

Dr. Muczkowski.

Biblioteka Jagiellońska



Styczeń.

Janwar.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 P.	Nowy Rok. Almacha m.	20 Ihnattia jep. mucz.
2 W.	Makarego i Martyn.	21 Julianyi mucz.
3 S.	Daniela m. i Genowefy p.	22 Anastazyia mucz.
4 C.	Tytusa m. i Eugeniusza	23 Muczen. 10 w Kry.
5 P.	Emiliana p. i Telesfora	24 <i>Wigil. do Roźdest.</i>
6 S.	Trzech Króli	25 Roźdest. Chryst.
7 N.	1 po 3 Kr. Juliana i Luc. ☉	26 N. 1 po Roź. Sobor Pr. Bohor.
8 P.	Seweryna i Maksyma b.	27 Stefana mucz.
9 W.	Marcyanny panny m.	28 20 tysiacz. Muczen.
10 S.	Wilhelma b. i Jana Dobr.	29 14 tysiacz. ubit. Mład.
11 C.	Higiniusza b. i Leone.	30 Anysyi prepod.
12 P.	Honoraty i Arkadyusza	31 Mełanyi Rymianki
13 S.	Hilarego b. i Gotfryda w.	1 Janwar. Obrez. Hospoda
14 N.	2 po 3 Kr. Imię Jezusa	2 N. 2 po Roź. Sylwestra papy
15 P.	Pawła 1 pust. i Maura ☾	3 Małachia proroka
16 W.	Marcellego p. i Ottona w.	4 Sobor 70 apost.
17 S.	Antoniego op. wyzn.	5 <i>Wig. do Bohojawlenia</i>
18 C.	Kat. ś. Piotra w Rz.	6 Bohøjawlenie Hospod.
19 P.	Ferdynanda w. i Henryka	7 Sobor S. Joanna
20 S.	Fabiana i Sebastjana m.	8 Heorhia prepod.
21 N.	3 Staroz. Agnieszki p. ☽	9 N. 1 po B. Połyjewkta m.
22 P.	Wincentego i Anastaz.	10 Hryhoria jepisk.
23 W.	Zaślubienie N. Maryi P.	11 Fteodosya prepod.
24 S.	Tymoteusza bisk. m.	12 Tatyanny mucz.
25 C.	Nawrócenie św. Pawła	13 Jermyła mucz.
26 P.	Batyldy i Pauli wdowy	14 SS. Otec w Synai
27 S.	Jana Złotoustego b. w.	15 Pawła Ftyweysk.
28 N.	4 Mięsop. Karola W. ☾	16 N. 2 po B. Petra Weryhy
29 P.	Franciszka Sal. i Sabin.	17 Antonyia Welykaho
30 W.	Hiacynty i Martyny p. m.	18 Aftanasya i Kyryła
31 S.	Ludwiki-Albertonii wd.	19 Makarya prepod.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

5 — 27 Tekufah.

8 — 1 **Schebat.**

22 — 15 Dzień radości.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☉ dnia 7 g. 4 m. 7 rano.

☾ dnia 15 g. 1 m. 9 rano.

☽ dnia 21 g. 4 m. 11 popoł.

☾ dnia 28 g. 5 m. 50 popoł.

Luty.

Fewrał.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 C.	<i>Wigil.</i> Ignacego bisk.	20 Jeuftymya Welykaho
2 P.	Oczyszczenie N. Maryi P.	21 Maxyma prepod.
3 S.	Błażeja biskupa męcz.	22 Tymoftea apost.
4 N.	5 Zapustna. Weroniki p.	23 N. 3 po B. Kłymenta jep.
5 P.	Agaty panny męcz. ☉	24 Xenyi prepod.
6 W.	Doroty panny męcz.	25 Hryhorya bohosi.
7 S.	<i>Popielec.</i> Romualda op.	26 Xenofonta prepod.
8 C.	Jana z Mathy	27 Joanna Złatoust.
9 P.	Apolonii p. m. i Sabina	28 Jefrema prepod.
10 S.	Scholastyki i Sylwiana	29 Ihnatia jep. muez.
11 N.	1 Wstępna. Hipolita i Eufr.	30 N. 4 po B. Triech Swiatytel.
12 P.	Modesta m. i Eulalii p.	31 Kyra i Joanna muez.
13 W.	Juliana i Katarzyny R. ☉	1 Fewrał. Tryfona muez.
14 S.	<i>Such.</i> Walentego kapł.	2 Strytenye Hospod.
15 C.	Faustyna i Jowity mm.	3 Symeona bohopo.
16 P.	<i>Such.</i> Julianny panny m.	4 Isydora prepod.
17 S.	<i>Such.</i> Sabina b. i Sylwina	5 Ahaftyi muez.
18 N.	2 Sucha. Symeona i Konst.	6 N. 5 po B. Wukoła prepod.
19 P.	Konrada w. i Mansweta	7 Parftenya prepod.
20 W.	Leona p. i Zenobiusza ☿	8 Fteodora muez.
21 S.	Eleonory panny	9 Nykyfora muez.
22 C.	Katedry ś. Piotra w Ant.	10 Charalampia muez.
23 P.	Florentego i Piotra D.	11 Własya jep. muez.
24 S.	<i>Macieja apostoła</i>	12 Meletya archiep.
25 N.	3 Głucha. Wiktoryna m.	13 N. 6 po B. Martyniana pr.
26 P.	Aleksandra b. i Nestora	14 Auxentia prepod.
27 W.	Anastazyi i Fortunata ☾	15 Onysyma apost.
28 S.	Romana opata	16 Pamfyła muez.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

7 — 1 Adar.	20 — 14 Mały purim.
13 — 7 Śmierć Mojżesza.	

ODMIANY KSIEŻYCA.

☉ dnia 5 g. 10 m. 45 popoł.	☿ dnia 20 g. 3 m. 16 rano.
☾ dnia 13 g. 11 m. 43 rano.	☾ dnia 27 g. 1 m. 28 popoł.

Marzec.

Mart.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 C.	Albina b. i Antoniny	17 Fteodora mucz.
2 P.	Heleny ces. i Amalii	18 Lwa Papy Rymskaho
3 S.	Kunegundy c. i Tycyana	19 Archyppa apost.
4 N.	4 Srodop. Kazimierza kr.	20 Miasop. Lwa episk.
5 P.	Fryderyka opata	21 Tymoftea prepod.
6 W.	Kolety p. i Maryana b.	22 SS. MM. w Ewthen.
7 S.	Tomasza z Akwinu ☉	23 Polykarpa jep. mucz.
8 C.	Jana Bożego i Beaty	24 Obr. Gławy Joanna Kre.
9 P.	Franciszki Rzymianki	25 Tarasia archiep.
10 S.	40 Męczenników	26 Porfiryra archiep.
11 N.	5 Biała. Konstantego W.	27 Syrop. Prokopia archiep.
12 P.	Grzegorza Wielk. pap.	28 <i>Post Wiel.</i> Wasyliya pr.
13 W.	Krystyny panny	1 Mart. Jewdoki mucz.
14 S.	Zacharyasza i Matyldy ☾	2 Fteodota mucz.
15 C.	Izabelli i Leoncyi pp.	3 Jewtropia mucz.
16 P.	7 <i>Bol. NP.</i> Cyryka dyak.	4 Harasyrna prepod.
17 S.	Gertrudy i Patrycego b.	5 Konona mucz.
18 N.	6 Kwietnia. Aleksandra b.	6 1 Wstupna. SS. 42 muczen.
19 P.	<i>Józefa obłubieńca NMP.</i>	7 Wasyliya mucz.
20 W.	Eufemii i Teodozyi mm.	8 Fteofylaka mucz.
21 S.	Benedykta opata w. ☿	9 SS. 40 Muczennikow
22 C.	<i>Wiecz. Pańska</i> Katarzyny	10 Kondrata mucz.
23 P.	<i>Wielki.</i> Wiktoryana m.	11 Sofronia prepod.
24 S.	<i>Wielka.</i> Gabryela arch.	12 Fteofana prepod.
25 N.	Wielk. Zmartw. P. 262 m.	13 N. 2 Postu. Nikyfora patr.
26 P.	Wielkan. Teodora bisk.	14 Wenedykta prepod.
27 W.	Jana pusteln. i Ruperta	15 Ahapia mucz.
28 S.	Sykstusa pap. wyzn.	16 Sawyna mucz.
29 C.	Eustazego op. i Cyryla ☾	17 Alexia prepod.
30 P.	Kwiryna m. i Zozyrna	18 Kyryła archiep.
31 S.	<i>Wig.</i> Balbiny i Kornelii	19 Chrysanfta mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

9 — 1 Veadar.	22 — 14 Purim.
21 — 13 Post. Estery.	23 — 15 Schuschan-Purim.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☉ dnia 7 g. 3 m. 18 popoł.	☿ dnia 21 g. 3 m. 11 popoł.
☾ dnia 14 g. 7 m. 28 popoł.	☾ dnia 29 g. 9 m. 27 rano.

Kwiecień.

Apriel.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 N.	1 Przew. Hugona bisk.	20 N. 3 Postu. Pr. Otec. w Ob. S.
2 P.	Zwiastowanie N. Maryi P.	21 Jakowa prepod.
3 W.	Pankracego i Ryszarda	22 Wasylija jepiskopa
4 S.	Izydora bisk. wyzn.	23 Nykona prepod.
5 C.	Wincentego Ferer. w.	24 Zacharyi prepod.
6 P.	Celestyna papieża ☉	25 Ślchowszcze
7 S.	Epifaniusza męcz.	26 Sobor Hawryła
8 N.	2 po W. Grobu Jez. Dyoniz.	27 N. 4 Postu. Matrony muez.
9 P.	Maryi Kleofe, siostry NP.	28 Hariona predod.
10 W.	Ezechiela proroka	29 Marka prepod.
11 S.	Leona pap. wyzn.	30 Joanna Listwycz.
12 C.	Juliusza p. i Damiana	31 Ipatya jepisk.
13 P.	Justyna m. i Idy p. ☾	1 Apriel. Maryi Jehyp.
14 S.	Waleryana i Maksyma	2 Tyta prepod.
15 N.	3 po W. Opieki ś. Józefa	3 N. 5 Postu. Nykity prepod.
16 P.	Lamberta męcz.	4 Josyfa prepod.
17 W.	Rudolfa bisk. męcz.	5 Fteodula muez.
18 S.	Apoloniusza męcz.	6 Jewtychia jepisk.
19 C.	Jerzego b. i Antonii p.	7 Heorhia prepod.
20 P.	Agnieszki z Pol. ☽	8 Irodiona apost.
21 S.	Anzelma bisk. w.	9 Jewpsyhia jepisk.
22 N.	4 po W. Sotera i Kaja m.	10 N. 6 Postu. Terentia muez.
23 P.	<i>Wojciecha arcybiskupa</i>	11 Antypy jepiskopa
24 W.	Jerzego m. i Saby żołn.	12 Wasylija prepod.
25 S.	Marka ewangelisty	13 Artemona jepisk.
26 C.	Kleta i Marcelina mm.	14 Martyna papy.
27 P.	Anastazego p. i Teofila	15 Piatok wetyki. Arystarcha
28 S.	Witalisa m. i Waleryi ☾	16 Ahapii muez.
29 N.	5 po W. † Piotra męcz.	17 N. Woskresenye. Symeona p.
30 P.	† Katarzyny Sen. panny	18 Pon. swiaty. Joanna prep.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

7 — 1 Nisan. Tekufah.	24 — 18 } Półświęta.
20 — 14 Przeddzień do Paschy.	25 — 19 }
21 — 15 Święto Paschy.	26 — 20 }
22 — 16 Drugie św. Paschy.	27 — 21 Siódme święto.
23 — 17 Półświęta.	28 — 22 Koniec Paschy.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☉ dnia 6 g. 5 m. 0 rano.	☽ dnia 20 g. 4 m. 1 rano.
☾ dnia 13 g. 1 m. 32 rano.	☾ dnia 28 g. 4 m. 20 rano.

Maj.

Maj.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA BUSKIE.
1 W.	† <i>Filipa i Jakóba apost.</i>	19 Wt. swiaty. Joanna prep.
2 S.	† Zygmunta i Atanaz.	20 Fteodora prepod.
3 C.	Wniebowst. P. Znal. ś. Krz.	21 Januaria mucz.
4 P.	Floryana m. i Moniki	22 Fteodora Sykeota
5 S.	Gotarda b. i Piusa V. ☉	23 Heorhia mucz.
6 N.	6 po W. Jana w oleju m.	24 N. 1 po W. Sawwy mucz.
7 P.	Flawii i Domicelli pp.	25 Marka Apost.
8 W.	Stanisława bisk. Krak. m.	26 Wasyliya mucz.
9 S.	Grzegorza Naz. i Dyźmy	27 Symeona jep. mucz.
10 C.	Izydora włośc. i Joba	28 Jasona apost.
11 P.	Beatryksy panny	29 Dewiat muczennikow
12 S.	<i>Wigil.</i> Nereusza m. ☾	30 Jakowa proroka
13 N.	Zest. Ducha ś. NP. Łask.	1 Mai. N. 2 po W. Jeremia
14 P.	Świąteczny. Bonifacego	2 Aftanasya Welykaho
15 W.	Zofii i trzech jej córek	3 Tymoftea mucz.
16 S.	<i>Such.</i> Jana Nep. i Ubalda	4 Pełahyi mucz.
17 C.	Paschalisa w. i Torpeda	5 Iryny mucz.
18 P.	<i>Such.</i> Feliksa kapucyna	6 Jowa Prawednaho
19 S.	<i>Such.</i> Piotra Cel. pap. ☿	7 Wspom. Kresta
20 N.	1 po S. SSS. Trójcy. Bern.	8 N. 3 po W. Joanna Bohoś.
21 P.	Heleny królowej	9 Pren. M. Nykoł.
22 W.	Julii panny męcz.	10 Symona Apost.
23 S.	Dezyderyusza bisk. w.	11 Mokia mucz.
24 C.	Boże Ciało. Joanny wd.	12 Jepyfania jepisk.
25 P.	Urbana p. i Grzegorza	13 Hłykeryi mucz.
26 S.	Filipa Nereusza w.	14 Isydora mucz.
27 N.	2 po S. Jana pap. m. ☺	15 N. 4 po W. Pachomya Weł.
28 P.	Maryi-Magdaleny de Pa.	16 Fteodora prepod.
29 W.	Maksyma b.w. i Teodozyi	17 Andronika apost.
30 S.	Feliksa pap. w.	18 Fteodora prepod.
31 C.	Petronelli panny m.	19 Patrykia jepisk.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

7 — 1 **Ijar.** Post.
 10 — 4 Post.
 14 — 8 Post.

20 — 14 Passah-Scheni.
 24 — 18 Święto szkolne.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☉ dnia 5 g. 3 m. 41 popoł.
 ☾ dnia 12 g. 7 m. 21 rano.

☿ dnia 19 g. 5 m. 42 popoł.
 ☺ dnia 27 g. 9 m. 4 popoł.

Czerwiec.

Ijun.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.		ŚWIĘTA RUSKIE.
1 P.	<i>Serca Jez. Nikodema m.</i>	20	Ftałatea mucz.
2 S.	Eugeniusza i Erazma	21	Konstantyna i Jełeny
3 N.	3 po S. Klotyldy król. ☉	22	N. 5 po W. Wasylija mucz.
4 P.	Saturniny i Flawiana b.	23	Michała prepod.
5 W.	Florenceyi panny	24	Symeona prepod.
6 S.	Norberta op. i Klaudysza	25	Tretye Obritenyie Hła.
7 C.	Roberta bisk. i Sabiny	26	Wozn. Hosp. Karpa apost.
8 P.	Medarda bisk. wyzn.	27	Fteraponta jep.
9 S.	Felicyana męż.	28	Nykyty prepod.
10 N.	4 po S. Małgorzaty kr. ☾	29	N. 6 po W. Fteodosyi mucz.
11 P.	Barnaby apostoła	30	Isaaka prepod.
12 W.	Onufrego wyznawcy	31	Jermia apost.
13 S.	Antoniego z Padwy	1	Ijun. Justyna mucz.
14 C.	Bazylego W. bisk. w.	2	Nykyfora patr.
15 P.	Wita i Modesta mm.	3	Łukiłyana mucz.
16 S.	Justyny p. i Benona b.	4	Mytrofana patryarchy
17 N.	5 po S. Adolfa i Marcyana	5	N. Sosz. S. Ducha. Doroftea
18 P.	Marka i Marcelina mm. ☿	6	SSS. Trojcy. Wyssariona pr.
19 W.	Gerwazego i Protaz. m.	7	Fteodora jepisk.
20 S.	Reginy i Florentyny pp.	8	Fteodora mucz.
21 C.	Alojzego Gonzagi w.	9	Kyryła archiep.
22 P.	Paulina b. i Konsoreyi	10	Tymoftea jep. mucz.
23 S.	Agrypiny i Wandy pp.	11	Warftołomea apost.
24 N.	6 po S. Narodz. św. Jana	12	N. 1 po S. Onufrya prepod.
25 P.	Wilhelma w. i Łucyi p.	13	Akityny mucz.
26 W.	Jana i Pawła braci m. ☾	14	Jelyssea proroka
27 S.	Władysława króla w.	15	Amosa proroka
28 C.	<i>Wigilia.</i> Leona pap.	16	Tyło Chryst. Tychona prep.
29 P.	Piotra i Pawła apostołów	17	Manuła mucz.
30 S.	Emilii i Lucyny mm.	18	Leontia mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

5 — 1 **Sivan.**

9 — 5 Przeddz. Ziel. Świąt.

10 — 6 Zielone Świąto.

11 — 7 Drugie świąto.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☉ dnia 3 g. 11 m. 56 wiecz.

☾ dnia 10 g. 2 m. 14 popoł.

☿ dnia 18 g. 8 m. 6 rano.

☾ dnia 26 g. 11 m. 2 rano.

Lipiec.

Ijuł.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 N.	7 po S. Teobalda opata	19 N. 2 po S. <i>Post do Petra.</i> Judy
2 P.	<i>Nawiedz. NMP.</i> i Eugen.	20 Meftodia jepiskopa
3 W.	Alfreda i Anatolego b. ☉	21 Juiyana mucz.
4 S.	Józefa Kalas. i Prokopa	22 Jewsewya jep. mucz.
5 C.	Cyrylla i Metodego ap.	23 Ahrypiny mucz.
6 P.	Izajasza i Dominiki	24 Rożd. S. Joan. Kr. Sostr. Pr. B.
7 S.	Estery kr. i Klaudyusza	25 Fewronyi prepod.
8 N.	8 po S. Jana z Dukli	26 N. 3 po S. Dawyda prepod.
9 P.	Cyrylla b. i Anatolii ☾	27 Sampsona prepod.
10 W.	Amalii p. i 7 braci m.	28 Kyra i Joanna
11 S.	Pelagii, Sabina i Norb.	29 Petra i Pawła Apost.
12 C.	Jana Gwalb. i Epifany	30 SS. Apost. 12.
13 P.	Małgorzaty panny m.	1 Ijuł. Kosmy i Dam.
14 S.	Bouawentury doktora w.	2 Położ. Ryzy. Preś. Boh.
15 N.	9 po S. Rozesł. Apost.	3 N. 4 po S. Iakynfta mucz.
16 P.	<i>NP. Szkapł.</i> i Rajnolda m.	4 Andreia archiepisk.
17 W.	Aleksego w. i Berty p. ☽	5 Aftanasia Afron.
18 S.	Szymona z Lipnicy w.	6 Sysoa prepod.
19 C.	Wincentego a Paulo w.	7 Ftomy prepod.
20 P.	Czesława i Kassyana	8 Prokopya mucz.
21 S.	Daniela pror. i Praksedy	9 Pankratya jep. mucz.
22 N.	10 po S. Maryi - Magdal.	10 N. 5 po S. 45 Muczen.
23 P.	Teofila m. i Apolinarego	11 Jewfymyi mucz.
24 W.	Krystyny panny męcz.	12 Prokta mucz.
25 S.	<i>Jakóba ap.</i> i Krzyszt. ☾	13 Hawryła archan.
26 C.	<i>Anny Matki N. Maryi P.</i>	14 Akyły apost.
27 P.	Natalii i Liliozy pp.	15 Kyrka mucz.
28 S.	Innocentego i Wiktora	16 Aftynohema jepisk.
29 N.	11 po S. Kunegundy kr.	17 N. 6 po S. Maryny mucz.
30 P.	Julitty p. i Heleny wd.	18 Jemyłyana mucz.
31 W.	Ignacego Lojoli wyzn.	19 Makryny prepod.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

5 — 1 **Thamuz.**
7 — 3 Tekufah.

22 — 18 Post. Zdob. świątyni.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☉ dnia 3 g. 6 m. 45 rano.

☾ dnia 9 g. 11 m. 15 popoł.

☽ dnia 17 g. 11 m. 2 popoł.

☾ dnia 25 g. 10 m. 7 popoł.

Sierpień.

Awgust.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 S.	Piotra w Okowach m. ☉	20 Iży proroka
2 C.	N. Maryi P. Anielskiej	21 Symeona prepod.
3 P.	Znalez. ś. Szczepana	22 Maryi Mahdałyny
4 S.	Dominika wyzn.	23 Trofyma mucz.
5 N.	12 po S. NMP. Snieżnej	24 N. 7 po S. Chrystyny mucz.
6 P.	<i>Przemienie Pańskie</i>	25 Uspen. S. Anny
7 W.	Kajetana w. i Alberta	26 Jermołaja mucz.
8 S.	Cyryaka i Maryana m. ☾	27 Pantaleimona mucz.
9 C.	Kamilla z Lel. i Romana	28 Prochora apost.
10 P.	Wawrzyńca i Filomeny	29 Kałynyka mucz.
11 S.	Zuzanny panny m.	30 Syły apost.
12 N.	13 po S. Klary i Hilaryi	31 N. 8 po S. Zapust do Uspenya
13 P.	Hipolita m. i Kassyana	1 Awgust. Proischozd. kr.
14 W.	<i>Wigilia.</i> Euzebiusza m.	2 Stefana mucz.
15 S.	Wniebowzięcie N. M. P.	3 Isaaka prepod.
16 C.	Rocha wyznawcy ☿	4 Sedmy Otrokow
17 P.	Anastazego b. i Mirona	5 Jewsychnya mucz.
18 S.	Heleny Szwedzkiej kr.	6 Preobraz. Hospodyne
19 N.	14 po S. Jacka i Benigny	7 N. 9 po S. Demetya prepod.
20 P.	Bernarda op. i Samuela	8 Jemelyana jepisk.
21 W.	Joanny Fremiot wdowy	9 Matfya apost.
22 S.	Symforyana i Tymot.	10 Ławrentya mucz.
23 C.	Zacharyasza i Filipa B.	11 Jewpła mucz.
24 P.	<i>Barłomieja apostoła</i> ☾	12 Fotya mucz.
25 S.	Ludwika kr. francusk.	13 Maxyma prepod.
26 N.	15 po S. <i>Pociesz. NMP.</i>	14 N. 10 po S. Michea proroka
27 P.	Róż p. i Przen. ś. Kazim.	15 Uspenye Pr. Bohorodycy
28 W.	Augustyna biskupa	16 Nerukotworen. Obraz.
29 S.	Ścięcie ś. Jana i Sabina	17 Myrona mucz.
30 C.	Feliksa męcz. ☿	18 Flora i Ławra mucz.
31 P.	Rajmunda wyzn.	19 Andrea mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

3 — 1 **Ab.**

12 — 10 Post. Spalenie świąt.

17 — 15 Dzień radości.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☉ dnia 1 g. 1 m. 24 popoł.

☾ dnia 8 g. 11 m. 5 rano.

☿ dnia 16 g. 2 m. 17 popoł.

☾ dnia 24 g. 6 m. 39 rano.

☿ dnia 30 g. 9 m. 4 popoł.

Wrzesień.

Sentiabr.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.		ŚWIĘTA RUSKIE.
1 S.	Idziego opata wyzn.	20	Samuła proroka
2 N.	16 po S. Joach. Stefana k.	21	N. 11 po S. Ftaddea apost.
3 P.	Eufemii i Bronisławy	22	Ahaftonyka mucz.
4 W.	Rozalii panny	23	Łuppa mucz.
5 S.	Wawrzyńca i Urbana p.	24	Jewtychia mucz.
6 C.	Zacharyasza proroka	25	Warftołomea apost.
7 P.	<i>Wigilia.</i> Reginy p. m. ☾	26	Adryana m. i Natalii m.
8 S.	Narodzenie N. Maryi P.	27	Pimena prepod.
9 N.	17 po S. Im. NP. Gorgon.	28	N. 12 po S. Moysea muryna
10 P.	Mikołaja z Tolent. w.	29	Usikn. Gławy S. Joanna
11 W.	Prota, Jacka i Teodory	30	Alexandra patryiar.
12 S.	Tobiasza w. i Gwidona	31	Położ. Poiasz. P. Bohor.
13 C.	Aureliusza bisk.	1	Sentiabr. Symona S.
14 P.	<i>Podwyższenie ś. Krzyża</i>	2	Mamanta mucz.
15 S.	Nikodema m. i Emila ☿	3	Anfityma mucz.
16 N.	18 po S. Ludmiły męcz.	4	N. 13 po S. Wawyły Swiasz.
17 P.	Piętna św. Franciszka	5	Zacharyi proroka
18 W.	Józefa z Kopert. w.	6	Wosp. Cud. S. Mychajła
19 S.	<i>Such.</i> Januarego i Konst.	7	Zozonta mucz.
20 C.	Eustachego b. i Faustyna	8	Rozdestwo Pr. Bohorod.
21 P.	<i>Such.</i> Mateusza ap. ew.	9	Joakima i Anny
22 S.	<i>Such.</i> Maurycego b. ☉	10	Mynodory prepod.
23 N.	19 po S. Władysł. z Gieln.	11	N. 14 po S. Fteodory prep.
24 P.	Gerarda bisk. męcz.	12	Awtenoma mucz.
25 W.	Kleof. z Tow. i Aurel.	13	Kornyła mucz.
26 S.	Jozefata b. i Cypryana	14	Wozdwyżenye S. Kresta
27 C.	Przenies. ś. Stanisława	15	Nykity mucz.
28 P.	Wacława męcz.	15	Josafata archiep.
29 S.	<i>Michała archaniola</i> ☿	17	Sofii mucz.
30 N.	20 po S. Hieronima dra	18	N. 15 po S. Jewmenia prep.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

2 — 1 **Elul.**

30 — 29 Selichot. Przeddzień
Nowego Roku.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 7 g. 5 m. 3 rano.

☾ dnia 22 g. 1 m. 32 popoł.

☿ dnia 15 g. 5 m. 21 rano.

☿ dnia 29 g. 6 m. 44 rano.

Październik.

Oktiabr.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 P.	Remigiego biskupa w.	19 Trofyma mucz.
2 W.	<i>Aniołów Stróżów</i>	20 Jewstafya mucz.
3 S.	Kandyda m. i Lukrecyja p.	21 Kondrata apost.
4 C.	Franciszka Seraf. w.	22 Foky mucz.
5 P.	Flawii i Charytyny pp.	23 Zaczat. s. Joanna Krest.
6 S.	Brunona bisk. wyzn. ☾	24 Ftekly mucz.
7 N.	21 po S. NMP. Różańc.	25 N. 16 po S. Jewfrosini pr.
8 P.	Brygidy wd. i Pelagii	26 Joanna Bohosława.
9 W.	Dyonizego Ar. i Publii	27 Kałystrata mucz.
10 S.	Franciszka Borg. w.	28 Charytona prepod.
11 C.	Placydy i Filomelli pp.	29 Kyryaka prepod.
12 P.	Maksymiliana bisk.	30 Hryhorya jep. mucz.
13 S.	Edwarda króla wyzn.	1 Oktiabr. Pokr. P. Bohem.
14 N.	22 po S. Wincent. Kadł. ☿	2 N. 17 po S. Kypryana jep.
15 P.	Jadwigi, Teresy i Aurel.	3 Dyonyssa mucz.
16 W.	Pawła opata wyzn.	4 Jeroftea jepisk. mucz.
17 S.	Florentego i Małgorzaty	5 Charytyny mucz.
18 C.	Łukasza Ewangielisty	6 Ftomy apost.
19 P.	Piotra z Alkantary w.	7 Sergia i Wakha
20 S.	Przenies. ś. Wojciecha	8 Pełachii prepod.
21 N.	23 po S. Jana Kantego ☾	9 N. 18 po S. Jakowa apost.
22 P.	Korduli i Alodii pp. m.	10 Jewłampya mucz.
23 W.	Jana Kapistr. i Seweryna	11 Fyłypa apost.
24 S.	Rafała archaniola	12 Prowa mucz.
25 C.	Kryspina i Kryspiana	13 Karpa i Papyta
26 P.	Ewarysta pap. i Fulki	14 Nazarya mucz.
27 S.	Iwona w. i Sabiny m.	15 Jewftymya prepod.
28 N.	24 po S. Szym. i Tad. ap. ☿	16 N. 19 po S. Łonhyna mucz.
29 P.	Narcyza b. i Euzebij p.	17 Osy proroka
30 W.	Marcelego papieża	18 Łuki jew. apost.
31 S.	<i>Wigilia. Wolfganga b.</i>	19 Joiła proroka

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

1 — 1	Tischri. Nowy Rok	14 — 14	Przeddz. św. kuczek.
	5655.	15 — 15	Święto kuczek.
2 — 2	Drugie święto.	16 — 16	Drugie św. kuczek.
3 — 3	Post. Gedaljach.	21 — 21	Święto palmowe.
6 — 6	Tekufah.	22 — 22	Koniec kuczek.
9 — 9	Przeddzień św. pojed.	23 — 23	Radość z praw.
10 — 10	Święto pojednania.	31 — 1	Marcheschwan.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 6 g. 8 m. 1 popoł.	☾ dnia 21 g. 7 m. 55 popoł.
☿ dnia 14 g. 7 m. 40 popoł.	☿ dnia 28 g. 6 m. 57 popoł.

Listopad.

Nojabr.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.		ŚWIĘTA RUSKIE.
1 C.	Wszystkich Świętych	20	Artemia mucz.
2 P.	<i>Dzień Zaduszny.</i> Wiktor.	21	Hariona prepod.
3 S.	Huberta b. i Sylwii wd.	22	Awerkia jepisk.
4 N.	25 po S. Karola Borm.	23	N. 20 po S. Jakowa apost.
5 P.	Elżbiety Matki N. M. P. ☾	24	Arefty mucz.
6 W.	Leonarda wyzn.	25	Markiana mucz.
7 S.	Herkulana i Amaranta	26	Demetria mucz.
8 C.	Czterech Koronatów	27	Nestora mucz.
9 P.	Teodora żołn. i Ursyna	28	Terentia mucz.
10 S.	Andrzeja z Aw. i Nimfy	29	Anastasyi mucz.
11 N.	26 po S. Op. NP. Marcina	30	N. 21 po S. Zynowia mucz.
12 P.	Marcina papieża wyzn.	31	Stachya apost.
13 W.	Homobona i Dydaka ☿	1	Nojabr. Kosmy i Damian.
14 S.	Serafiona m. i Hipacego	2	Josafata Archiep. mucz.
15 C.	Leopolda wyzn.	3	Akepsymy mucz.
16 P.	Edmunda i Pawła	4	Joannyka prepod.
17 S.	Salomei król. panny	5	Hałaktyona mucz.
18 N.	27 po S. Stan. K. i Grzeg.	6	N. 22 po S. Pawła archiep.
19 P.	Elżbiety król. i Placydy	7	MM. 33 Melyty
20 W.	Feliksa de Valois w. ☼	8	Mychajła archan.
21 S.	<i>Ofiarowanie N. Maryi P.</i>	9	Onysyfora mucz.
22 C.	Cecylii panny męcz.	10	Szesty apostołów
23 P.	Klemensa i Lukrecyi	11	Myny mucz.
24 S.	Jana od Krzyża i Flory	12	Joanna myłostywa
25 N.	28 po S. Katarzyny p. m.	13	N. 23 po S. Joanna Złatoust.
26 P.	Piotra Aleks. i Kondrada	14	Fyłypa apost. <i>Zapust.</i>
27 W.	Waleryana bisk. m. ☿	15	Hurya i Samon mucz.
28 S.	Rufina m. i Grzegorza p.	16	Mattea jewanhel.
29 C.	Saturnina i Illuminaty	17	Hryhoria jepisk.
30 P.	<i>Andrzeja apost.</i>	18	Płatona mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

5 — 6	} Post.	29 — 1	Kislev.
8 — 9		30 — 2	Pocz. modl. o deszcz.
12 — 13			

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 5 g. 4 m. 15 popoł.	☾ dnia 20 g. 3 m. 8 rano.
☿ dnia 13 g. 8 m. 49 rano.	☿ dnia 27 g. 9 m. 54 rano.

Grudzień.

Dekabr.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.		ŚWIĘTA RUSKIE.
1 S.	Eligiusza b. i Natalii wd.	19	Awdyja proroka
2 N.	1 Adw. Chryzologa	20	N. 24 po S. Prokla i Hryhory
3 P.	Franciszka Ksaw. w.	21	Wchod. Pr. Bohorodycy
4 W.	Barbary panny męcz.	22	Fyłymona apost.
5 S.	<i>Post.</i> Sabby opata w. ☉	23	Amfyłochyja jepisk.
6 C.	<i>Mikołaja b.</i> i Leoncyi	24	Jekatyryny mucz.
7 P.	<i>Wigilia.</i> Ambrożego b.	25	Kłymenta papy
8 S.	Niepok. Pocz. N. Maryi P.	26	Ałypyja prepod.
9 N.	2 Adw. Leokadyi i Waler.	27	N. 1 Adwentu. Jakowa m.
10 P.	<i>N. Maryi P. Loretańskie</i>	28	Stefana mucz.
11 W.	Damazego papieża	29	Paramona mucz.
12 S.	<i>Post.</i> Aleksego i Pawła ☿	30	Andrea apost.
13 C.	Łucyi i Otylii p. m.	1	Dekabr. Nauma pror.
14 P.	<i>Post.</i> Nikazego i Spirid.	2	Awwakuma pror.
15 S.	Ireneusza męcz.	3	Sofonia pror.
16 N.	3 Adw. Euzebiusza b.	4	N. 2 Adwentu. Warwary m.
17 P.	Łazarza b. i Wiwinny	5	Sawwy Oswiaszcze.
18 W.	Ocz. płodu NP. i Olimpji	6	Nykołaja jepisk.
19 S.	<i>Such.</i> Faustyna męcz. ☉	7	Amwrosia jep. medyok.
20 C.	Teofila męcz.	8	Patapia prepod.
21 P.	<i>Such.</i> Tomasza apostoła	9	Zaczat. Bohoro.
22 S.	<i>Such.</i> Zenona męcz.	10	Myny Jermoh. mucz.
23 N.	4 Adw. Wiktoryi p. m.	11	N. 3 Adwentu. Danyła Stoł.
24 P.	<i>Wigilia.</i> Adama i Ewy	12	Spyridona jepisk.
25 W.	Boże Narodzenie	13	Ewstratia jepisk.
26 S.	Szczepana pierwszego m. ☉	14	Ftyrsa mucz.
27 C.	<i>Jana ewangelisty</i>	15	Jełewftesya jepisk.
28 P.	Młodzianków męcz.	16	Ahhea proroka
29 S.	Tomasza Kantuaryjsk.	17	Danyła proroka
30 N.	1 po Boż. N. Dawida kr.	18	N. 4 Adwentu. Sewastyana m.
31 P.	Sylwestra pap. i Melanii	19	Wonyfatya mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

18 — 20 Dzień próśby o deszcz.

12 — 24 Wzniesienie światła.

23 — 25 Pośw. świątyni.

28 — 1 **Tebeth.**

29 — 2 Koniec pośw. świąt.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 5 g. 1 m. 15 popoł.

☿ dnia 12 g. 8 m. 45 popoł.

☾ dnia 19 g. 12 m. 15 popoł.

☿ dnia 26 g. 3 m. 20 rano.

PHARMACIA ELEGANS.

LWÓW
1888

SREBRNY
medal zasługi.

KRAKÓW
1891

WIELKI
medal srebrny.

Chem. farm. laboratorium

„HYGEA“

Maryana Zahradnika

w Złoczowie.

Polecam nadal łaskawym względem P.T. pp.
Lekarzy perełki i kapsułki*) lecznicze
„Hygea“, uznane przez Tow. lek. krakowskie
za najlepsze i najtańsze.

Ceny stałe oznaczone.

Aby niewydawano wyrobów droższych wątpliwej jakości, proszę nie opuszczać przy zapisywaniu godła „Hygea“ lub firmy „Zahradnik“.

Do nabycia we wszystkich aptekach.

Skład główny dla Krakowa w aptece p. Sobierajskiego.

Cześć zysku na budowę Domu akademickiego.

Do zwiedzenia mego laboratorium zapraszam najuprzejm.

*) Perełki 0-15, 0-20, 0-25. Kapsułki 0-30; 0-50 twarde, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 elastyczne.

C E N Y

częściej używanych kapsulek i perełek „HYGEA“.

Za 100 sztuk w jednym lub w dwóch słoikach.

W słoikach o 20 ct. za słoik drożej.

Camph. monobr.	0.05	Ol. Amy.	0.15	1	zhr.	60	ct.
Guajacol. (Merck.)	0.05	Ol. Amy.					
v. Jecoris	0.10	v. 0.25		1	„	60	„
Guaj. (Mer)	0.10	Ol. Am. v. Jec.	0.20	2	„	20	„
Guajacol. (Merck.)	0.05	Natr. ar-					
senicos	0.001	Ol. Amy.	0.20	1	„	80	„
Guaj. (Merck.)	0.05	Morrh. Mer.)	0.20	2	„	60	„
Guajacol. (Merck.)	0.05	Morrhual					
0.20	Natr. arsen.	0.001		2	„	80	„
Ichtyolum ammon.	0.25	w słoiku		2	„	50	„
Kreosot. e b. f.	0.05	Bals. tolut.	0.20	1	„	30	„
„	„	0.10	„	0.20	1	„	50
„	„	0.05	„	0.20			
„	Natr. arsen.	0.001		1	„	60	„
„	„	0.05	Morrhual.	0.20	2	„	20
„	„	0.05	„	0.20			
„	Natr. arsen.	0.001		2	„	40	„
„	„	0.05	Ol. Amy. v. Je-				
cor	0.10	v. 0.25		1	„	20	„
Kreo. e b. f.	0.10	Ol. Am. v. Je-					
cor	0.10	v. 0.20		1	„	40	„
Morrhual (Merck.)	0.20			2	„	—	„
Myrtolum (Merck.)	0.15			2	„	50	„
Nitroglicerín	0.0005	v. 0.001	Ol.				
Amy.	0.15	w słoiku		2	„	—	„
Terpinol.	0.10	Ol. Amy.	0.10	1	„	60	„

Zwracam zarazem uwagę P. T. pp. Lekarzy na moje niezrównane kapsułki elastyczne z olejem rącznikowym i z tranem po 1, 2, 3 i 4 gramy, w oryginalnych osłonkach z papieru woskowanego.

KREOSOTUM CARBONICUM

(Heyden).

Za 100 sztuk w pudełku.

Dawki: po 0·10 2 zhr., po 0·20 2 zhr. 50 ct.,
po 0·30 3 zhr., po 0·50 4 zhr., po 1·00 elastyczne 7 zhr.

Także z **Natr. arsenicos.** 0·001 o 20 ct. drożej.

Kreos. carbon. 0·10 Morrhuol. 0·20 2 zhr 80 ct.

Kreos. carbon. et Ol. Jecoris w dowolnym stosunku, w dawkach po 1·0, 2·0, 3·0, 4·0.

Extr. Filicis mar. aeth. bis depur. po 0·5, 1·0, 1·5, 2·0,

Także w połączeniu z **Extr. Granati.** Oba wyściagi wysmienitej jakości.

SANTAL „HYGEA“

Aby wyprzeć drogie wyroby francuskie, wprowadzam pod powyższą nazwą perełki z Ol. Santali ostitnd po 0·2.

Słoik 60 perełek kosztuje 2 zhr. (francuzkich „Santal Midy“ 30 perełek po 0·15 2 zhr. 80 ct.).

Polecając łaskawym względem P. T. pp. Lekarzy perełki „Santal Hygea“ nadmieniam, iż nie podaje ani zastosowania ani też sposobu użycia.

Do każdego pudełka lub słoika dołączam świadectwo Towarzystwa lek. Krakowskiego.

Maryan Zahradnik.

Konc. Zakład fabr. wód min. sztucz.

K. RZĄCY i CHMURSKIEGO

W KRAKOWIE,
przyrządza pod kontrolą komisji przemysłowej
Towarzystwa lekarskiego

Wody sztuczne:

Selterska	flaszka	16 ct.
Bilińska	"	15 "
Gieshüblerska	"	10 "
Vichy, Grande-Grille i Celestins		
	flaszka duża	40 ct., mała 25 ct.

Wody lecznicze:

Bromowa mocn. i słabsza,	flaszka	28 i 20 ct.
Jodowa	"	20 "
Litowa	"	15 "
Żelazista (pyrofosforanowo-żelazista) mocn.		
	i słabsza, flaszka	25 i 22 ct.
Kwaśna sodowa moc. i słabsza,	flaszka	15 ct
Hygieniczna sodowa	"	10 "

Przy większych zamówieniach
przyrządza się i inne wody, tudzież Kumys
i limonadę magnezyową.

Skład win szampańskich
i Koniaku musującego.

SPIS ŚRODKÓW LEKARSKICH

ZAWARTYCH

W PODRĘCZNIKU TERAPEUTYCZNYM.

- Acidum agaric.* 1018.
— *arsenicos* 54.
— *benzoic.* 267, 269, 310, 311, 352, 602, 744, 816, 915, 1116.
— *bichloroaceticum* 363.
— *boricum* 272, 277, 279, 358, 372, 376, 380, 389, 391, 495, 515, 817, 950, 1063, 1124.
— *carbolic.* 82, 138, 147, 196, 273, 359, 371, 387, 404, 444, 445, 523, 584, 631, 843, 851, 854, 864, 1099, 1117.
— *citricum* 78.
— *hydrochlor. v. muriatic.* 200, 256, 268, 301, 427, 428.
— *hyperosmicum* 617, 661.
— *lacticum* 305, 403, 644, 1016.
— *muriaticum* 800.
— *nitric.* 362.
— *phosphoric.* 270.
— *pyrogallic.* 865.
— *pyrolignos.* 197, 506.
— *salicylic.* 79, 157, 271, 276, 413, 498, 500, 505, 513, 579, 600, 603, 657, 827, 997, 1031, 1090, 1100, 1102, 1123.
— *tannic.* 158, 266, 394, 497, 739, 841, 916, 963.
— *tartaric.* 671.
Aconitin. 1087.
Adonis 104, 1111.
Aether acet. 57.
— *sulphur.* 55, 76, 124, 295, 650.
Aethylenum brom. 494.
Agaricin. v. ac. agaric. 580.
Aloe 53, 286, 726.
Althea 625, 738.
Alumen 85, 149, 159, 369, 634, 658, 795, 821.
Alumnol zob. *Nowe leki.*
Ammon. boracicum zob. *Nowe leki.*
Ammon. brom. 4, 488, 697, 944.
— *chlorat.* 68.
— *muriatic.* 632, 643.
— *sulphoichthyol.* 531, 532, 683, 779, 780, 783, 890.
Amylenhydrat. 398, 583.
Amylnitrit. 117.
Amylum 160, 441, 961.
Analgen 621, 720.
Anthrarobin 563.
Antifebrin 132.
Antinervin 624.
Antipyrin 69, 326, 405, 618, 690, 713, 721, 788, 789, 810, 813, 910, 946, 1007, 1043.
Antispasmin 820.
Apocodein 177.
Apomorphin 115, 178, 249, 470.
Aqua calcis 353.
— *chloroformii* 345.
— *foeniculi* 240.
— *laurocerasi* 573, 630.
— *picis* 863.
— *plumbi* 606.
— *pyrophosphatis* 872.
Arbutin 263.
Argentum nitric. 25, 88, 139, 150, 153, 213, 275, 368, 370, 373, 378, 385, 397, 587, 638, 1062, 1068, 1133.
— *oleinicum* 396.

- Arnica* 743, 1115.
Aristol. 357, 799, 1059.
Arsenic. v. Acid. arsen. et natr. arsen.
Artemisia 490.
Asaprol 886.
Aseptol 1120.
Atropin 214, 477, 493, 581, 607.
Balsam copaive 126, 128, 129, 130.
— *peruv.* 8, 165, 904.
— *tolutanum* 166.
Belladonna int. et ext. v. Extr. et Tra.
Benzin. 1009.
Benzol 1010.
Benzonaphtol 319, 1071.
Benzoes flor. 454.
Benzosol 1024.
Betol 622.
Bismuth. carbon. 17.
Bismut. salicyl. 227, 235, 420, 749, 852.
— *subnitric.* 134, 388, 442, 566, 877, 1084.
— *valerianic.* 216.
Blauda pigulki 284.
Borax 797, 949.
Botkin krople 300.
Bromoform 815.
Burowa plyn 417, 482, 658, 669.
Butylchloral 708, 718.
Butyrum cacao 418, 758.
Calcium carbonic. 968, 969.
— *phosphoric.* 62, 875, 876.
Calomel. 110, 312, 313, 340, 348, 384, 412, 439, 557, 664, 674, 986, 1075.
Camphora 75, 90, 304, 320, 324, 395, 914, 974, 1051, 1055.
Cannabis indic. 258.
Capsicum 400.
Cardinum zob. Nowe leki.
Carpainum zob. Nowe leki.
Cascarilla 313.
Cascara Sagrada 728, 732.
Castoreum 208.
Cera alba 560.
Cerium oxalicum 568.
— *valerianicum* 569.
Chamomilla ol. 347.
China 34.
China cortex (decoct.) 40, 72, 187, 592, 705, 828, 922, 951.
Chininum ferrocitric. 294.
— *muratic.* 68, 589, 590, 595, 597, 689, 695, 714, 806, 1041, 1045, 1048, 1091.
— *sulphuric.* 41.
— *tannic.* 243, 421, 596, 917.
Chinolin 80.
Chloramid zob. Nowe leki.
Chloralacroton 715.
Chloralhydrat. 26, 30, 49, 327, 329, 350, 423, 436, 437, 440, 677, 766, 803, 935, 942, 943, 1086, 1088, 1089, 1097.
Chlorina liquida 973.
Chloroform 91, 215, 346, 673, 711, 742, 829, 855, 895.
Chrysarobin 466, 555, 556.
Cocain mur. 121, 164, 205, 212, 462, 558, 570, 571, 741, 745, 750, 791, 801, 804, 838, 849, 857, 1014, 1015, 1036, 1093.
— *oleinicum* 605.
Coccionella 809.
Cognac 239, 309, 839.
Codein 207, 254, 402, 699, 812, 937, 1083.
Coffein citric. 86, 217, 694, 869.
— *natrobenz.* 103, 1107.
— *natro salicyl.* 689, 1051.
Coffea tosta 509.
Colchicum Tra 891.
Collodium salicyl. 1031.
Collyrium adstr. 375.
Colombo 241, 313, 434.
Condurango 203.
Convallaria maj. 105, 221, 776.
Coto Tra 233.
Cotoin 230.
Creolin 192, 193, 504, 907, 1056, 1125.
Creosot 315, 819, 931, 932, 1022, 1023, 1027, 1028.
Croton ol. 1004.
Cubebae 151.
Cuprum arsenic. 60.
— *sulphuricum* 132, 156, 386, 859.
Curare 489, 663.
Dermatol 451, 1060, 1061.
Diaphtherin 893.

- Digitalis infus.* 102, 342, 474, 771,
 774, 775, 920, 1103.
 — *pulv.* 476, 1105.
Diuretin 108, 703.
Dover p. pulv. Dov. 179, 232.
Emplastr. cerussae 392.
 — *Diachylon* 448, 1033.
 — *Hydrargyri* 486, 786, 980.
 — *de melilot.* 561.
 — *saponat.* 486.
Emulsio communis 792.
Equisetum 106, 921.
Ergotin 539, 540, 541, 550, 551.
Eserin 522.
Eucalyptus tinct. 594.
Euphorin 618, 693.
Europhen 356.
Exalgin 334, 722, 892, 948.
Extr. cannab. ind. 258.
 — *bellad.* 92, 120, 163, 296, 419,
 479, 491, 680, 1094.
 — *cascarae v. Cascara.*
 — *chamamellis* 559.
 — *chinae* 36, 37, 478.
 — *filic. maris* 993, 998.
 — *Gelsemii* 719.
 — *hydrastis v. hydrastis can.*
 — *hyosc. v. hyosciamus.*
 — *nucis kola* 66.
 — *nucis vom.* 210.
 — *opii* 1, 231, 536, 681, 736, 777,
 1035, 1073.
 — *rhois arom.* 481.
 — *secalis v. secale corn.*
 — *viburnii* 3.
Ferrum aceticum v. tinct.
 — *albumin.* 293, 58, 63.
 — *bromatum* 837.
 — *carbon. sacchar.* 288, 430.
 — *hydrog. reduct.* 59, 290.
 — *jodatum sacchar.* 928.
 — *lacticum* 291.
 — *oxydatum* 289.
 — *pyrophosphoric.* 292, 874.
 — *reductum* 59, 290.
 — *sesquichlorat.* 83, 144, 199, 364,
 534, 542, 919, 923, 924, 952.
 — *sulphuric.* 54, 284, 285, 543.
Filix mas 993, 995, 998.
Flores benzoës vid. ac. benz.
 — *koso* 996.
 — *sulphur.* 162.
Folia myrtillorum 406.
 — *uvæ ursi* 262.
Gallanol zob. Nowe leki.
Gelsemium 719.
Glycerin 460.
Guajacol 1025, 1029, 1030.
Gummi gutti 111, 472.
Haemoglobin 61, 62.
Hydrargyr. bichlor. v. sublimat.
 — *chlor. mite v. Calomel.*
 — *oxydulat. nigrum* 988.
 — *oxydulat. tann.* 964, 965.
 — *praecip. album* 35, 282, 485,
 866, 981, 1032.
 — *praecip. flavum* 281, 665.
 — *praecip. rubr.* 161, 461, 755, 787.
 — *Salicyl.* 989, 980, 991.
 — *thymoloacetic.* 987.
Hydrastis canad. extr. fluid. 422,
 546, 548, 682, 1019.
Hydrastinin 547, 549.
Hyosciam extr. 141, 180, 700, 811.
Hyosciamin 760, 761.
Ichtyol 18, 512, 604, 888, 889.
Ipecacuanh. inf. 171, 186, 188,
 189, 641, 646, 649, 701, 834, 858.
Ipecac. pulv. 247.
Jodum purum 640, 653, 753, 824,
 982, 984, 1077.
Jodoform 5, 6, 7, 23, 24, 101, 154,
 354, 355, 377, 407, 679, 782,
 794, 959, 960, 1012, 1057, 1058,
 1067, (*bezwonny*) 1126, 1127,
 1128, 1130, 1131.
Jodol 662, 754, 1129, 1132.
Juglans fol. 242.
Juniperus 343, 773.
Kali arsenicosum 927.
 — *acetic.* 102.
 — *bitartar.* 112.
 — *bromat.* 28, 224, 567.
 — *carbon.* 361.
 — *caustic.* 1065.
 — *chloricum* 70, 77, 89, 194, 336,
 612, 823, 966, 967, 1095.
 — *hypermang.* 136, 148, 191, 195,
 496, 518, 577, 822, 939.
 — *hydrojodic v. jodatum* 21, 22,
 116, 119, 330, 344, 487, 507,
 526, 527, 684, 781, 784, 884,
 953, 955, 956, 977, 1039, 1074,
 1110.

- Kali sozjodolic.* 601.
 — *telluricum* 1018.
Kamala 996, 1010.
Kosso 1006.
Koussinum 999.
Krople Botkina 300.
Lac sulphur. 9, 15, 38, 484, 499, 562.
Lanolin 698, 770, 908.
Laudanum v. Opium.
Limentum volatile 992.
Liparin 882.
Liquor. alumin. acet. v. liquor. Burowi.
 — *ammon. anis.* 123, 308, 913.
 — *Burowa* 416, 417, 482, 658, 669.
 — *ferri albumin.* 58, 63, 293.
 — *kali arsenic.* 927.
Liquiritia 552, 724.
Lithion carbon. 94, 709, 756.
 — *jodat.* 93.
Lobelia 1114.
Losophan 903.
Lupulin 321, 322, 323.
Magister. bismuthi v. bism. subnitr.
Magnesia carbon. 730.
 — *sulphur.* 670.
 — *usta* 433.
Mannit 409.
Melissa 234.
Menthol 168, 514, 517, 572, 735, 846, 850.
Mixtura gummosa 229, 1049.
Morphium mur. 176, 206, 209, 253, 297, 707, 734, 805, 1013, 1082.
 — *inj.* 261, 297, 609, 1037 (!) 1085.
 — *ext. (supp.)* 260, 793, 842, 1040.
Naphthalin 122, 235, 758, 1002, 1050.
Naphthol 11, 16, 465, 467, 564, 578, 868, 900, 906, 1012, 1052, 1053.
Natr. benzoic. 181, 316, 349, 626.
 — *biborac.* 797.
 — *bicarbon.* 143, 170, 175, 252, 424, 629, 730, 757, 1078, 1080.
 — *boricum* 628.
 — *bromatum* 325, 331, 676, 702, 1054.
 — *carbonic.* 360.
 — *chlorat.* 831.
Natr. dithyosalic. 97.
 — *jodat.* 338, 614, 616, 675, 785, 894, 954, 976, 978.
 — *nitros.* 118.
 — *salicyl.* 264, 298, 414, 415, 613, 692, 717, 848, 911, 912, 1042.
 — *sozjodol.* 84.
 — *subsulph.* 856.
 — *sulphoichtyol* 528, 539, 530.
 — *sulphur.* 109.
Nitroglycerin 222, 223, 1109.
Nucleinum zob. Nowe leki.
Oesypium 845, 853.
Ol. amygdal. 1101.
 — *caryophyll.* 902.
 — *camphor.* 56, 798.
 — *chamomill.* 347.
 — *cinamomi* 45, 48.
 — *crotonis* 994.
 — *eucalypti* 50, 183.
 — *fagi* 459.
 — *jecor. aselli* 878, 879, 925, 930.
 — *juniperi* 636.
 — *ligni Santali* 127, 870.
 — *lavandul.* 902.
 — *olivarum* 299.
 — *petrae* 768, 769.
 — *pini* 637.
 — *ricini* 410, 733.
 — *rusci* 446, 456, 464, 565.
 — *Sabinae* 43.
 — *terebinth.* 64, 473, 667.
Ononis spin. 830.
Opium purum 259, 790, 1070.
 — *v. Tra.*
Papayotin 81.
Paraldehyd. 399.
Pasta Lassara 449.
Paulinia sorb. 236.
Pelletierin 997, 1001.
Pepsin 200, 256, 287, 431, 432.
Petroleum 768.
Phenacetin 691, 1044.
Phenocollum hydrochl. 591.
Phenosalyz zob. Nowe leki.
Phosphor 880, 881, 882, 883.
Pichi-Pichi extr. zob. Nowe leki.
Pilocarpin 51, 73, 339, 408, 521, 647, 763, 936, 1006.
Pillulae asiaticae 654, 861.
Piperinum 651.
Piperazin 95, 710.

- Pix liquid.* 863.
Plumb. acet. 85, 382, 383, 443,
 501, 502, 544, 1021.
 — *oxydatum* 365.
 — *tannicum* 393.
Podophyllin 588, 731.
Polygala Senega 172, 648, 835.
Praecip. alb. v. Hydr. p. a. flav.
rubr.
Propylamin 333.
Pulv. Doveri 179, 232.
 — *lap. Baptistae* 14.
 — *liquir* 552.
Pyoctanin 190.
Quebracho 113, 435.
Quercus dec. 576.
Quillaya 173.
Resorcin 12, 32, 234, 274, 318,
 317, 367, 941, 1011, 1073.
Rheum radix 585, 727.
 — *tinct.* 725.
Rhus arom. 481.
Sabina frond. 366.
Sabinae ol. 43.
Saccharin 409, 510, 940.
Sal. amar. 729.
 — *ammon.* 627.
 — *therm. Carol.* 250, 251, 425,
 553, 729, 1079.
Salep 228, 1047.
Salipyrin 885, 1017.
Salol 96, 226, 237, 245, 265, 411,
 623, 752, 1008.
Salophen 620, 887.
Salvia 740.
Santonin 98, 99.
Sapo viridis 564.
Secale corn. 145 535, 537, 538,
 554, 685, 686, 706, 836, 947.
Semina cinae 100.
Semen lini 142, 257, 615.
Senega v. Polygala.
Sol. ars. Fovleri 328, 593, 655,
 659, 660, 696, 716, 759, 860, 862.
 — *Pearsoni* 65, 599.
 — *Burowi v. liquor B.*
Sozodol 601 *vide Natrum et Kali*
Soz.
Sparteïn 107, 218, 1112.
Spir. lavandul. 1087.
 — *Sapon. Kalin.* 867, 898.
 — *vini gallic.* 39.
Spongia tosta 957.
Stibium sulph. aur. 471, 808.
Strontium bromat. 426.
 — *lacticum* 704, 1003.
Strophantus v. Tra Str.
Strychnin int. 480, 764, 938.
 — *inj.* 31 762, 765.
Styrax 901, 905.
Sublimat v. Hydr. bichlor. 280,
 374, 379, 468, 483, 575, 645,
 656, 847, 962, 975, 985, 1076,
 1118, 1119.
Succus citri 87.
Sulphonal 27, 332, 582, 672, 1004,
 1098.
Sulphur aur. ant. 471.
 — *praecip.* 10, 11, 899.
Syrup ferri iod. 832, 926.
Tannin 42, 125, 246, 508, 519,
 533, 545, 574, 635, 871, 971,
 1096.
Tartar. stib. 248.
Terebinth 146 *v. Ol. Ter.*
Terpinol 167, 469, 516.
Terpinkhydrat 169.
Teucrium zob. Nowe leki.
Thallinum 135, 1046.
Theobromin 219, 341, 1108.
Therebint. ven. 146.
Thiol v. Nowe leki.
Thiophen 844.
Thymian 814.
Thymol 511, 737, 818, 1122.
Tiliae inf. 1095.
Tinct. absynth. 428.
 — *acon.* 47, 807.
 — *amara* 255.
 — *bellad.* 351, 802, 896.
 — *benzoes* 46, 185.
 — *canellae* 307.
 — *cantharid.* 37, 44.
 — *capsici* 52, 400.
 — *chinae comp.* 202.
 — *cinamom.* 302, 687.
 — *colchici* 891.
 — *Colombo* 313, 434, 1072.
 — *convallaria* 221, 776.
 — *coto* 233.
 — *digitalis* 1104.
 — *eucalypti* 184, 594, 652.
 — *ferri acet.* 688.
 — *chlorati* 67, 873.

- Tinct. ferri pomati* 64, 429.
 — — *gallarum* 337.
 — *gelsemii* 719.
 — *helianthi* 598.
 — *jodi* 19, 20, 524, 525, 778, 929, 958, 983.
 — *lobeliae* 119, 1114.
 — *malat. ferri* 283.
 — *myrrhae* 71, 825, 970.
 — *Nerii Oleandri* 1113.
 — *nuc. vom.* 201, 211, 733.
 — *opii* 2, 208, 303, 666, 1034, 1069.
 — *rhei* 725.
 — *rhuris arom.* 481.
 — *ratanh.* 314, 520, 970, 972.
 — *rusci* 457.
 — *strammon.* 116.
 — *strophanti* 220, 475, 772, 1092, 1106.
 — *valerianae* 225, 306.
 — *veratri* 826.
Trifolium fol. 586.
- Tumenol* 450, 455, 463.
Unguent diachylon 448.
 — *Hebrae* 447.
 — *emolliens* 452.
 — *hydrarg.* 335, 610, 611, 642, 668.
 — *rosatum* 796.
 — *Wilkinson* 464.
Urethanum 29, 438, 678, 767, 1005.
Valerian inf. 238, 401, 833, 945.
Valerian v. Tinct. 934.
Vaselinum 381.
Veratrin 712, 723, 746, 897.
Viburnum prunif. 3.
Vinum Condurango 193, 204.
 — *stibiat.* 114, 174.
Zincum chlorat. 1066, 1121.
 — *oxydat.* 13, 33, 390, 442, 449, 453, 492, 933, 1064.
 — *sulphur.* 131, 133, 152, 155, 278, 503, 633, 639, 747, 751, 840.
 — *sulphocarb.* 137.
 — *sozodol.* 140, 748.



Andrzej
c. i k. dostawca
nadworny



Saxlehner
właściciel
źródła słynnego

„Hunyadi János.“

Saxlehner'a

wody gorzkiej

według orzeczenia powag lekarskich:

Szybkie, pewne, łagodne działanie.

Przy dłuższem stosowaniu łatwo się znosi.

Jednostajny i trwały skutek.

Mała dawka. — Łagodny smak.

Skarb ten natury rozbierany i uznany
przez **Liebig'a, Bunsena, Fresenius'a**

jest jedynym w swoim rodzaju.

W celu uchronienia się przed naśladownictwem

uprasza się zwolenników

naturalnej wody „Hunyadi Janos“

zwrócić uwagę,

czy na etykiecie i korku jest firma:

„Andreas Saxlehner.“

CIEPLICE TRENCZYŃSKIE

zakład zdrojowy na górnych Węgrzech
20 minut odległy od stacyi Tepla-Trencsén-Tepłitz.

Termy siarczano-wapienne ciepłoty 36.6—40.2 Cels. Kąpiele wannowe, basenowe, natryski, inhalacye. Mieszkania od 50 ct. do 3 Złr. na dobę. Kuchnia francuska. Z Krakowa via Oderberg, Żolna, Tepla-Trencsén-Tepłitz 9 godz. drogi. Frckwencya 5600 osób.

Pora zdrojowa od 1 Maja do końca Września.

W maju i wrześniu pensjon 3 Złr.

Bliższych szczegółów udziela **Dr Filipkiewicz** (zimną w Krakowie, Kolejowa 18).

Prospekty rozsyła bezpłatnie

Dyrekcya kąpielowa.



Podręcznik terapeutyczny

ze zbiorem

najwięcej używanych recept.

Abortus.

Jeżeli abortus habitualis, wykazać przyczynę. Jeżeli przyczyną lues: leczenie przeciwkiłowe nawet podczas ciąży — jeżeli jakieś cierpienie macicy, leczenie takowego. Strzedz choroby w okresie, w którym poprzednio roniła, i w okresach miesiączkowych szczególnie w pierwszej połowie ciąży. Usunąć wpływy szkodliwe, podnoszące działanie tłoczni brzusznej, zabronić spółkowania, nadmierne go ruchu, trzęsącej jazdy itd. Wolne swobodne ubranie. — Unikać u osób krwistych czynników podniecających, napojów wysokich, silnych wrażeń. W razie krwawienia podczas ciąży, gdy nieodchodzą skrzepy krwi, i przy badaniu jaja wyczuć nie można, leczenie wstrzymujące poronienie i spokój.

1. *Extr. Opii aquosi 9/10,*
But. Cacao q. s. ut. f. l. artis
Suppositoria ad anum Nr.
quinque.

S. Rano i wieczorem czopek (i częściej).

2. *Tinct. Opii simpl. 10'00.*

S. 20—25 kropli rano i wieczorem w lewatywie.

W ostatnim czasie polecano też:

3. *Extr. fluid. Viburni prunifol. gtts. 10,* w połączeniu z 0'50 chloralu, dopóki bóle nie ustaną.

W następnych dniach:

4. *Ammon. bromat. 15'00,*
Extr. fluid. Viburn. 2'00,
Aq. dest. 120'00.

S. 2 razy dziennie łyżeczkę.

Gdy niema już nadziei utrzymania ciąży: środki pobudzające czynność porodową: zimne okłady na brzuch, wstrzykiwania do pochwy rozcżynami środków przeciwniepalnych (kw. karbolowy 3%, Creolina 1—2%). Gdy jajo wystąpiło z jamy do szyi macicy, można podać secale cornutum.

Gdy krwawienie znaczne, zatamponowanie pochwy najpierw gązą jodoformową, poniżej zaś tamponami z waty, napojowymi gliceryną. (Zmienić za 6—10 godzin i przestrzyknąć pochwę). Jeżeli zachodzi możebność usunięcia jaja w całości, szczególnie gdy odchody cuchnące, usunąć takowe zabiegiem ręcznym.

W razie krwawienia skutkiem pozostania resztek z jaja płodowego w macicy — wyskrobanie tychże tępą łyżeczką. Postępowanie aseptyczne).

Abscessus frigidus.

Z otwarciem tego rodzaju ropni nie potrzeba się wcale spieszyć wyjawsz tych przypadków, w których rychłe usunięcie ropnia wskazaniem jest z przyczyn innych. Leczenie ropni zimnych może być bardzo rozmaite. Albo ograniczamy się tylko do otwarcia ropnia i wprowadzenia doń sączka, lub też aspirujemy ropę przyrządem aspiracyjnym Dieulafoya lub Potaina. Po wypuszczeniu całej ilości ropy, wstrzykuje się do jamy kilkadziesiąt gramów zawiesiny jodoformowej, z której część po kilku minutach wypuszczamy, resztę zaś w jamie ropnia pozostawiamy. Na cały ropień zakłada się następnie opatrunek uciskający z przylepca. Postępowanie to wyjątkowo tylko prowadzi do celu za pierwszym razem, zazwyczaj należy je powtórzyć kilka razy w odstępach kilkutygodniowych. W niektórych razach można całą ropień otworzyć szerokiem cięciem, ściany jego wyskrobać ostrą łyżką, a potem po zatamowaniu krwotoku, zalać całą ranę zawiesiną jodoformową i dokładnie zeszyć. Do przetok po ropniach grzecznych, należy wprowadzać przeciki jodoformowe, kawałki lapisu lub też przeciki z balsamu peruwiańskiego.

5. *Jodoform 10'00,*
Glycerin 100'00.
S. Przed użyciem zakłócić.

6. *Jodoform 9'00,*
Mucill. gum. arab.
Glycerin. āā. 1'00,
Mf. bacill. long. ctm. 4,
crass. mllm. 2.

S. Przeciki jodoformowe.

7. *Jodoform,*
Butyr Cacao āā. 10'00,
Mf. bacill long. ctm. 5,
crass. mllm. 2.

8. *Bals. peruv. Glycerin.*
Gelatin āā. q. s. f. l. a. bacill
long. ctm. 8, crass. mllm. 4.
Nr. X.

Acne vulgaris.

A) *Leczenie ogólne:* przyczynowe: Usunąć cierpienia w zakresie narządu trawienia, płciowego, anemię.

B) *Leczenie miejscowe:*

a) mechaniczne. Zaskórniki wycisnąć przyrządem podobnym do kluczyka od zegarka, istniejące ropnie gruczołowe i podskórne otworzyć bisturem. Po usunięciu ropni, gdy skóra pozbędzie się obrzmienia i okazuje tylko małe guzki i chrosty, używa się b) środków leczniczych, których przy mniejszem nasileniu choroby zaraz z początku można użyć. Wieczorem zmywa się miejsca chorobowo zajęte, gdy i skóra kl. piersiowej zajęta, w kąpieli zwykłej, parowej lub siarczanej, mydłem naftolowem, siarkowem lub spirytusem mydlanym, nacierając takowymi energicznie. Osuszwszy miejsca zmyte, stosujemy następnie na skórę środki, które wśród miernej reakcyi, powodują szybkie oddzielenie przyskórka a więc i komórek wyścielających gruczoły łojowe. Takimi środkami są: siarka, naftol, resorcyna.

9. *Lactis sulphur. 10'00*
Kali carbonici 5'00,
Spir. lavandul 20'00,
Glycerin. 50'00,
Ol. caryophyll.
Ol. menthae.
Ol. rosmarin āā. 1'00.

DS. Zakłócić przed użyciem, wetrzeć pędzlem szczeciniowym lub flanelą, zostawiając całą noc na skórze.

Górną część tego płynu się zlewa, nabiera się na flanelę

niewielki osadu i wtiera takowy dość mocno, nazajutrz zmywa się osad wodą letnią, i tak postępuje 8—10 dni.

10. *Sulphur. praecipit* 10'00,

Spir. saponato kalin. 20'00.

MDS. Przed użyciem skłócić i wetrzeć pędzlem szczytnym.

Szybciej działa:

11. *Naphthol-B* 5'00,

Sulphur. praecip. 25'00,

Sapon. virid.

Vaselini flavi āā. 10'00.

Mf. Pasta. S. Maść.

Pastę tę naciera się wieczorem zapomocą flaneli, zostawia ją na skórze godzinę, a potem się ściera. Stosować 8—10 dni.

Bardzo energicznym środkiem jest:

12. *Resorcin.*

Zinci oxydat.

Amyli Oryzae āā. 10'00,

Vaselin. flav. 20'00.

Mf. Ung. S. Maść.

Maść tę wtiera się wieczorem, zostawia przez $\frac{1}{2}$ godz., a następnie ją ściera.

Zamiast powyższych środków można także użyć z dobrym skutkiem piany z spirytusu mydlanego, mydła naftolowego lub siarkowego, którą wtarłszy w skórę, zostawia się przez noc całą.

Ponieważ wszystkie te środki drażnią skórę, należy je łączyć ze środkami łagodzącymi t. j. wieczorem wtierać jedną z powyższych maści a rano wetrzeć:

13. *Zinci oxydati,*

Magist. Bismut. āā. 1'00,

Ung. emollient. 10'00.

Maść tę naciera się w cienutkiej warstwie i posypuje pudrem.

14. *Pulv. lapid. Baptistae,*

Talci veneti,

Amyli orizae āā. 30'00,

Ol. rosar. gtts. IV.

Acne nodata ustępuje przy zaprzestaniu używania tego środka.

Acne rosacea. Pierwszem zadaniem usunięcie podstawy choroby, a więc przy niezycie przewodu pokarmowego woda Karlsbadzka, Maryenbadzka, przeciw anaemii: żelazo, arsenik, w razie zmian chorobowych części rodnych, leczenie odpowiednie; zaprzestanie napojów wysokowych. Leczenie miejscowe ma na celu sprowadzenie skurczu naczyń, jakoteż usunięcie guzków, będących następstwem przerostu tkanki łącznej i zapalenia gruczołowych. Telangiektazya usuwa się przez obwodowe nacięcie pni naczyń rozszerzonych, w kilka dni po tych nacięciach (których ma być kilkanaście), wtiera się siarkę z wysokiem.

15. *Lactis sulphur* 10'00,

Spir. vini gallici 50'00,

Glycerini 1'50.

lub maść naftolową:

16. *Naphtholi-B* 2'00,

Sulphur. praecip. 10'00,

Sapo virid.

Vaselin flavi āā. 7'00.

Maść tę wtiera się wieczorem na godzinę, usuwając potem wata. Dobrze też działa maść resorcynowa *p. acn. vulg.*

Na porę dzienną używa się bielidła (Eau de Princesse).

17. *Bismut. carbon. basici* 10'00,

Talci veneti 20'00,

Aq. rosarum 70'00,

Spir. colon. 3'00.

MDS. Osad pędzlem wetrzeć.

Usunięcie większych guzków wymaga operacji.

W ostatnich czasach polecano:

18. *Ichtyoli* 2'00,

Lanolin.

Vaselin āā. 10'00.

F. ung. S. Na noc posmarować, rano zmyć wodą z mydłem.

Mały kawałek płótna macza się we wrzącej wodzie i na minute przykładają na chore miejsca; powtórzyć 2—3 razy dziennie. Do wody można dać nieco kwasu salicylowego.

Actinomykosis.

Ile możliwości doszczętne usunięcie części schorzałych, przez wycięcie lub wyskrobanie zapomocą ostrej łyżki. Opatrunek jodoformowy lub sublimatowy.

Adenitis inguinalis.

Absolutny spokój; w początkach lodowe okłady, przetwory lodowe. W dalszym okresie okłady wysychające (z letniej wody lub octanu glinowego). Skoro się tylko chęłbotanie daje wykazać, należy ropień zapomocą szerokiego cięcia otworzyć i ranę wytamponować gazą jodoformową. Celem przyspieszenia wyleczenia, można resztki gruczołów, o ile jeszcze nie uległy zropieniu, wyluszczyć lub usunąć ostrą łyżką. W zatoki powstałe podczas gojenia się rany, można wprowadzać preciki jodoformowe lub kawałki lapisu, choć najpewniejszym sposobem pozostanie zawsze rychłe rozcięcie i otwarte leczenie tychże.

19. *Tet. jodi* 30'00.

S. Zewnętrznie.

20. *Tet. jodi.*

— *Gallar.* āā. 30'00.

S. Zewnętrznie.

21. *Kali jodat.* 0'00,

Jodi pur. 2'20,

Glycerin. 40'00.

S. Zewnętrznie.

22. *Kali jodat.* 2'00,

Jod. puri. 0'20,

Ungu. simpl. 20'00.

Mf. Ung. S. Maść.

23. *Jodoform* 9'00,

Glycerin.

Mucill. gumm. arab. āā. 1'00,

Mf. *bacill. long. ctm.* 4.

crass. mllm. 2.

S. S. n.

24. *Jodoform*

Butyr Cacao āā. 10'00,

Mf. *bacill. long. ctm.* 4.

crass. mllm. 2.

S. S. n.

25. *Argent. nitric. fus. in bacill.*

tenuissim 5'00.

S. S. n.

Agrypnia (Bezsenność).

Uwzględnić przyczyny: Anaemia, Hysteria, Neurastenia, Dyspepsia (zwłaszcza u dzieci przekarmienie) i t. d.

Przy anaemii na wieczór wino, piwo, przy Congestjach derivantia, letnie kąpiele, odpowiednia dyeta i t. d. Gdy te środki nie pomagają:

26. *Chloralhydrat* 3—5'00,

Aq. dest. 100'00,

Succi liquir 20'00,

Chloroform gtt. 3.

MDS. Połowę na raz, drugą za 1/2 godziny.

27. *Sulphonal* 1'00,

Tal. dos. 5.

S. Na godzinę przed spaniem proszek z herbatą lub rosółem, w godzinę drugi. (Przy dłuższem używaniu intoxie! zob. nowe leki).

28. *Kali bromati* 0'25,

Castor. canad. 0'05,

Sacchari 0'30,

Mfp. tal. dos. 10.

S. 3 proszki dziennie (A. na tle nerwowem).

Dzieciom:

29. *Urethan* 1—2'00,

Aq. dest. 100'00,

Syr. aur. 20'00.

MDS. Połowę przed spaniem.

- 30.** *Chloralhydr.* 0'20—0'40,
Tinct. Moschii
 — *Valerian* āā. gts. X.
Aq. dest. 60'00.
 MDS. Na lewatywę.

Alkoholismus.

Acutus zobacz: Otrucia.

Chronicus. Leczenie tylko w zakładach mozebn. *Tra chinæ, Tartar. emetic.* czasami w lżejszych stopniach pomaga:

- 31.** *Strychnin nitr.* 0'05,
Aq. dest. 15'00.

DS. Do iniekcji.

Dzienn. 1—2 inj. po 0'50 płynu.
 Równocześnie *natr. brom.*

Na tle *A.* najważniejsze zob. *delirium tremens.*

Alopecia.

1. *e seborrhoea.* (Włosy tłuste, lśniące, pozoruje grube z licznymi łuskami. a) Przyczynowo: usunąć cierpienia przewodu pokarmowego niedokrewność, poprawić ogólne odżywienie, leczyć kiłę (alopecia e seborrhoea syphilit.).

b) Leczenie miejscowe. Istniejące strupy i łuski rozmiękczyć, a następnie zmywaniem usunąć. Do rozmiękczenia strupów używa się oliwy, tranu, olejku migdałowego, wcierając takowe pędzlem szczecinowym lub gąbką 4—5 razy dnia. U mężczyzn można poprzednio włosy krótko obciąć. Do zmycia rozmiękzonych strupów i łusek, używa się u dzieci płynnego mydła glicerynowego, u starszych *spiritus saponato Kalinus*, płynne mydło Gudego z dodatkiem 1% *kali carbon.* U kobiet z powodu splatania się włosów, zamiast mydła: 2—5% roztworu sody, 1%—3% *spiritus naftolowy* lub według Unny:

- 32.** *Resorcin* 5'00,
Spir. vini 150'00,
Ol. ricini 2'00.

MDS. Do mycia głowy.

Mydło wciera się gąbką lub flanelą, aż do powstania obfitej piany, spłukując je obfitą ilością wody letniej. W ten sposób zmyta skóra głowy jest zaczerwieniona, sucha, napięta, skłonna do pęknięcia i rzyśkórka, dlatego w tym okresie wciera się w nią oleje lub pomady.

- 33.** *Zinci oxydati* 5'00,
Unguenti emolientis 25'00.
 Mf. Unguentum. S. Maść.

lub:

- 34.** *Chinini puri* 1'00,
Acidi tannici 2'00,
Unguenti emolientis 100'00,
Olei resedae
Ol. Naphae āā. gts. III.
 Mf. Unguentum. S. Pomada.

lub:

- 35.** *Mercur. praecipit. albi* 5'00,
Unguenti emolientis 50'00,
Trae Benzoes 1'00,
Olei rosar. gts. V.
 Mf. Ung. S. Pomada.

lub:

- 36.** *Extr. chinæ* 5'00,
Balsami peruvian 1'00,
Unguenti emolientis 50'00.
 Mf. Ung. S. Pomada.

lub:

- 37.** *Medullae ossium* 75'00,
Extr. chin. frig. parat. 10'00,
Trae cantharid.
Succi Citri āā. 5'00,
Olei de Cedro
Olei Bergamottae āā. gts. X.
 Mf. Ung. S. Pomada.

- 38.** *Lactis sulphuri.* 3—5'00,
Lanolin 3'00,
Adipis benzoinati 30'00.
 Mf. Ung. S. Pomada.

Skoro przyskórek dostatecznie zgrubieje i tkliwość skóry ustą-

pi, trzeba jeszcze przez kilka tygodni w miarę wytwarzających się łusek codziennie, lub 3 razy w tygodniu wcierać powyższe pomady po poprzednim zmyciu głowy jednym z płynów:

39. *Spiritus vini gallici* 100·00,
Acidi carbolici 0·15,
 { *Acidi borici* 3·0, } lub
 { *Acidi salicylici* 3·00, }
Glycerin 1·50.

MDS. Do nacierania

lub:

40. *Eau de Quinin* lub:
Cortex Chinae 10·00,
Spir. Sapon. 50·00.

MDS. Płyn do nacierania.

41. *Chinin sulph.* 1·00,
Spir. vini gallic. 60·00,
Aq. colon. 30·00.

DS. j. w.

42. *Tannin* 1—5·00,
Alcohol. q. s. ad solution.
Ol. amygdal. 50·00.

MDS. j. w.

2. *Alopecia e pityriasi* (nadmierne wytwarzanie się łusek, włosy suche cienkie, skóra głowy cienka) w tej formie pomady z dodatkiem środków drażniących lub samych środków drażniących.

43. *Ol. Sabinæ gtts.* 10—15,
Aq. Coloniensis 50·00.

MDS. Zewnętrznie.

44. *Trae Cantharid.* 2—3·00,
Aq. coloniens. 50·00.

MDS. Zewnętrznie.

Weieranie tych środków łączy się z massagem skóry głowy.

3) *Alopecia areata*. Leczenie zazwyczaj nie wielkie skutki odnosi.

1) wyciąganie zwątlonych włosów.

2) dobre odżywienie i leki wzmacniające.

3) wcieranie płynów drażniących w połączeniu z przeciwgrzybkowem.

45. *Ol. Cinamom. aeth.* 10·00,
Aether. sulphur. 30·00.

MDS. Zewnętrznie.

46. *Trae Benzoes* 2·00,
Acidi salicylici 5·00,
Spiritus vini gallici 200·00.

MDS. Zewnętrznie.

lub:

47. *Trae Aconiti* 1·00,
Trae Capsici 1·00,
Spiritus vini gallici 200·00,
Balsami peruviani 2·00.

MDS. Zewnętrznie.

48. *Ol. cinnam. chin.* 10·00,
Aether. sulphur. 30·00.

S. Raz dziennie pędzlować (nie zmywać głowy).

49. *Chloralhydrat.* 5·00,
Aether. sulph. 25·00,
Acid. acet. cryst. 1·50.

MDS. Do nacierania głowy przez 5 minut.

50. *Ol. Eucalypti*
Ol. therebinth. aa. 15·00,
Petrolei crudi
Spir. vini rectif. aa. 30·00.

MDS. Płyn do nacierania.

3) Iniekcye pilocarpinu.

51. *Extr. aquos. Pilocarp.* 30·00,
Tinct. cantharid. 15·00,
Liniment. saponat. 170·00.

Weierać w skórę raz dz.

Amenorrhoea.

Badać dokładnie i szukać przyczyny. Pamiętać o możebności ciąży. W przypadkach haematometra zabieg operacyjny. Jeżeli przyczyną chlorosis, scrophulosis, tuberculosis, anaemia, zastósować odpowiednie leczenie.

W przypadkach niedostatecznego rozwoju macicy, albo w przypadkach nadmiernego zwnięcia się tejże po porodzie;

wstrzykiwania ciepłe, elektryzowania macicy, kąpiele nożne, upusty krwi z części pochwowej powtarzane w czterotygodniowych odstępach, szczególnie, gdy są molimina menstrualia. Żelazo wewnątrznie, zmiana powietrza, powietrze górskie, Krynica, kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa).

52. *Trae Capsici* 3'00,
Rhumi optimi 80'00,
Mixturae gummosae 120'00.
 S. Co 3 g. łyżeczkę od kawy.

53. *Extr. aloes* 1'00,
Pulv. myrrhae q. s. ut. f. pill.
Nr. 50.
 S. 3 r. dnia 2—3 pigułek.

54. *Acid. arsenic.* 0'06,
Ferri sulph. exsicc. 2'00,
Piper nigr.
Aloes.
Myrrh. āā. q. s. f. pil. *Nr. 60.*
 S. 2 r. dz. pigułek po jedz.

Anaemia.

Jeżeli wystąpi wskutek krwotoku lub długotrwałej choroby, podawać leki wzmacniające i podniecające, pożywna dyeta. W razie grożącego zapadu wino Sherry, Szampańskie, czarna kawa, eter, oraz: podskórne wstrzyknięcie roztworu soli 0·7% w ilości 500—700'00.

55. *Aether sulphur.* 10'00,
Camphor. 1'00.
 DS. Wstrzyknąć 1—2 wstrzyk.

56. *Olei camphorati* 10'00.
 DS. Do wstrzykiwań.

57. *Aether acet.* 10'00.
 DS. 10—20 kropli co $\frac{1}{2}$ godz.

Przy dłużej trwającej A. według wskazań: arsen (Woda Gubera), żelazo, wino, pobyt na świeżem powietrzu. Wody żelaziste, Krynica, Żegiastów, kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa).

Polecają też upust krwi (Schubert) licząc 2 grm. krwi na kilo wagi.

58. *Liquor. ferri album.* 50'00.
 DS. 3 razy dz. łyżeczkę.

59. *Ferri hydrog. reduct.* 5'00,
Acid. arsen. 0'20,
Extr. gentian q. s. f. pill.
Nr. 100.

DS. 2 do 3-ch pigułek dzien.

60. *Cuprum arsenicosum* 0'002—0'003 p. dosi zalecają w ciężkiej A.

61. *Haemoglobina* po 0'20 na dzień w formie pastylek przez Dra Pfeiffra (Jessler's Ludwig Apotheke, Münch.).

62. *Calcar. phosphoric* 10'00,
Haemoglobin 1'00—2'00,
Extr. Strychni 0'10,
Div. in dos. 20.
 S. Dziennie 5 proszków.

U dzieci:

63. *Liquor. ferri album.*
 DS. 5—20 kropli w $\frac{1}{2}$ szklanki mleka.

64. *Trae ferri pomat.* 10'00,
Trae chinae comp. gtts. X.
 DS. 3 r. dziennie po 10 kropli.

65. *Sol. arsen. Pearsoni*
Aq. amygd. amar. āā. 7'00.
 DS. 3 r. dziennie po 2 krople.

66. *Extr. liq. nuc. Kola* 30'00,
Syr. cort. aurant. 100'00,
Tinct. nuc. vom. 10'00,
Vini Xerensis 900'00.
(Vinum tonicum).

Wody pyrophosforanowo żelaziste. Zob. Chlorosis.

Anaemia cerebri.

Uwzględnić powody (utrata krwi, wyniszczające choroby — biegunki), w razie omdlenia: ułożenie poziome z głową ku tyłowi pochyłą, skrapianie twarzy zimną wodą, rozebranie chorego: kieliszek mocnego wi-

na, Cognacu, bandażowanie kończyn. U dzieci oprócz powyżej podanych środków, kąpiele z gorącą, wraz z polewaniem głowy zimną wodą, podskórne zastrzykanie Ol. camphor. eteru.

67. *Trae ferri chlorat.* 20·00.

DS. 3 r. dz. po 10 kropli.

Anchylostomum duodenale.

Środki przeciwczerwiowe, Santonina, Thymol, zwłaszcza zaś Extr. filic. mar. w dużych dawkach (10—15 gramm.) obok środków czyszczących i lewatyw.

Angina diphtheritica.

Przedewszystkiem odłączyć chorego, dla zapobieżenia rozszerzenia tej choroby. Mieszkanie przewietrzać. Ciepłota w pokoju 14—15 R. Dyeta pożywna, rosół, bulion, jaja, galarety mięsne, wino z wodą, herbata z cognakiem itp. Dużo płynów, lemoniada, woda ze sokiem owocowym. Leczenie rozpocząć lekkim środkiem przeczyszczającym, bądź kalomel w małej dawce, bądź aq. laxativ. rheum. Wobec mierznej gorączki chinina po 0·20 do 0·50 (rano i wieczór) przy wysokich stopniach: antypyryna z cognakiem, również po 0·20—0·50, parę razy dziennie. Zmywanie całego ciała wodą z octem. Zimne okłady na głowę, Na szyję okład wysychający, zmieniany co 2 lub 3 godz. Płukanie z rozczyńców: kali chloricum 2^o/_o Acid. boric. 3^o/_o. Dzieciom mniejszym przepłukiwanie gardła zapomocą strzykawki (z ostrożnością, aby podniebienia nie zranić — a w razie oporu, lepiej i tego zaniechać). Pędzlowania niezbyt częste albo sokiem z cytryny, lub też Papyotin (1:20). Inhalacye co godzinę, w nocy co 2 godziny: Acid. boric. 2^o/_o, Aq. calcis na 1^o/₂ z wodą, Kali chlor. 2^o/_o, Sublimat

1:3000. Z leków do wewnątrz podawanych 1^o/₂—2^o/_o rozczyń Kali chloricum w odwarze 5^o/_o kory chinowej. W uporczywszych i cięższych przypadkach, wcierania szaruchy po 5·00 dziennie w różne części ciała. Na obrzmiałe gruczoły okłady z liquor alum. acetic. Jeżeli błonica w nosie, lekkie przestrzykiwania kw. borowym 3^o/_o lub kali chlor. 2^o/₂. W razie zapadu, eter, kamfora, czarna kawa, zagrzewanie kończyn, nacierania ciepłym octem, wina mocne, wstrzyknięcie eteru. ol camphor. Jeżeli błonica przeszła na krtań, stósować leczenie podane przy Laryng. crouposa. Powikłania jak: Nephritis (codziennie badać moc), otitis, pneumonia, leczyć według wskazań. Przeciw porażeniom: dyeta wzmacniająca, chinina, przetwory żelaza, prąd stały. W czasie całego przebiegu zwracać uwagę: na serce, nerki i błony śluzowe.

Środki podawane do wewnątrz:

68. *Chinin. muriat.* 0·50—1·50,

Ammon. chlorati 1·00,

Aq. dest. 60·00,

Syrup rubid. 20·00.

DS. 3 razy dz. łyżeczkę.

69. *Antipyrin* 1·50—2·00,

Cognaci 20·00,

Aq. destil. 80·00,

Syrup simpl. 20·00.

DS. Co 3 godz. łyżeczkę.

70. *Kali chlorici* 0·50—2·00.

Aq. destil. 80·00,

Syrup rubid. 20·00.

DS. Co 2 godz. łyżeczkę.

71. *Tinct. Myrrhae* 4·00,

Glycerini 8·00,

Aq. dest. ad 200·00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

72. *Deti cort. chinae* e 5·00 ad 100·00,

Natri salicyl. 2·00,

Syrup sacchari 20·00.

DS. Co 2 godz. łyżeczkę.

73. *Pilocarpin muriatic.* 0·01,
Pepsin 0·20,
Acid. muriat. dil. gtts. V.
Aq. dest. 80·00,
Syrup simpl. 20·00.

DS. Co godz. łyżeczkę (po każdej łyżeczce wino mocne).

74. *Ol. Terebinth. rectif.* 8·00,
Pulv. gum. ar. q. s.
Aq. dest. 120·00,
Syrup simpl. 20·00.

DS. Co 3 godz. łyżeczkę (po pić mlekiem).

75. *Camphor.* 0·30,
Mixt. gumm. 80·00,
Syrup sacchari 20·00.

DS. Co g. łyżeczkę, (zwłaszcza w formie septycznej).

76. *Aether. acet.* 5·00,
Ol. cinamom. 1·50.

DS. Co 2 godz. 3—5 kropli.

Arak co $\frac{1}{2}$ godz. łyżeczkę, aż do upojenia.

77. *Kali chlorici* 5·00,
Trae myrrhae 15·00,
Acid. carbol. gtts. V.
Mel despum. 20·00,
Aq. dest. 150·00.

DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. po 15 kropli.

Leczenie miejscowe: Okłady z lodu na szyję (w woreczkach gumowych), pić wodę z lodu z dodatkiem wina czerwonego, lody owocowe. Później przy rozpadzie błon lub zgorzeli, przejść do ciepłych okładów i kataplazmów. Inni radzą od początku ciepłe okłady i kataplazmy co $\frac{1}{4}$ do $\frac{1}{2}$ g. zmieniać, pokarmy ciepłe, płukania ciepłe.

Płukania:

Aq. calcis, *Acid. salicyl.* 1 $\frac{0}{10}$,
Ac. boricum 2 $\frac{0}{10}$, *Kali chloric.* 2 $\frac{0}{10}$, *Sublimat.* 1 $\frac{0}{100}$, *Thymol* $\frac{1}{2}$ $\frac{0}{10}$, *Menthol* $\frac{1}{2}$ $\frac{0}{10}$.

Pędzlowania:

78. *Solut. acid. citr. e* 10·00:
 50·00,

Resorcin 3·00. *Glycerin* 30·00.
 S. Co 2 godz. pędzlować.

79. *Acidi salicyl.* 0·50—1·00,
Spir. vini q. s.

Glycerin. 40·00,

Infus. fol. Eucalypti 60·00.

CS. Co godz. zwilżać watą zamoczoną w tym płynie, miejsc a bł. zajęte.

80. *Chinolin* 5 $\frac{0}{10}$ 3 r. dz. zwilżać.

81. *Papayotin* 5 $\frac{0}{10}$ co 3 godz.

82. *Acidi carbol. cryst.*

Acid. citric. cryst.

Trae jodi aa. 3—5·00,

Franz-Cognac 100·00.

MDS. Co 2 godz. pędzlować.

83. *Ferri sesquichl.*

Glycerin. aa. 10 00.

DS. Pędzlowanie 3 razy dz.

Wdychiwania (Inhalacye):

Para wodna

Acid. carbol. 2:500.

Kali chloric. 1 $\frac{0}{10}$.

Aq. calcis aa. c. Aq. dest.

Acid. lacticum 1 $\frac{0}{10}$.

Sublimat 0·02:200·00.

Resorcin 1 $\frac{0}{10}$. *Glycerin* 1:4.

Wdmuchiwanie:

Cukier proszkowany — obficie i często.

Sól kuchenna (grubo nakładać).

Kali chloricum.

Menthol 1·00. *Sacchari pulv.* 20.

2—4 razy dziennie.

Flor. Sulph., *Chin. sulf.* aa. 0·20.

2 razy dziennie.

Jodoform co 3 godziny.

84. *Natr. sozjodolici* 10·00,

Flor. sulphur. 12·00.

Mfp. S. Do wdmuchiwań do ust i do nosa.

Angina Ludovici.

W pierwszym okresie należy zastosować zimne okłady, worek z lodem lub przyrząd chłodzący Leiterra. W następnych dniach okłady wysychające z płynu Burowa:

85. *Alum. crud.* 40'00,

Plumb. acet. 70'00,

Aqu. dest. 600'00.

Filtra. S. do okładów.

W razie znacznego napięcia lub utrudnionego oddychania głębokie i liczne nacięcia.

Do tracheotomii należy być każdej chwili przygotowanym.

Angina pectoris vide Stenocardia.

Angioma.

W przypadkach, w których ubytek po operacji powstały da się w zupełności zeszyć, można guz w całości wyciąć i drogą rychłozrostu przyspieszyć wyleczenie. W przeciwnym razie najlepiej nakłuć guz w kilku miejscach palnikiem termokautera lub galwanokautera. Z innych sposobów rzadziej używanych, czasami odpowiednim jest wstrzykiwanie kilku kropli zgęszczonego kwasu karbolowego lub sześciochlorku żelaza (na pół z wodą), przyczem najlepiej nowotwór przedtem na czas operacji podwiązać, by zapobiedz dostaniu się tych płynów w ogólny obieg krwi. Czasami można również z dobrym skutkiem próbować elektrolizy. Małe guzy można pędzlować dymiącym kwasem azotowym. Wszystkie te sposoby należy kilka razy w odstępach kilkudniowych lub kilkuniedniowych powtarzać. W niektórych przypadkach nadaje się bardzo dobrze podwiązka zwykła lub elastyczna. Mniej odpowiednim jest szczepienie krowianki na tych miejscach, lub stosowanie maści i past żrących.

Anthrax. Carbunculus.

Wczesne, głębokie a liczne nacięcia, sięgające aż do tkanki

zdrowej. Rany powstałe należy wytamponować gazą jodoformową, zwłaszcza bezpośrednio po operacji, gdyż krwotok bywa dość często wcale znaczny. Na gazę należy przyłożyć watę zamaczaną w roztworze octanu glinowego i pokryć takową ceratką nieprzemakalną. Wino i cognac należy podawać w znacznych ilościach, ewentualnie także:

86. *Coffein. citr.* 1'00,

Aq. Cinnamom. 150'00.

S. Co 2 godziny łyżkę.

Celem znieczulenia części schorzałej podczas nacięcia, najlepiej ją zamrozić rozpylaczem Richardsona, napełnionym albo eterem siarczanym albo lepiej:

Hydramyl. Etherem (I. Robbins. et Comp.).

Aphthae.

Pędzlowanie 1% roztworem kali chloricum, 1/2% roztworem acid. tannici, 5% Boraxem.

87. *Succi citri.*

Syrup. rub. Id. āā. 10 00.

S. Do pędzlowań.

88. *Argenti nitrici* 1'00,

Aq. dest. 50'00.

MDS. Do pędzlowania.

Wewnętrznie:

89. *Kali chlorici* 1'00,

Aq. dest. 80'00,

Syrup rubid. 20 00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Uporczywie trzymające się plamy lapisować. Obok tego zimne napoje, podawanie kawałków lodu, unikanie gorących potraw.

Apoplexia cerebri.

Chorego położyć w łóżku, okład lodowy na głowę, jeżeli osoba krwista, dobrze odżywna i jest się obecnym prawie na

początku udaru, to krew puścić najwyżej 500 gramm. lub pijawki za uszami postawić. Nadto dać zaraz lewatywę z octu, mydła, lub soli, chorego rozcierać, synapizma na łydki i piersi. Jeżeli tętno słabe i zapad jest, to podać wino, kawę czarną, kamforę, eter podskórnice. Gdy udar minął, to choremu nie pozwalać wstawać z łóżka, okład lodowy dalej mieć na głowie, stolec regulować, wody gorzkie Hunyady, Janos, Morszyńska, dyetę płynną niepodniecającą, a ze środków wewnętrznych digitalis lub Tinct. Strophanthi dla uspokojenia akcyi serca.

W kilka tygodni po ataku, gdy reakcyja zapalna minie, podawać kali jodatum, elektryzować kończyny porażone, masować, ruchy bierne wykonywać i działać profilaktycznie, usuwając główną przyczynę udaru (najczęściej zmiany w sercu i tętnicach).

90. *Camphor. tritae* 1'00,
Aether sulphur. 5'00.

S. Do wstrzykiwań.

(Jeżeli tętno b. słabe).

Arthritis.

Przedewszystkiem leczenie dyetetyczne. Ograniczenie się co do ilości i jakości pokarmów. Wolno jeść mięso chude, o ile możności białe tylko, mleko, jarzyn sporo, unikać tłuszczów i mącznych potraw, niemniej napojów wyskokowych. Do picia szczawiy, lub zwykła woda z dodatkiem kwasu. Wskazany jest ruch na świeżem powietrzu, wycieczki w góry, gimnastyka. Ze środków wewnętrznych polecają: Tinctura lub Vinum Colchici po 10—20 kropli 3—4 razy na dzień, Natrium salicylicum lub Antipyrina 2—3 grm. p. die.

W razie silnych bólów wciebrać masę z narkotykami, na wewnątrz morfinę lub podskórnice.

Następnie picie wód Giesshübler, Bilińska, Vichy, Kissingen, Ems, Neuenahr, Obersalzbrunn, Dürkheim, Homburg, otyłym zaś osobom można polecić Marienbad, Karlsbad.

91. *Chloroform* 10'00,

Aq. Colonien. 20'00,

Tr. Aconiti 40'00.

DS. Do nacierañ.

92. *Extr. Belladon.* 2'00,

Lanolini 20'00.

MfUng. DS. Weieranie.

93. *Lithii jodat.* 0'25,

Extr. et pulv. gent. āā. q. s.
f. pil. 20.

S. 3—4 pig. dziennie.

94. *Lithii carbonici* 0'10,

Sacchari 0'0,

Mfp. d. tal. dos. 20.

S. 3 pr. dziennie.

95. *Natri dithiosalicyl* 1'00,

D. tal. dos. XII.

S. 3—4 pr. dziennie.

96. *Piperazin* po 0'25 na dawkę, dziennie 1—3 gramm (najlepiej w wodzie sodowej).

97. *Salol*

Aether āā. 4'00,

Collodii 30'00.

S. Pędzlować miejsca bolesne.

Ascaris lumbricoides.

Zabraniać pokarmów mącznych, natomiast mleko, mięso.

98. *Santonin* 0'15 (—0'20),

Ol. ricini 50'00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

99. *Santoni* 0'03,

Calomel. 0'05.

Pulv. rad. rhei 0'15,

Sacchari 0'20,

Mfp. dtur tal. dos. Nr. 6.

S. Rano i wieczór proszek.

- 100.** *Pulv. sem. cinnæ* 4'00,
Pulv. rad. Jalap.
Sacchari āā. 2'00,
Mfp. divid. in dos. Nr. 4.
 DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. proszek.

Po użyciu tych środków, do-
 brze jeszcze dawać duże lewa-
 tywy z wody, lub Sublimatu
 (1:2000).

Thymol 0'10—0'30 pro dosi.

- 101.** *Jodoform* 0'03,
Natri bicarb. 0'25,
Mfp. dtur. tal. dos. Nr. 5.
 S. 3 razy dz. proszek.
 (Na drugi dzień *Ol. ricini*).

Ascites.

W pierwszym rzędzie leczenie
 przyczyn (płuca, serce, wątroba).
 Jeżeli skutkiem A. nadmierne
 napięcie brzucha, duszność, wy-
 konać punkcję. Leczenie oprócz
 uwzględnienia przyczyn, polega
 na środkach moczopędnych, na-
 potnych i czyszczących.

- 102.** *Infus digital. e* 1'00,
 ad 120'00,
Kali acetici
Trae Strophanti āā. 5'00,
Syrup splc. 20'00.
 MDS. Co 2 godz. łyżkę.
 (Przy wadach serca).
- 103.** *Coffeini natrobenzoici* 0'10,
Sacchari 0'50,
Mfp. dtur. tal. dos. 20.
 S. Co 3 godz. proszek.
 j. w.
- 104.** *Infus hbae Adonis vernal*
e 5'00 ad 180'00,
Syrup cort. aur. 20'00.
 MDS. Co 3 godz. łyżkę.
- 105.** *Infus Convallar. majal.*
e 5'00 ad 180'00,
Syrup cort. aur. 20'00.
 MDS. Co 3 godz. łyżkę
 lub *Tra Convall. maj.* 3 r. dz.
 po 10 kropli.

- 106.** *Dct. hb. Equis. e* 15'00,
 ad 180'00.
Roob Juniperi 20'00.
 S. Co 2 godz. łyżkę.

- 107.** *Sparteini* 0'05,
Sacchari 0'25,
Mfp. d. tal. dos. XII.
 S. 4 pr. dz.

- 108.** *Diuretin* 5'00,
Aq. destil. 100'00,
Syrup aurant. 15'00.
 MDS. Co 2 godz. łyżkę.
 Ciepłe kąpiele na 38° C. do
 40° C., poczem zawijanie
 w koce na 2 godziny.
 Przy *Cirrhus. hepat.*, sztuczna
 sól karlsbadzka.

- 109.** *Natri sulphurici* 50'00,
Natri chlorati 3'00,
Natri bicarb. 6'00.
 Mfp. DS. Rano i wieczór ły-
 żeczkę w szklance ciepłej
 wody.

- 110.** *Calomel* 0'10,
Pulv. fol. digit. 0'05,
Sacchari 0'50,
Mfp. d. tal. dos. 10.
 S. 3 pr. dz. (przez tydzień).
 (Równocześnie do płukania
Kali chloric.).

- 111.** *Gi. Gutti.*
Bulb. Scill.
Stibii sulf. aur.
Hb. digit.
Extr. pimpinel. āā. 1'50,
f. pil. Nr. 60.
 DS. 3 r. dz. po 2 pig.

- 112.** *Kali bitartar.* 8—10'00,
 pro die, (jako *evacuans*).

Asphyxia.

Usunięcie przyczyn powodu-
 jących, wyjęcie ciał obcych
 z dróg oddechowych, sztuczne
 oddychanie, drażnienie skóry,
 skrapianie zimną wodą i silne
 wycieranie ciała.

Asthma bronchiale.

Podczas samego napadu, chorożo rozebrać, (zwłaszcza zdjąć stanik lub gorset), umieścić go w przestronnym pokoju, gdzie dobre świeże powietrze. Najprędzej działają narcotica, podać więc na wewnątrz albo Chloralhydrat 2·00 na raz, lub wstrzyknąć morfinę. Mniej pewnie działa morfina na wewnątrz. Polecie choremu podczas napadu mocną czarną kawę wypić, gorące okłady lub synapizma na klatkę piersiową i łydki. Kilka kropli Amylnitritu do wachania, lub Pyridyn na spodeczek wylać i tem oddychać. Polecają też Jodkalium w dawkach 1—3·00 na dzień, lub Extr. Quebracho. Jeżeli narcoticum nie może być podane a wśród napadu słyhać liczne rżenia i świsty i furczenia, to podać należy emeticum n. p. apomorfine podskórnie lub na wewnątrz. W ciężkich napadach można się uciec do narkozy chloroformowej. Po przejściu napadu leczyć chorobę główną i pozostały zwykle po napadzie nieżyt oskrzelowy, odpowiednimi środkami.

113. *Extr. fluid. Quebr.* 25·00.
DS. 2—3 łyżeczki dziennie.

114. *Vini stibiati.*
Tinct. lobel. infl. āā. 5·00,
Morph. mur. 0·10.
DS. 3 r. na dz. po 15 kropli.

115. *Apomorphin chlor.* 0·05,
Acidi hydrochl. dil. gtts. X.
Aq. menth. pip. 50·00,
Syrup 20·00.
MDS. Co 2 godz. ¼ łyżeczki.

116. *Kali jodati* 10·00,
Tinct. Stramm. 8·00,
Extr. liquir. 4·00,
Syrup Scill. 30·00,
Aqu. dest. 250·00.
S. 3 r. dz. łyżkę w szklance wody.

117. *Amylnitrit.* 5·00,
Ol. foenicul. 10·00.
S. W napadzie 2—5 kropli na lać na chustkę i wdychać.

118. *Natri nitrosi* 2·00,
Aq. dest. 120·00.
DS. 4 r. na dz. łyżeczkę.

119. *Kali jodati*
Tinct. lobel. infl. āā. 10·00,
Extr. opii 0·10,
Aq. destil. 180·00.
DS. Co 2 godz. ½ łyżki.

120. *Extr. Bellad.*
Pulv. Belladon. āā. 0·30,
f. pill. Nr. 30.
Na wieczór 1—2 do pigulek.

Radzą też w początku napadu, pędzlować w głębi nosa:

121. *Cocain* 1·00,
Aq. dest. 20·00.

122. *Naphthalin* 1·00,
Sacchari lactis 10·00.
Mfp. DS. W razie rozpoczyn. kaszlu co 2 godz. na koniec noża użyć.

Atelectasis pulmonum.

U noworodków ciepła kąpiel zimne polewanie i nacieranie ciała. Dzieci takie należy często nosić, budzić ze snu, i co godzinę karmić. Obok świeżego powietrza, ogrzewać (gorącemi flaszkami w pościeli). U starszych uwzględnić przyczynę: osłabienie po wyczerpujących chorobach, biegunkach, krzywicy, ugniot przez wysięk w opłucnej, nieżyt w drobnych oskrzelach. W tym ostatnim przypadku, środki wymiotne, wino, cognac, łyżeczka herbaty z paru kroplami rumu.

123. *Liquor. ammon. anis.* 1·00,
Aq. destil. 50·00,
Syrup Sacchari 15·00.
MDS. Co godz. łyżeczkę.

124. *Aetheris sulphur.* 10·00.
DS. Jedną lub 2 krople we wodzie.

Balanoposthitis.

I. Bez równoczesnej phimozy: Moczanie prącia 2—3 razy dziennie w wodzie zwykłej nie bardzo zimnej, lub zmywanie wataż zamoczoną w roztworze $\frac{1}{2}\%$ azotanu srebrowego, 2% kwasu borowego, 1% kwasu karbolowego lub 3— 10% resorcyliny, poczem obsusza się żółdź i napletek watą i zakłada się suchą watę pod napletek. W razie obecności erozji kauteryzuje się je laseczką lapisu lub roztworem tegoż (1:2). Dobrze też działa zasypywanie dermatolu.

II. Przy równoczesnej phimozie: Wstrzykiwanie pod napletek strzykawką z końcem pałeczkatym $\frac{1}{2}\%$ roztworu azotanu srebrowego, 2% kwasu borowego, 5— 10% roztworu resorcyliny. Gdy napletek sinoczerwony, twardy, a z ujścia jego wydziela się ciecz cuchnąca tj. w razie rozpoczynającej się zgorzeli, przecięcie napletka na sondzie rowkowanej, lub circumcizio. Celem wzmocnienia cienkiej błazki wewnętrznej napletka i żółdź i zapobieżenia często powtarzającej się balanoposthitis posypywanie proszkiem:

125. *Tannini puri* 5'00,
Talci veneti 25'00.

Mfp. DS. Posypka.

Blenorrhoea neonatorum zob. Conj. blenorrh. neon.

Blenorrhoea sacci lacrymal.

Po przecięciu lub dylatacyi dolnego punkteiku łzowego wprowadzanie systematyczne co dzień przez 6—8 tygodni sondy Bowmana zaczynając od Nr. I. lub 2-go i dojść do Nr. 4-go.

Blenorrhoea urethrae.

A. U mężczyzn.

a) *B. acuta anterior.*

Hygiena i dyeta: unikanie męczących ruchów czynnych (bieganie, gimnastyka, taniec, nużące przechadzki) i biernych (jazda wozowa lub konna). Unieruchomienie części płciowych zapomocą suspensorium. Zabronić spółkowania, przebywania w towarzystwie kobiet, czytania książek pobudzających fantazję pod względem płciowym. Zwiększoną pobudliwość płciową, objawiającą się erekcjami i polucjami, w nocy osobliwie występującymi, uśmierza się twarde postaniem i lekkim przykryciem, uregulowaniem stolca i podawaniem leków pobudliwość płciową obniżających. (Patrz: Chorda). Pokarmy podawać w mniejszej ilości łatwo strawne, zaparcia stolca niewywołujące, unikać pokarmów pieprzonych, silnie słonych i kwaśnych. Zabronić napojów wyskokowych i kwas węglowy zawierających. Zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo przeniesienia wydzieliny tryprowej do oka. W celu uniknięcia zanieczyszczenia bielizny, zakładanie waty do napletka i obmywanie częste żółdź i napletka kwasem borowym 2% .

Leczenie miejscowe środkami balsamicznymi i ściągającymi stosować tylko wtedy, gdy rzerzączka części przodowej cewki, jest niepowikłaną, tj. gdy niema równoczesnej rzerzączki części tylnej cewki, zapalenia ciał jamistych, gruczołów Cowpera, krokowego, przyjądrzy, lub pęcherza, inaczej bowiem komplikacje te się pogarszają.

Leczenie środkami balsamicznymi na wewnątrz podawanymi

można tylko wtedy zaraz w początku rzerzączki zacząć, gdy takowa nie jest bardzo ostrą. Wstrzykiwania zaś można dopiero wtedy robić, gdy sprawa rzerzączkowa przeszła szczyt, tj. wydzielina traci barwę zieloną, jest mniej gęstą, mleczną. W okresie ostrym przestaje się na leczeniu symptomatycznym. Środki balsamiczne najlepiej podawać w kapsułkach. Neisser leczy rzerzączkę poronnie wstrzykując od początku 3 razy dziennie rozc. azotanu srebrowego 0·01:40·0. Prof. Reverdin używa odrazu iniekcij kali hypermang. 1:5000·0 o ciepłocie 45° C. Iniekcye odbywają się 2 razy dz. w ilości $\frac{1}{2}$ litra przy pomocy irygatora i miękkiego kateteru angielskiego.

126. *Capsularum elasticar. tenentium Bals. Copaiv.* 0·50.
N. 20.

S. 3—6 kapsulek dziennie.

127. *Capsul. elastic. tenent. Ol. Santali* 0·50, Nr. 20.

S. 3—6 kapsulek dziennie.

128. *Balsami Copaive* 30·00.
S. 2 r. dz. po 20 kropli.

129. *Bals. Copaiv.* 30·00,
Spir. nitri 7·50,
Trae Opii 1·50.

MDS. 2—4 r. dz. po 20 kropli.

130. *Bals. Copaiv.* 12·00,
Vitelli ovi tria.
tere c. aq. font. 150·00,
Aq. Cinamom 30·00,
Syrup Cinamom. 15·00.
S. Co 3 godz. łyżkę.

Wstrzykiwania robią się po oddaniu moczu 3—5 razy dziennie, płyn wstrzyknięty zatrzymuje się w cewce 2—4 minut.

131. *Zinci sulphur.* 0·60—1·00,
Aq. dest.
Aq. rosar. āā. 100·00,
Aq. lauroc. 2·00.
DS. Zewnętrznie.

W okresie końcowym używa się:

132. *Cupri sulphur.* 0·05—0·10,
Aq. destil. 100·00.

MDS. Zewnętrznie.

lub środki z osadem:

133. *Zinci sulphur.* 1·00,
Acetatis plumbi bas 2·00,
Aq. rosar. 200·00,
Trae Catechu.
Trae Sydenhami āā. 2·00.

MDS. Zewnętrznie.

134. *Bismuthi subnitr.* 4·00,
Aq. dest. 200·00.

MDS. Zewnętrznie.

Inne środki używane do iniekcji:

135. *Thallinum sulphur.* 1·50—
2·00:100·00.

136. *Kali hypermang.* 0·02—
0·04:100·00.

137. *Zinc. sulphocarb.* 0·40—
1·00:100·00.

138. *Acid. carb.* } āā. 0·2:
Alumen } 100·00.

139. *Argent. nitricum* 0·05—
0·15:100·00.

140. *Zinc. Sozodolicum* 1⁰/₁₀.

Koster poleca gorąco ichtyol do wstrzykiwań w roztworze wodnym 1—10⁰/₁₀.

Gdy choroba mimo wstrzykiwań się przewleka z powodu anaemii lub kaheksyi, podaje się żelazo z arsenikiem, wodę Gubera, Levico lub Roncegno, lub wysyła się chorego do kąpiel żelazistych lub morskich.

Leczenie symptomatyczne w ostrych rzerzączce.

Erekcya i bezsenność (p. Chor. da) Oedema, lymphangioitis: dyeta ścisła, okłady zimne, wcieranie szarej maści. Przy utrudnionem oddawaniu moczu lub zupełnem wstrzymaniu: narcotica, ciepła kąpiel lub zanurzenie

członka w zimnej wodzie, w ostatecznym razie kateter elastyczny. Dla zmniejszenia bólu przy urynowaniu:

141. Extr. Hyosc.

Extr. cannab. ind. āā. 0·02,

Sacchari 0·30,

Mfp. tal. dos. Nr. 12.

S. 3 pr. dziennie.

lub:

142. Dct. semin. lini 500·00,

Syr. Diacodii 10·00.

S. Co 2 godz. łyżkę.

lub według Fourniera:

143. Natri bicarb. 5·00,

Sacch. 30·00,

Succi citri gtt. 2.

S. W litrze wody rozpuścić i w jednym dniu wypić.

b) Blennorh. acuta posterior.

Zachowanie się jak wyżej. W okresie ostrym lecz. symptom. a więc przy haematuryi i parciu na mocz: spokój, dyeta mleczna, sprowadzać wolny stolec, kąpiele letnie, injeke. morfin., czopki z extr. Bellad. Det. sem. lini, gdy haematur. nie ustaje:

144. Liquor. ferri sesquichlor
2·00,

Aq. dest. 200·00,

Syr. simpl. 15·00.

S. Co 2 godz. łyżkę.

145. Extr. secal. corn. 0·10,

Sacchari 0·30,

Mfp. tal. dos. 10.

S. Co 3 godz. proszek.

Dysurią usuwa się czopkami z extr. Bellad., injeke. morfin., w ostateczności kateter elastycz.

Gdy okres ostry minie, parcie się zmniejszy, podać ol. Santali lub bals. Copaivae, gdy chory nie znosi, Natr. Salicyl 2—3·00 pro die. Przy bólu w okolicy lędźwiowej a braku białko-moczu:

146. Terebinth. venetae

Ol. Therebinth. gallic. āā.

gtts. IV.

Dtur. in capsul. gelatin.

tal. dos. 20.

S. 2—3 kaps. dziennie.

Gdy miną objawy podrażnienia: wstrzykiwanie: najlepiej według Diday'a: Kateter Nelatona przy napełnionym pęcherzu wprowadza się tak daleko, by mocz począł odpływać takowym, w tej chwili cofa się kateter o tyle, by mocz przestał odpływać tj. by okienko kat. znajdowało się w części krokowej — teraz wstrzykuje się strzykawką 100 gram. zawierającą przez kateter, posuwając go ostatecznie ku ujściu cewki, następujące rozczyzny:

147. Acidi carbol. 1·00,

Aq. dest. 500·00.

lub:

148. Kali hypermang. 0·20,

Aq. destil. 500·00.

lub:

149. Alum crudi.

Zinci sulphur.

Acid, carbol. āā. 1·00,

Aq. dest. 500·00.

lub:

150. Argent. nitric. 0·20,

Aq. dest. 500·00.

Irygacye powyższe robi się z początku co 3 dzień, później co 2 przy pełnym pęcherzu, by płyn użyty w moczu się rozcieńczył i pęcherza nie drażnił.

c) Blennorh. chron. urethrae.

I. Forma. Mocz mętny z nitkami tryprowemi (obok ograniczonych miejsc zapalnych bł. śl. cewki, znaczna przestrzeń tejże w stanie przekrwienia biernego),

1) W części przodowej cewki.

Przestrzykiwań zaniechać, do-
wewnątrz ol. Santali lub

151. *Pulv. Cubebar.*

Bals. Copaive aa. 3'00,
Extr. gentian. q. s. f. pil.
Nr. 30.

S. 6—8 sztuk dziennie.

Przekonawszy się, że zmętnie-
nie moczu nie pochodzi z po-
drażnienia długotrwałemi wstrz.
poleca się dalej rozczyny:

152. *Zinci sulphur.*

Acid. carbol.
Alum. crudi aa. 0'30,
Aq. dest. 100'00.

lub:

153. *Argenti nitr. (0'10:100'00),*
Cupr. sulph. (0'10:100).

2) W części tylnej cewki.

Irygacye metodą Diday'a lub
kateterem irygacyjnym Ulzman-
na powyższemi rozczynami.

II. Forma. Mocz czysty z nit-
kami trypowemi (ograniczone
powierzchnowe zapalenie bł. śl.),
tu niezbędne zbadanie endosko-
pem

1) w części przodowej cewki,
(najczęściej pars bulbosa). Wkra-
planie rozczyńców argenti nitrici
(przy wybujałościach lub wrzo-
dach) lub cupr. sulphur. (przy
ziarnistościach trachomatycz-
nych) 1:30 zapomocą kateteru
Guyona lub aparatu do pędzlo-
wań Ultzmanna lub irygacye
metodą Diday'a Creolinae (1:500)
Kali hyperm. (1:2000). Schwen-
ger poleca: przy pomocy endo-
skopu zaaplikować 25% rozczyń
resorcyń w glicerynie. Po nader
silnej reakcyi trwającej 4—5
dni przeżegać miejsca choro-
bowo zmienione 20% rozczyńcem
acidi trichloroacetici.

2) Gdy i tylna część zajęta:

154. *Jodoformii 0'05,*

Tannini.

Zinci sulph. 0'02,

Cupri sulph. 0'01,

Arg. nitr. 0'005,

Gelatin alb. q. s. f. supposit.

long. 5 ctm. crass. 0'50 ctm.

Nr. 10.

Czopki te w oliwie umoczone
wprowadza się do cewki, prze-
suwając wzdłuż takowej tak da-
leko, dopóki się jeszcze w mię-
dzykroczu od zewnątrz, wyczuć
dadzą. Najlepszy skutek otrzyma
się przez wkraplanie kateterem
Guyona arg. nitric. 0'10:10'00
lub używa się powyżej podane-
go sposobu Schwengera.

III. Forma. Upośledzenie roz-
ciągliwości cewki, hypertrophia
capitis gallinag., prostatorrhoea
i neurasthenia sexualis.

Gdy naciek w bł. śl. lub pod-
śluzowej jeszcze wiotki, wy-
wiera się ucisk przez wprowa-
dzanie ciężkich sond metalowych
coraz grubszych aż do Nr. 28—30
Chariera, naprzemian z wkrapla-
niem zapomocą kateteru Guyo-
na rozczyńców arg. nitr. lub cupr.
sulph. Gdy naciek zmienił się
już w tkankę łączną wprowadza
się dilatatory. Przy hypertroph.
cap. gallig. prostatorrhoea dobre
usługi oddaje psychrofor.

B. Rzerzączka u kobiet.

1) Pochwy.

W pierwszych 7 dniach ostrego
zapalenia, nie wprowadzać do
pochwy wziernika, chora ma po-
zostać w łóżku, spłukiwać letnią
wodą ropę ze sromu, a między
wargi sromne zakładać watę
Brunsa, na dolną część brzucha
i srom zimne okłady.

Po tygodniu gdy bł. śl. pochwy
mniej drażliwa, przepłukiwać
pochwę kwasem borowym 2%
letnim, 2—4 r. dziennie zapo-

mocą kanki macicznej. Skoro wrażliwość bł. śl. o tyle się zmniejszy, że można wprowadzić wziernik, przepłukuje się pochwę sublimatem 1:1000, a następnie pędzluje roztworem arg. nitrici 1:8 i wprowadza suche tampony z waty Brunsa. Nazajutrz pochwę przepłukać sublimatem, przyczem strupy białe z azotanu srebr. powstałe, się oddzielają. Przepłukiwanie sublimatem odbywa się 8—10 dni 2 r. dziennie. Gdyby obrzmienie bł. śl. pochwy i wydzielanie ropy nie ustawało, kauteryzuje się powtórnie azotanem srebra 1:8.

Do przepłuk. pochwy użyć można obok sublimatu:

155. *Sulph. zinci* 30·00,

Acid. borici 20 00,

Alum. cr. 50·00.

S. Łyzeczkę do litra wody.

156. *Cupri sulphur.* 1·00,

Aq. commun. 200·00.

MDS. Do przestrzykiwań.

157. *Acidi salicyl.* 6·00,

solve in

Glycerinae 100·00,

adde

Aq. fontis 1000·00.

MDS. Na 6 przystrzyknięć, codziennie jedno.

Można tego roztworu używać obok sublimatu. Po każdym przestrzyknięciu zakłada się tampony z waty suchej, by ściany pochwy od siebie oddalić. Tampony te mogą jednak być napojone środkami ściągającymi:

158. *Acidi tannici* 5·00,

Glycerin. 100·00.

DS. Zewnętrznie.

lub posypane proszkiem:

159. *Alumin. cr.*

Amyli Orizae āā. 20·00.

Mfp. S. Zewnętrznie.

160. *Amyli pulveris.* 40·00,

Bismut. subnit. 10·00.

Mfp. S. Posypka.

2) Rzerzączka cewki moczowej:

W ostrym okresie leczenie symptomatyczne. Po ustaniu przykrych objawów podmiotowych: wewnętrznie balsamica i iniekcye z kali hypemang. lub zincum sulphur. (pęcherz mocz. nie powinien być próżny). W dalszym okresie pędzlowanie cewki tinct. jodową, roztworem arg. nitric. 2—5‰.

Blepharadenitis.

Po dokładnem oddaleniu wszystkich strupków (vaseliną i ciepłą wodą) uależy na noc smarować przy zamkniętych powiekach wzdłuż całej szpary powiekowej maść z żółtego, białego (zob. hordeolum) lub czerwonego praecipitatu. Ilość maści jak najmniejsza, wcieranie dokładne, czas kuracyi 4—8 tyg. W przypadkach większych wrzodzików na brzegu powiek, przystuszowanie także cum lapide mitigato z następowem zobojętnianiem roztworem soli kuchennej lub też przypalania galwanokauterem. Przytem leczeni. przeciwżółzowe.

161. *Praecip. rubri* 0·20,

Vaselin. flav. 5·00.

Mfu. S. Wetrzeć w powieki na noc.

Przeciw Blepharitis squamosa radzi Gradle:

162. *Flor. sulphur.*

Resorcin āā. 0·10,

Vaselin. flav. 6·00.

Mfu. S. Jak wyżej.

Blepharospasmus.

Będąc najczęściej jednym z objawów cierpienia spojówki i rogówki (Kerato Conj. phlyctenulosa, ulcera corneae, tracho-

ma etc). przedewszystkiem leczenie przyczynowe, które musi być zastosowaniem do głównej choroby. Oprócz tego smarowanie maści belladonowej na czoło i zapuszczanie kokainy do worka spojówkowego (jeśli naturalnie wrzodów rogówkowych niema), obok zielonego daszka lub ciemnych konserwów; zmniejszają znacznie dolegliwości:

163. *Extracti belladonnae* 2'00,
Ung. cinerei 15'00.

Mf. u. S. Wielkości ziarna grochu wcierać w czoło co 2 g.

164. *Cocaini mur.* 0'20,
Aquae destilat 10'00,
Sublimati corrosivi 0'001.

MDS. Kokain do ocz.
Zakraplacz.

Bronchiectasia.

Świeże i dobre powietrze, jeżeli można na wsi lub w górach. Odżywianie dobre chorego, odpoczynek od zajęć, unikanie kurzu i dymu.

Leczenie nieżyty oskrzelowego. Jeżeli suchy nieżyt, dawać środki wykrztuśne, apomorphin senega, ipecacuanh. stib. sulph. aurant. z dodatkiem morfiny. Jeżeli wydzielina b. obfita, to środki ściągające, jak tanina, alun, plumb. acet. na wewnątrz lub do wziewań, albo też środki balsamiczne, ol. terebinth.

165. *Bals. peruv.* 5'00,
Aq. dest. 120'00,
Syrup amygdalini,
Mucill. g. arab. āā. 10'00.
DS. Co 2 godziny łyżkę.

166. *Balsam. tolutani* 5'00,
Gum. mimos. 3'00,
Aq. dest. 150'00,
Syr. balsamici 20'00.
MDS. Co 2 godziny łyżkę.

167. *Terpinol* 3'00,
Extr. et pulv. liquir. q. s.
Utf. pil. N. 30.
S. 4—5 na dzień.

168. *Mentholi* 2'00,
Sacchari
Gum. arab. āā. 1'00,
Unguent. Glicer. q. s. f. pil.
Nr. 20 obduc. gelatin.
S. 3—4 pig. dziennie.

169. *Terpinhydratis* 3'00,
Extr. et pulv. liquir. q. s.
f. pil. Nr. 30.
S. 3 r. dz. po 1—3 pig.

Wreszcie pobyt nad morzem, lub w miejscach klimatycznych.

Bronchitis acuta.

Wskazane jest przedewszystkiem utrzymanie jednostajnej ciepłoty ciała, u starców leżenie w łóżku, szczególnie wobec Bronchit. capillar. oraz środki odwozzące na klatkę piersiową (bańki suche). Wewnętrznie środki rozdzielające, wykrztuśne, wobec silnego kaszlu suchego, środki odurzające, wody mineralne alkaliczne. — Szczawnicka, Giesshübel, Bilińska, Selterska, Emska.

170. *Natri bicarb.* 5'00,
Morph. mur. 0'10,
Mfp. div. in dos. XII.
DS. 3 proszki dziennie.

171. *Inf. rad. Ipec.* 0'50:200'00,
Syr. cort. aurant. 15'00.
MDS. Co godzina łyżkę.

172. *Inf. Seneg. e* 6'00:200'00,
Syr. simpl. 20'00.
DS. Co godzina łyżkę.

173. *Inf. rad. Quillaye*
e 5'00 ad 200'00,
Liq. ammon. anis. 2'00,
Syr. Seneg. 20'00.
DS. Co godz. łyżkę.

174. *Vini stibiati* 15'00.
DS. 3 razy dnia po 10 kropli.

175. *Natri bicarbon.* 5'00,
Sulph. aur. antimon. 0'24,
Morph. mur. 0'10,
Mfp. div. in dos. XII.
DS. 3 proszki dziennie.

176. Morph. mur.*Apomorphin mur. āā. 0·10,**Aqu. dest. 15·00,**MD. in vitr. nigr.*

S. 3—4 r. dnia po 10 kropli.

177. Apocodein mur. 0·10,*Aq. lauroc. 10·00.*

MDS. Po 10 kropli.

178. Apomorphin hydrochl. 0·05,*Acid. hydrochl. gtts. 10,**Aq. menth. pip. 50·00,**Syr. sim. pl. 15·00.*MDS. Co 2 godz. $\frac{1}{2}$ —1 łyżecz.**179. Pulv. Doveri,***Sacch. albi āā. 3·00.**Mfp. div. in dos. XII.*

DS. 3 proszki dziennie.

180. Extr. hyosc. 0·15,*Aq. dest. 70·00,**Syr. simpl. 20·00.*

S. Co 2 godz. łyżeczkę.

181. Natri benzoici 10·00,*Trae aconiti gtts. 20,**Aqu. amygd. amar. 8·00,**Syrup codeini,**Syrup de Tolu āā. 30·00,**Aqu. dest. 110·00.*

DS. Co 2 godz. łyżkę.

182. Antifebrin 0·25 pro dosi.

Co 2 godziny proszek.

Tłumi B. bardzo szybko.

B. chronica. Dobrze powietrze, unikanie dymu, kurzu, pożywna dyeta, środki lekko przeczyszczające. Jeżeli można, wystać na zimę do cieplejszego klimatu, w lecie pobyt na wsi lub zdrojowiskach. Inhalacye soli (2%) z dodatkiem Ol. terpent. Ol. pini pumilionis. Picie wód Szczawnickich, Giesshübler, Selters., Ems. Expectorantia: Ipeka, Apomorphin. Przy Bronchoblenorrhoea: Ol. Terebinth. dziennie dwa razy po 5—10 kropli z mlekiem, lub w kapsułkach. W razie duszności bańki suche, synapismy.

*B. foetida:***183. Ol. eucalypti 15·00,***Ol. lavandul. gtts. 5.*

S. Po 10 kropli do inhalacyi.

184. Tinct. eucalypti alcoh. 2·00,*Syr. codeini 20·00,**Syr. tolu 20·00,**Aq. 80·00.*

DS. Po łyżeczce wyżyć wciagu 24 godzin.

185. Tinct. benzoës 1·00,*Mixt. gummos. 120·00.*

DS. Jak wyżej.

Dzieciom z nieżytem oskrzeli bez gorączki, woda Szczawnicka lub Selters. z mlekiem, przy częstym kaszlu:

186. Inf. ipecac e 0·10 ad 80·00,*Ammon. muriat. 1·00,**Aq. lauroc. gtts. X.**Syrup simpl. 15·00.*

DS. Co godz. łyżeczkę.

Nieżyty O. na tle krzywicy lub zożzów, wymagają leczenia tranem, żelazem i jodem. Inhalacya z wód alkalicznych, pobyt w miejscach lesistych i górzystych, lub nad morzem. W razie n. O. z gorączką, położyć dz. do łóżka, środki wykrztuśne.

Jeżeli wykrztuszanie skąpe Natr. jodat. (0·50:100 w naparze ipeki) lub: Senega (e 5·00:100·00). Wdychiwania pary. Jeżeli wydzielina obfita, dodać do Senegi Liquor amm. anis. W razie ustania wykrztuszania, sinicy: flor. benzoës, wino mocne, Cognac, ciepłe kąpiele z zimnemi polewaniami. Dzieci małe często nosić na rękę.

187. Dct. cort. chinæ e 3·00*ad 100·00,**Natri jodat. 1·00,**Trae bellad. gtts. duas**Syr. althæae 20·00.*

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Bronchopneumonia u dzieci.

Środki wykrztuśne, kompresy z wystawianej wody co 6 godzin. W razie potrzeby leki podniecające.

188. *Inf. ipec. e 0·20 ad 60·00,*
Liquor. ammon. anis 1·00,
Syrup altheae 20·00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

189. *Inf. ipec. e 0·20 ad 100·00,*
Natri Salic. 1·00,
Syrup altheae. 20·00.

DS. Co godz. łyżeczkę.

Zresztą leczenie podane pod Bronchitis.

Bubo vide Adenitis inguinal.

Carcinoma mammae.

Wczesne wycięcie całego sutka i wycięcie gruczołów pod pachą, a w razie ich nieobecności usunięcie całego tłuszczu pod pachą.

W przypadkach nie nadających się już do operacji, można próbować wstrzykiwań mięszsowych do guza:

190. *Pyoctanini coerulei. 0·1—0·5,*
Aq. dest. 50·00.

S. 1—5 strzykawkę wstrzykn.

W przypadkach owrzodzonych celem odwonienia najlepiej opłukiwać roztworem słabym nadmagnezianu potasowego lub kreoliny:

191. *Kal. hypermang. 1·00,*
Aq. dest. 50·00.

S. Kilka kropli do szklanki wody.

192. *Creolini 80·00.*

S. Kilka kropli do szklanki wody.

Na wewnątrz można podawać:

193. *Vin. Condurango 200·00.*

S. 1—2 łyżeczek przed jedzeniem.

Carcinoma uteri.

W początkach cierpienia: wycięcie macicy częściowe, a najlepiej całkowite. W przypadkach, w których zaś znachodzimy nowotworowy naciek w więzachszerokich, leczenie objawowe: utrzymanie czystości przez wstrzykiwania odrażające:

194. *Kali chloricum 1:100.*

195. *Kali hypermang. 10·00,*
Aq. dest. 150·00.

DS. Pół łyżki na litr wody.

196. *Acidi carbol. 20·00—30·00,*
Aq. dest. 1000·00.

DS. Do wstrzykiwań.

Gdy plamy krwawe:

197. *Acidi pyrolign. crudi 300·00.*

DS. 3—5 łyżek na litr wody do wstrzykiwań.

198. *Creolini 20·00.*

DS. 10 kropli na litr wody.

199. *Ferri sesquichl. sol. 10·00,*
Aq. destil. 1000·00.

DS. Do wstrzykiwań.

Nadto gdy to nie wystarcza, zakładanie gazy jodoformowej do pochwy.

W przypadkach krwotoków, tamponowanie pochwy.

Gdy znaczniejsze wybujałości i częste krwawienie: wyskrobanie nowotworu i przypieczenie cum ferro candente, thermokauterem i t. d. albo środkami chemicznymi silnie żrącymi.

Wreszcie przeciw bólom należy podawać środki kojące: morfinę, opium i t. d. Baczyć na dobre odżywianie, środki gorzkie pobudzające apetyt.

Carcinoma ventriculi.

W przypadkach nie nadających się do zabiegu operacyjnego leczenie jest przypadkowe, zmierzające do podtrzymania sił chorego, zapomocą lekko strawnej a pożywnej diety, oraz usuwa-

nia bólów przez podawanie środków odurzających. Prócz tego wskazanem jest podawanie kwasu solnego, którego żołądek rakowato zwyrodniały najczęściej nie wydziela, oraz podawanie przetworów Condurango, przeciw objawom dyspeptycznym. W razie towarzyszącego rozszerzenia żołądka lub krwotoków (vide: Dilatatio ventriculi, — haematemesis).

200. *Acid. hydrochlor. 3·00,*
Pepsini german. solub de
Rostock 2·00,
Aq. dest. 200·00,
Syr. simpl. 15·00.

DS. Po każdym jedzeniu 2 łyżki zażyć.

201. *Tinct. nuc. vom.*
Acidi hydrochl. āā. 10·00.

DS. Po każdym jedzeniu 15 kropli w szklance wody.

202. *Tinct. chinae comp.*
— rhei vin. āā. 30·00,
Tinct. nuc. vom. 3·00.

S. 3 razy dz. po 15—20 kropli.

203. *Cort. Condurango 15·00,*
Maceraper XII. hor. c. 400·00,
Aq. dest. postea coque ad
reman. 200·00,
dein adde:

Acid. hydrochlor. 3·00,
Syr. simpl. 15·00.

DS. 3 łyżki dziennie.

204. *Vini Condurango 100·00.*
 DS. 3 łyżeczki dziennie.

W razie wymiotów:

205. *Cocaini muriat. 0·20,*
Aq. dest. 10·00.

DS. W razie wymiotów 10 kropli zażyć.

W razie bólów:

206. *Morphii mur. 0·10,*
Aq. dest. 10·00.

MDS. W razie bólów 10 kropli zażyć.

207. *Codeini 0·20,*
Sacch. albi 3·00,
Mfp. div. in dos. X.

DS. W razie bólu jeden proszek zażyć.

Cardialgia.

Znaleść przyczynę bólu i takową starać się usunąć. Najczęściej: *ulcus ventriculi*, *carcinoma ventriculi*, *chlorosis*, i u *hystericzek*, *neurastheników* lub jako *crises gastriques*.

W razie napadu ciepły okład na żołądek, synapizmy na dołek podsercowy, wstrzyknięcie podskórne morfiny, narcotica jak: opium z *bismuth. subnitricum*, *Cocaina 0·01—0·02 p. dosi*, *Beladonna*, *Chloroform* i tp. Nadto uregulowanie diety.

208. *Tinct. opii croc. 5·00,*
Tinct. castor. 10·00,
Tinct. valer. aeth. 15·00.

MDS. 3 r. dz po 10 kropli.

209. *Morphii mur. 0·05,*
Bismut. subnitr. 0·30,
Mfp. dtur. tal. dos. Nr. 10.

S. W razie bólu co 2 godziny proszek.

210. *Extr. Strychni 0·01,*
Bismut. subnitr.
Magnes. carb. āā. 0·20,
Sacch. 0·20,
Mfp. tal. dos. 10.

S. Co 2 godz. proszek.

211. *Tinct. Strychni,*
Tinct. Opii āā. 5·00.

DS. Co 2 godz. po 10 kropli w razie silnego bólu.

212. *Cocain. mur. 0·15,*
Aq. dest. 120·00,
Syr. aurant. 30·00.

S. Co kwadrans łyżeczkę.

213. *Argenti nitrici 0·10,*
Sacchari et tragacant. āā. q.
s. f. pill. Nr. 10.

S. 2—3 pig. dziennie.

214. *Atropin sulphur.* 0·01,
Solv. in aq. destil. q. s.
Extr. et pulv. liquir q. s. f.
pil. Nr. 10.

S. 1—2 pig. dziennie.

215. *Chloroformii* 1·00,
Trae valer. aether. 10·00.

S. Co godz. 10 kropli.

216. *Bismut valerian.*
Bismut subnitr. āā. 2·00,
Extr. nuc. vom. 0·50,
Extr. gentian. q. s. f. pil. 50.
Obduc. gelat.

S. 2—3 pig. na czezy żołądek.

Prad stały z anodą na dołek
 podsercowy, lub też przerywany
 na 6—10 minut. Przepłukiwanie
 żołądka ciepłą wodą na 38—40°.

Cardiopalmus, Hyperkinesis cordis.

Usunięcie przyczyny, najczę-
 ściej stan ogólnie nerwowy, osła-
 bienie, lub zatrucie kawą, her-
 batą i tytoniem. Nadto leczenie
 błednicy, niedokrewności i ogólnego
 osłabienia zwykłymi środ-
 kami. Podczas napadu przy sil-
 nej akcyi serca, okład lodowy
 na serce, spokój, wstrzymanie
 się od wszelkich podniecających
 napitków, natomiast przy słabym
 działaniu serca, podać wi-
 no, cognac, czarną kawę, her-
 batę, nadto:

217. *Coffein citrici* 0·25,
Dtur. tal. dos. N. 4.

S. W razie napadu 1 proszek.

218. *Sparteini sulph.* 0·05,
Sacchari 0·30,
Mfp. d. tal. dos. tres.

S. W razie napadu 1—2 pr.

219. *Theobromin* 0·10,
Sacchari 0·20,
Mfp. dtur. tal. dos. 10.

S. 4—5 pr. dziennie.

220. *Trae strophanti,*
Trae digital. āā. 5·00.

DS. Podczas napadu 10—15
 kropli raz lub dwa dzienn.

221. *Tinct. convall. maj.* 8·00,
Tr. digital. 2·00.

DS. 3 r. dz. po 10 kropli.

222. *Trochisci nitroglyc.* 0·001.
 S. W napadzie pół pastylki
 lub całą zażyć.

223. *Nitroglycerin* 0·20,
Spir. vini 20·00.

MDS. Zacząć od 1 kropli do 10
 kropli 3 razy dziennie (w łyż-
 ce wody).

Osobom zaś nerwowym:

224. *Kali bromat.* 1—2 gram.
 na raz

lub też:

225. *Trae Valerian. aeth.* 10·00.
 S. 3 r. dz. po 15—20 kropli.

Podskórne wstrzykiw. morfiny
 $\frac{1}{2}$ —1 etgrm.

Catarrhus intestinorum acu- tus.

Wskazanem jest leżenie w łóż-
 ku, ścisła dyeta, okład ciepły
 na brzuch i środek przeczysz-
 czający. W razie silnych bólów,
 leki odurzające; w razie gdyby
 po kilku wypróżnieniach po
 środku czyszczącym biegunka
 nie ustąpiła, przetwory makow-
 ca, także leki zawierające i ściąg-
 ające.

Cat. intest. chron.

Leczenie powinno być przy-
 czynowe, uważać należy na
 dyetę, która powinna być lekko
 strawna, na uregulowanie stolca,
 unikanie zaziębień (opaska fla-
 nelowa na brzuch). Woda karls-
 badzka, w razie obstypacyi środ-
 ki lekko czyszczące, lewatywy
 codziennie. Vide: (Obstipatio
 alvi).

226. *Saloli* 0·25,

Laud. puri 0·02,

Mfp. div. in dos. 10.

S. 3 proszki dziennie.

227. *Bismut. salicyl.* 0·25,
Resorcin 0·15,
Laud. pur. 0·01,
Mfp. tal. dos. XII.
 S. 3 proszki dziennie.

228. *Decoct. rad. Salep* 200·00,
Laudani puri 0·05,
Syr. Diacodii 20·00.
 MDS. Co godz. łyżkę.

229. *Mixturae gummos.* 150·00,
Trae Opii simpl. gutt. 20.
 S. Co godz. łyżkę.

230. *Cotoini puri* 1·00,
Emuls. amygdal. 60·00.
 S. Co $\frac{1}{2}$ godz. 2 łyżki zażyć.
 (Środek b. drogi).

231. *Extr. Opii* 0·02,
Tannini 0·10,
Naphtalinae 0·25,
Mfp. d. t. d. XII.
 DS. 2—3 proszków dziennie.

232. *Pulv. Doveri* 1·00,
Extr. Colombo,
Sacch. albi āā. 2·00,
Mfp. div. in dos. X.
 DS. Co 2 godz. proszek zażyć.

C. i. ac. u dzieci.

Dyeta jak przy Dyspepsyi. Bezwarunkowo nie dawać mleka, natomiast woda z białkiem, kawa żółtaziowa, zwracać uwagę na pragnienie, podawać płynny często po łyżeczce np. wodę z rumem, wystawiać wodę sodową i Spir. aether. zwłaszcza, gdy są oznaki zapadu. Unikać lewatyw. Jeżeli nieżyt k. z niestrawności. Calomel (0·03) pepsyna c. ac. mur.

Jeżeli nieżyt przy normalnem trawieniu się pojawi, można z ostrożnością dać Opiata, oseskom 1—2 kropli dziennie.

233. *Trae Coto gtts.* V.
Aq. dest. 50·00,
Trae Opii gtts. duas
Syrup 10·00.
 DS. Co 2 godz. łyżeczkę.

234. *Infus. herb. Melissae* e 5·00
 ad 100·00,

Resorcin 0·30,
Trae laud. gtts. duas
Syr. Sacch. 15·00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

235. *Naphtalin* 0·10—0·20,
Sacchari 0·30,
Mfp. tal. dos. 10.
D. in charta cerata.

S. Co 3 g. proszek w kleiku.

236. *Paulinii sorbilis* 0·05—0·15,
Sacchari 0·15,
Mfp. tal. dos. Nr. 10.
 S. Co 2 godz. proszek.

237. *Saloli* 2·00,
Mixt. gumm. 90·00,
Syr. simpl. 10·00.

MDS. Co 2 godziny łyżeczkę
 (Dla dziecka 6—7 lat).

Ze środków ściągających Trae: Catehu, Kino, Ratanh. (1—2·00: 50·00, Trae Opii gtts II co godz. łyżeczkę). Bismut Salicyl 0·10 pro dosi w połączeniu z Pulv. Doveri 0·01, Resorcin (0·20: 100·00), Natr. benz. (1·00: 100), Thymol (0·15: 100·00 Cognaci gtts. 10). Jeżeli upadek sił występuje, ilość moczu się zmniejsza, kończyny zimne, odstawić leki a pobudzać środkami wyskokowymi, eter, (podskórnie 1·00).

238. *Infus rad. Valerianae* 1·25
 ad 90·00,

Tannin 0·15,
Vini Mader.
Syr. simpl. āā. 15·00.

DS. Co 2 godz. łyżeczkę (dla dziecka 2 lat).

(przy osłabieniu i zapadzie).

239. *Cognac* 30·00,
Aq. lauroc. gtts. V.
Vitelli ad N. 2.
Sacchari 20·00.

MDS. Podawać łyżeczkami.

Cat. int. chron.

Dzieciom sztucznie żywionym podawać rozcieńczone mleko

kozie, odgotowane i ostudzone (3 łyżki mleka, 2 wody, 1 wody wapiennej) taką porcyę co 2 g. lub połowę co godzina, śmietanę Biederta, starszym rosół mocne, Cacao. kawę żołądźkową, herbatę z liści orzecha. Wzbronić tłuszczów, jarzyn. Pokarmy dawać w małej ilości często. W celu zmniejszenia wzdęcia i pobudzenia do lepszego krążenia, okłady Priesnitz. Wody: Kissingen, Carlsbad, Wildungen.

240. *Aq. foeniculi* 75'00,
Bismut subnit. 2'00,
Aq. calcis 6'00,
Syr. flor. aurant. 15'00.
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

241. *Infus. rad. colombo*
 e 0'50:75'00,
Bismut subnit. 2'00,
Syr. flor. aurant. 15'00.
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

242. *Fol. Iugland.* 100'00,
Vini burgund. 500'00,
Macera per 48 horas, adde
Syr. splc. 30'00.
 S. Co 3 godz. 1—2 łyżeczki.

243. *Chinin tannici* 0'05—0'10,
Pulv. Doveri 0'01—0'02,
Sacchari 0'15.
Mfp. tal. dos. N. 10. S. 3 pr.
 dziennie.

244. *Bismut. salic.* 0'05—0'10,
Pulv. Doveri 0'02,
Sacchari 0'15,
Mfp. dt. tal. dos. 10.
 S. 3 proszki dziennie.

245. *Saloli* 0'30,
Pulv. Doveri 0'15,
Bismut. salicyl. 1'00,
Mfp. div. in dos. 10.
 S. 4 proszki dziennie.

Przeciw anaemii woda pyrophosphoran. żelezista.

246. *Tannin.* 0'20,
Aq. dest. 80'00,
Vini Tokay 15'00,
Glycerin. 10'00,
Trae Opii gtts. tres.
 S. Co 3 godz. łyżeczkę.
 (Miész. Gerhardt).

Starsze dzieci mogą używać wody Karlsbadzkiej na ciepło (Sprudel), wina chinowego i przetworów żelaza.

Catarrhus pharyngis zobacz
Pharyngitis.

Catarrhus ventriculi acut.

Ostry niezbyt żołądka tylko wtedy nadaje się lekowaniu, gdy domyślamy się, że w żołądku jest jeszcze treść, która takowy wywołała, dawniej stosowano w takim razie środki wymiotne, a potem przeczyszczające, dziś stosowniej robić przepłukanie żołądka, poczem chory najmniej 24 do 48 godzin musi zachowywać ścisłą dyetę. W razie gdy przypuszczamy, że treści w żołądku niema, wystarcza ścisła dyeta, i tylko gdy cierpieniu temu żołądka towarzyszy tak sama zmiana w jelitach, wskazane są środki przeczyszczające. Zresztą leczenie jest czysto przypadkowe, gdy silne bóle w okolicy żołądka występują, wskazane są środki odurzające, w razie pragnienia: kwaski, woda sodowa, Giesshübelska etc.

Jako środki wymiotne.

247. *Pulv. rad. Ipecac.* 2'00,
Div. in dos. VI.
 DS. Co kwadrans proszek aż do wystąpienia wymiotów.

248. *Tartari stibiati* 0'05,
Aqu. dest. 50'00.
 W 2-ch porcyach w przeciągu 10-ciu minut zażyć.

249. *Apomorphini mur.* 0·10,
Aqu. dest. 10·00.

D.S. Podskór. $\frac{1}{2}$ —1 strzykaw.

Catarrhus ventriculi chronicus.

1. *Acidus*

Dyeta pożywna lekko strawna, z wykluczeniem potraw korzennych, kwaśnych, tłuszczów, jarzyn, napoi wysokokowych i CO_2 zawierających. Wewnętrznie wskazane są środki alkaliczne, woda Karlsbadzka, Vichy lub Szezawnica żr. Magdaleny, przepłukiwania żołądka rozczynikami soli alkalicznych, lub wodą Karlsbadzką, w razie silniejszych bólów w dołku podsercowym środki odurzające.

Cat. ventr. chronicus 2) (mucosus).

Wskazana jest dyeta lekko drażniąca, a więc nieco napojów wysokokowych, kwasków organicznych, mięso w możliwym rozdrobnieniu, najlepiej więc siekane. Wewnętrznie środki gorzkie i kwas solny.

Ad. 1.

250. *Sal. therm. Carolin factic.*
100·00.

S. Na czczo łyżeczkę w $\frac{1}{2}$ szklanki ciepłej wody.

251. *Sal. therm. Carolin originale olla una.*

S. Co dzień na czczo łyżeczkę w $\frac{1}{2}$ szklanki ciepłej wody zażyć.

252. *Natri bicarb.* 15·00,
Magn. carbon. 10·00,
Calcar. carbon. 5·00,
MD. in scatula.

S. 3 razy dnia na koniec noża zażyć.

W razie bólów:

253. *Morph. mur.* 0·10,
Aquae laurocer. 10·00,
MD. in vitr. nigro.

S. W razie bólu 10 kr. zażyć.

254. *Codeini* 0·02,
Natri bicarb. 0·25,
Magnes. carb. 0·10,
Mfp. d. tal. dos. X.
S. W razie bólu 2—3 pr. dz.

Ad. 2.

255. *Trae Amar.*
Acid. hydrochl. dil. aa. 15·00.
MDS. Po każdym jedzeniu 20 kropli w łyżce wody zażyć.

256. *Acid. hydrochl.* 3·00,
Pepsin solub. german. de Rosstock 2·00,
Aqu. dest. 200·00,
Syr. cort. aurant. 15·00.
MDS. Po każdym jedzeniu 2 łyżki zażyć.

Catarrhus vesicae.

W przypadkach ostrych, wienien chory leżeć w łóżku, na brzuch stosujemy okłady wysychające, dyeta ścisła przeważnie mleczna. Napoje wysokokowe należy zabronić zupełnie, natomiast tylko podawać wodę sodową, bilińską, giesshüblerską, Vichy, Kissingen, Rohitsch, orszadę lub odwar siemienia lnia-nego.

257. *Dct. sem. lini e* 10·00 ad
200·00,

Syr. simpl. 20·00,
Tct. opii gtts. XX.

S. Jako napój.

W razie znacznych bólów należy zastosować środki narkotyczne.

258. *Extr. Cannab. indic.*
„ *Hyosciam aa.* 0·40,
Sacch. alb. 5·00,
Mf. pulv. div. in dos. N. X.
S. 3—4 proszki dziennie.

259. *Opium puri* 0·20,
Butyr Cacao q. s. f. l. a.
supposit N. X.
S. 2—3 czopków dziennie.

260. *Morph. mur.* 0·10,
Butyr Cacao q. s. f. l. a.
supposit N. X.
 S. 2—4 czopków dziennie.

261. *Morph. mur.* 1·00,
Glycerin 5·00,
Aqu. dest. 15·00.
 S. Do wstrzykiwań.

W przypadkach przystrych i przewlekłych.

262. *Dect. fol. uvae ursi e*
 20·00 ad 200·00,
Natr. bicarb. 3·00,
Syr. simpl. 20·00.
 S. Co 2 godz. łyżkę.

263. *Arbutin* 5·00,
Div. in dos. N. X.
 S. 3 proszki dziennie.

264. *Natr. salicyl.* 5·00,
Div. in dos. N. X.
 S. 3—4 proszków dziennie.

Rp. Salol 4·00,
Pulv. acac. gummi q. s.
Aq. cinnam. 180·00.
 MDS. Co 4 godz. łyżkę.

265. *Salol.*
Sacch. alb. āā. 5·00,
Mf. pulv. div. in dos. N. X.
 S. 2—4 proszków dziennie.

266. *Ac. tannic.* 0·5—1·0,
Sacch. alb. 4·00,
Mf. pulv. div. in dos. N. X.
 S. 2—4 proszków dziennie.

Jeżeli mocz alkaliczny lub obojętny:

267. *Ac. benzoic.* 3·00,
Aqu. dest. 150·00.
 S. Po zakłóceniu na 2 razy wypić.

268. *Ac. muriat.* 0·50,
Aqu. dest. 100·00.
 S. 3 razy dnia po łyżce.

269. *Ac. benzoic.* 0·30,
Eleosach. foeniculi 5·00,
Mfp. div. in dos. N. X.
 S. 3—6 proszków dziennie.

270. *Ac. phosphor.* 5·00,
Syr. rub. idei 50·00.
 S. Łyżkę do szklanki wody.

271. *Acid. Salicyl.* 8·00,
Liquor. ammon. acet. 60·00,
Aq. dest. 80·00.
 MDS. 3—4 razy dz. po łyżce wody ocukrzanej.

W przypadkach uporeczywych przestrzykiwania pęcherza letniemi rozczynami:

272. *Ac. boric.* 30·00,
Aqu. dest. 1000·00.
 S. S. n.

273. *Ac. carbol.* 5·00,
Aqu. dest. 1000·00.
 S. S. n.

274. *Resorcin* 10·00,
Aq. dest. 1000·00.
 S. S. n.

275. *Argent. nitr.* 0·5—2·00,
Aqu. dest. 1000·00.
 S. S. n.

276. *Acid. salicyl.* 3·00,
Aq. dest. 1000·00.
 S. S. n.

277. *Ac. boric.* 30·00,
Jodoform 10·00,
Aqu. dest. 1000·00.
 S. Przed wstrzyknięciem zakłuć.

278. *Zinc. sulph.* 0·5—1—5,
Aqu. dest. 1000·00.
 S. S. n.

W przypadkach nader uporeczywych i opierających się wszystkim podanym dotąd środkom, należy przystąpić do drenowania pęcherza przez wykonanie urethrotomii zewnętrznej. W razie zatrzymania lub niepełnego wydalania moczu wypada założyć cewnik.

Chalazeon.

Nożykiem kończystym przeciąć od wewnątrz tj. od spojówki w kierunku prostopadłym do

wolnego brzegu powieki, następnie treść, palcami dokładnie wycisnąć. Ściśła antyseptyka. Należy więc wypłukać worek spojówkowy przedtem kwasem borowym lub sublimatem.

279. *Acidi borici* 6·00,
Aqu. dest. ferv. 200·00.
DS. Woda borowa do oka.

280. *Sublimati corrosivi* 0·02,
Aqu. dest. 100·00.
DS. Woda oczna sublimatowa.

Hordeolum. Ciepłe wilgotne okłady (n. p. z bułki maczanej w mleku) a następnie incisia i wypuszczenie ropy. W celu zapobiegnięcia recydywom smarowanie na noc w brzeg powiekowy wolny, następującej maści:

281. *Praecip. flavi* 0·20,
Vasel. fl. 4·00.
DS. Maść na powieki na noc.

282. *Praecip. albi* 0·20,
Vasel. fl. 4·00.
DS. Maść na powieki na noc.

Chloasma.

Występujące w ciąży ustępuje po ukończeniu tejże i nie jest przedmiotem leczenia — zresztą p. *Ephelides*.

Chlorosis.

Przedewszystkiem usunięcie istniejącej przyczyny bladaczki. Pożywienie powinno być b. pożywne, ale łatwo trawiące się. Świeże powietrze, mierny ale systematyczny ruch. Należyte wysypianie się, nieprzeciążanie chorych ani fizyczną ani umysłową pracą. Szczególną mieć uwagę na zaburzenia żołądkowe i jeżeli takowe istnieją, przede-wszystkiem starać się usunąć.

283. *Tinct. malat. ferri*,
„ *Chin. comp.* āā. 25·00.
DS. 2—3 łyżeczek na dzień.

284. *Ferri sulfur. pur.*
Kalii carbon. āā. 15·00,
Gi. Tragacanth. q. s. ut. f.
pill. N. 120.
Consp. pulv. cinam.
DS. 3 r. na dzień 2—5 pig.
(Blauda pigułki).

285. *Ferri sulfur. sicc.* 6·00,
Kali carbon. sic. 5·00,
P. althaeae 3·00,
Mel. crud. q. s. ut. f. pil.
N. 120.
DS. 3 r. na dzień po 2 pig.
(Pigułki Valetti).

286. *Aloes* 2·00,
Ferri pulv. 8·00,
Pulv. rad. rhei 4·00,
Mucil. gum. ar. q. s.
f. pill. pond 0·10,
Consp. cynamom.
S. 2 razy dz. po 3 pig.
Przy równoczesnem zaparciu.
Przy dyspepsyi:

287. *Pepsin germ.* 2·50,
Ferri hydrog. reduct. 1·00,
Extr. nuc. vom. 0·10,
Sacch. lact. 3·00,
Mfp. div. in dos. 10.
S. 3 pr. dz.

288. *Ferri carbon. sacch.*
Sacch. albi,
Natri bicarb. āā. 3·00,
Myrrh. pulv.
Pulv. rad. rhei āā. 2·00,
Mfp. D. ad scatul.
S. 2—3 r. na dzień na koniec noża.

289. *Ferri oxydati sacch.* 10·00,
Pulv. rad. Gent. 5·00,
Extr. Gent. q. s. ut. f. pil.
N. 100.
S. 3 r. po 2 pigułek następnie 3—4 do 10.

290. *Ferri reducti* 100·00,
Magn. carbon.
Succ. liquir. āā. 4·00,
Glyc. q. s. ut. f. pil.
N. 100.
S. 3 r. po 2—4 pig. dziennie po jedzeniu.

291. *Ferri lactici,*
Sacch. albi,
Eleosacch. cinamom. āā. 0·20,
Mfp. D. tal. dos. N. XX. in
charta cerat.

S. 3 r. dz. proszek po jedzeniu.

292. *Pyrophosph. ferri et sodae,*
Sacch. albi āā. 0·20,
Mfp. D. tal. dos. N. XX.

S. 3—4 proszki na dzień.

293. *Liqu. ferri album. 50·00.*
 DS. 3 r. po łyżeczce od kawy.

294. *Chinini ferro-citrici 1·00,*
solve in

Vin. malagens. 200·00.

DS. 3—4 łyżek dziennie.

Obok tego przetwory arsenikalne jak Sol. Fovlera, woda Gubera, Levico, Roncegno 2—3 łyżeczki na dzień, następnie i 2—3 łyżek. Wody żelaziste, Żegiestów, Krynica, Elster, Francensbad i t. p. kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa).

Cholelithiasis.

Leczenie 1-mo samej choroby, 2-do napadu kolki wątrobowej.

Ad 1. Uregulowanie dyety, ścisła uwaga na oddawanie stolca, z dyety wykluczyć należy przedewszystkiem tłuszcze i kwasy, oraz napoje wyskokowe. Prócz tego środki rozpuszczające złoży żółciowe, a tu należą wody mineralne (Karlsbad, Ems, Vichy etc.) i środek Duranda.

Ad 2. Podczas napadu okład ciepły na okolicę wątroby, podskórne wstrzykiwania środków odurzających.

295. *Aether. sulph. 15·00,*
Ol. Terebinth. rectific. 10·00.

DS. 3, r. dnia po 15—20 kropel.
 (Środek Duranda).

296. *Extr. belladon. 0·10,*
Aq. dest. 20·00.

MDS. W napadzie co $\frac{1}{2}$ godz. po 15 kropli.

297. *Morph. mur. 0·10,*
Aqu. dest.

Glycerini āā. 5·00.

MDS. Do podskórnych wstrzykiwań, w jednej strzykawce 0·01 morfiny.

298. *Natri Salicyl. 0·50,*

Extr. bellad. 0·01,

Mfp. dtur. tal. dos. N. 10.

S. 4 proszki dziennie w wodzie sodowej.

Polecają też glicerynę w dawce 20—30 grm. w razie napadu. W dawce 5—15 grm. w wodzie alkalicznej kilka razy dziennie dla zabezp. od napadu.

lub

299. *Ol. olivar. optim. 200·00,*

Cognaci 20·00,

Vitelli ov. Nr. 2,

Menthol. 0·20.

DS. W przeciągu godziny na 2 razy użyć.

Cholera.

W pierwszym okresie choroby wskazane są środki przeczyszczające, a z tych przedewszystkiem Calomel, który ma też mieć znaczenie antyseptyczne dla treści jelitowej. Po kilku obfitych wypróżnieniach, wywołanych środkiem czyszczącym, należy podawać przetwory mawkowe. W przypadku, gdzie są już wymioty, rozwolnienie, odrazu przejść do przetworów mawkowa, chorego w łóżku ułożyć, okłady ogrzewające, środki podniecające: herbata z rumem, cognakiem i t. p. Ciepłe kąpiele b. polecane. Następnie przejść do enteroclysmy według Cantanigo: w wodzie przegotowanej o ciepłocie 30—40° C. rozpuszcza się tanninę 10·00:1000·00; lejkiem Hegara wlewa się do kiszki 1—2 litrów z wysokości 2 metrów. Powtarzać co kilka godzin. Jeżeli pomimo tego na-

stepuje zapad (stad. algidum) stosować hypodermoklyzę z wody destylowanej i sterylizowanej (wodę trzeba w tym celu $\frac{1}{2}$ godziny gotować w kolbie zatkanej korkiem z waty). Na 2 litry takiej wody daje się 6·00 Natri carbon. i 8·00 Natri chlorati ogrzewa do 40° C (zachować ostrożność co do antyseptyki). Zresztą leczenie przypadowe, rozcierania, wysokiem spir. camphoratus; przeciw kurczom inj. morfiny (1—2 etgr.) w razie wymiotów: wino szampańskie, zimna woda sodowa kwaśna, kawa czarna, polykanie lodu, Cocaina. W razie zapadu środki podniecające, inj. podsk. eteru, ol. camphor. Desinfekcja stolców i wymiocin.

Krople Botkina:

- 300.** *Trae chinæ comp.* 25·00,
Chinin mur. 1·00,
Acid. mur. 1·50,
Trae Opii 6·00,
 — *Valer. aeth.* 12·00,
 — *nuc. vom.* 1·50,
Ol. menth. 0·50.

DS. Co godz. 15 kropli.

- 301.** *Acid. hydrochl.* 2·00,
Cocain. mur. 0·12,
Tinct. Opii 2·00,
Aq. dest. 170·00,
Syr. simpl. 30·00.

DS. Co godz. łyżeczkę, dopóki wymioty trwają, później rzadziej (lekarstwo trzymać w lodzie).

- 302.** *Tinct. Cinamom.* 20·00,
 — *Opii croc.* 0·75,
Bismut. subn. 5·00,
Mixt. gumm. 100·00.

S. Co godz. łyżkę (w biegunkach początk).

- 303.** *Tinct. opii croc.* 6·00,
Vini ipecac. 4·00,
Trae Valerian. aeth. 12·00,
Ol. menthae pip. 1·00.

DS. 15 kr. w herbacie z mięty.

- 304.** *Camphor.* 1·00,
Aether. acet. 15·00,
Trae opii 3·00.

DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. 10 kropli.

Dujardin Beaumetz radzi 1) aby chorego ogrzać napojami, kawą, herbatą z rumem i t. p. 2) przeciw biegunce:

- 305.** *Acidi lactici* 10·00,
Syr. simpl. 20·00,
Tinct. cort. aur. 2·00.

Całość wlać do litra wody i co kwadrans 3 łyżki podać 3) Przeciw wymiotom pigułki lodowe lub:

- 306.** *Tinct. valerian.* 5·00,
Laudan. Sydenham. 1·00,
Liquor Hoffmann 5·00,
Aq. menth. pip. gtts. V.

MDS. Po 25 kropli, ile razy przychodzi skłonność do wymiotów lub parcia na stolec.

Bucquoy poleca przeciw biegunce:

- 307.** *Tinct. cannellæ* 10·00,
Bismut. subnitr. 4·00,
Laudan. Sydenham. 0·75,
Mixt. gummos. 100·00.

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

Cholera infantum.

Zapobieganie: w lecie przestrzegać czystości i świeżości mleka; nie odłączać dzieci w lecie (czerwiec, lipiec, sierpień).

W chwili wybuchu choroby: przedewszystkiem nie dawać żadnego pokarmu, nawet piersi aż do ustąpienia wymiotów. Natomiast: chłodną wodę, źródłaną lub sodową, z kilku kroplami Cognacu często (co 10 minut) po łyżeczce. Wino, nie zawsze dzieci dobrze znoszą.

- 308.** *Liquor ammon. anis.*
Spir. aetheris aa. 7·00.

MDS. Co $\frac{1}{2}$ godz. 3—5 kropel (w wodzie ocukrzanej).

309. *Cognaci* 10'00,
Aqu. dest. 180'00,
Syrup sacch. 10'00.

MDS. Co $\frac{1}{2}$ godz. łyżeczkę.

Czarna kawa, herbata z rumem lub cognakiem, szampan co $\frac{1}{2}$ godz. łyżeczkę, pigułki lodowe. Jeżeli niebezpieczeństwo groźne i objawy zapadu występują: kąpiele z gorzycą (50'0 maki gorzycowej do woreczka, wycisnąć w kąpieli), silne nacieranie, dopóki się skóra nie zaczerwieni, później wytarcie i ogrzana pościel. Kąpiel powtórzyć, gdy dziecko zaczyna na nowo stygnąć. Dalej podskórne wstrzykiwania eteru (1—2 strzykawek na 12 godzin).

310. *Flores benzoës* 0'50,
Spir. aetheris,
Trae aromat āā. 5'00.

DS. Co godz. 3—5 kropli.

311. *Acidi benzoici* 1'00,
Camphor. 0'30,
Spir. aether.
Aqu. dest. āā. 5'00.

MDS. $\frac{1}{2}$ strzyk. na raz.

Jeżeli choroba powstała w dalszym ciągu niestrawności, niężyty kiszek, wówczas podawać leki ściągające, opium, kreozot.

312. *Calomel.* 0'01—0'03,
Sacchari 0'20,
Mfp. dtur. tal. dos. N. 10.
 S. Rano i wieczór proszek.

313. *Calomel.* 0'005—0'015,
Saloli 0'10,
Sacchari 0'30,
Mfp. tal. dos. VI.
 S. Co 2 godz. proszek.

313.* *Tinct. Colombo*
Tinct. Cascarillae āā. 20'00.
 S. Co godz. 10—20—30 kropli w herbacie podać.

314. *Trae ratanhae* 1'00,
Aq. dest. 50'00,
Spir. aether. gtts. X.
Kreosoti gttam unam.
 MDS. Co godz. łyżeczkę.

Gdy zaś przyczyna choroby jest nagromadzenie fermentów i choroba wśród zupełnego zdrowia wybuchła, natenczas stosować:

315. *Creosoti gtts. duas*
Aquae cinamomi 90'00,
Syrup 20'00.

DS. Co 3 godz. łyżeczkę.

316. *Natri benzoici* 5'00,
Aqu. dest. 90'00,
Syrup. simpl. 10'00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

317. *Resorcin* 0'20,
Aq. chamomill 60'00,
Syr. simpl. 20'00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

318. *Resorcini* 0'10,
Infus. chamomill. 60'00,
Trae opii gtts. duas.
Syrup simpl. 10'00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

319. *Benzonaphthol*
Sacchari āā. 0'05—0'20.
 S. Co 3 godz. proszek.

Gdy po usunięciu groźnych objawów, pozostanie biegunka, powoli wracać do pokarmów. Zob. *Catarrhus intestin.*

Chorda.

1) Dyeta mleczna. 2) Uregulowanie stolca. 3) Zimne okłady i kąpiele systematycznie przeprowadzane, gdyż chwilowo użyte, działają raczej rozdrażniająco; *Antiphrodisiaca*:

320. *Camphor. rasae* 0'20,
Mixt. gummosae 100'00.
 MDS. Co 2 godz. łyżkę.

321. *Lupulini puri* 0'10,
Sacchari 0'30,
Mfp. dtur. tal. dos. N. 10.
 DS. 3 proszki dziennie.

322. *Lupulini puri* 0'10,
Camphor. rasae 0'01,
Extr. Lupuli q. s. ut. f. pill
dtur. tal. dos. N. XII.
 DS. 6 pigulek dziennie.

- 323.** *Lupulini puri* 0·10,
Morph. mur. 0·005,
Sacchari albi 0·30,
Mfp. dtur. tal. dos. N. 10.
 DS. 3 proszki dziennie.
- 324.** *Camphorae* 2·00,
Opii 0·20,
Extr. et pulv. Gentian. q. s.
f. pill. N. 20.
 S. Wieczór w przeciagu go-
 dziny 4 pig. użyć.
- 325.** *Natri bromati* 1·00—1·50,
Camphorae rasae,
Lupulini āā. 0·10,
Mfp. dtr. tal. dos. N. 10.
 DS. Rano i wieczór proszek.
- 326.** *Antipyrini* 0·50,
Dtr. tal. dos. N. VI.
 DS. 3 proszki dziennie.
- Gdy to wszystko bezskuteczne,
 dajemy iniekcye morfinowe
 (0·01—0·02 pro dosi) lub:
- 327.** *Chloral hydratis* 5·00,
Aqu. dest. 100·00,
Syrup cort. aurant. 10·00.
 MDS. Łyżkę stołową na noc.

Chorea minor.

Dobre odżywianie, pobyt na świeżem powietrzu, gimnastyka lecznicza, chociaż w cięższych przypadkach w samym początku, lepiej dzieci trzymać w łóżku. Zabronić nauki, dozwolić dużo spać. Jeżeli na tle niedokrewności, błędnicy, reumatyzmu; podawać przetwory chininy i żelaza, w ostatnim przypadku, przetwory Salicylu. Kąpiele letnie, siarczane, kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa) (24—26°) prąd stały. Rozpylanie eteru na kręgosłup. W cięższych przypadkach, w celu uspokojenia można podawać chloral, Urethan, Sulfonal, aby wywołać dłuższy sen.

- 328.** *Solut. arsen. Fovleri,*
Trae ferri pomati āā. 5·00.
 DS. 3 r. dnia po 2—3 kropli po jedzeniu. Można postąpić do 5·ciu kropli.
- Wody arsenowe: Gubera 2—3 łyżek, Levico i t. d.
- 329.** *Chloral. hydrat.* 4·00,
Natri bromati 2·00,
Aqu. dest.
Syr. aurant. āā. 25·00.
 MDS. 3 r. dz. łyżeczkę.
- 330.** *Kali jodati* 2·50,
Aq. dest. 150·00.
 DS. 3 r. dz. łyżkę.
- 331.** *Natri bromati* 0·20,
Chinini ferrocitrici 0·10,
Sacch. 0·20,
Mfp. Dtr. tal. dos. N. XV.
 DS. 3 pr. dziennie.
- 332.** *Sulfonali* 0·25—0·50,
Dtur. tal. dos. N. V.
 S. Na noc prosszek.

Prócz tych środków. zachwalano w ostatnich czasach antipyrinę po 2—3 gramów dziennie (0·50 pro dosi) nie widziałem jednak nigdy skutku.

- 333.** *Propylamini* 1·00,
Aqu. menth. pip. 50·00,
Syrup simpl. 20·00.
 MDS. 3 r. dz. łyżeczkę.
 (Przez 3—4 dni).
- 334.** *Exalgin* 1·00,
Solve in spir. menth. pip. 5·00,
Aquae tiliae 120·00,
Syrup aurant. 30·00.
 MDS. 3 r. dz. łyżeczkę.

Chorioiditis.

1. *Exsudativa plastica:*

Ciemny pokój, lub konserwy dymne, zaniechanie pracy na dłuższy czas, środki czyszczące (sól morszynska, Hunyady), systematycznie przeprowadzone wcierania Unguenti cinerei po 2—3·0. Następowo Natrum vel kalium jodatam interne, przez

6—8 tygodni; w razie mętów ciała szklanego, iniekcye podskórne pilocarpini.

335. *Ung. hydrarg. cin.* 30'00,
Div. in part. aequ. N. X.

DS. Jedną paczkę na raz użyć do wcierań.

Przyczem koniecznem jest płukanie ust rozczynem:

336. *Kali chlorici* 10'00,
Dent. tal. dos. N. X.

DS. Jedną paczkę rozpuścić w $\frac{1}{2}$ litra gorącej wody, a po wystygnięciu całą ilość wypłukać w jednej dobie.

W razie ślinotoku i obrzmienia dziąseł, delikatne pędzlowanie tychże:

337. *Tinct. Gallarum* 15'00.

DS. 2 r. dz. pędzl. dziąsła.

338. *Natri jodati* 8'00,

Aqu. dest. 200'00,

D. in vitr. nigro.

DS. Rano i wiecz. łyżkę stoł.

339. *Pilocarpini mur.* 0'20,

Aqu. dest. 10'00.

MDS. Do wstrzykiwań podskórnych.

Rozpoczynać od $\frac{1}{4}$ strzykawki = 0'005 i powoli dojść do pełnej = 0'02, jeżeli chory dobrze poprzednie dawki znosił.

2. *Chorioiditis serosa:*

Bardzo podobna w swych objawach klinicznych do jaskry zapalnej: leczenie zob. jaskrę.

3. *Chorioiditis suppurativa* panophthalmitis. Wypocina ropna w naczyniówce, siatkówce, ciałku szklanem, a później i w komórcie środkowej oka. Obrzmienie powiek i spojówki, lekkie wysadzenie oka ku przodowi; w kom. środk. i źrenicy żółta ropna wypocina, oko twarde, silne bóle w odpowiedniej połowie głowy, brak poczucia na światło. Ropa przebija twardów-

kę i wypływa, objawy zapalne ustępują powoli, a oko przechodzi w zanik (*phthisis bulbi*). Przyczyny: trauma, metastazy przy ropnicy i t. p.

W samym początku lekki ucisk opaską, w rozwiniętej chorobie ciepłe okłady, potem punkcya twardówki, wypuszczenie ropy i opaska. Oko zawsze stracone.

Cirrhosis hepatis.

Leczenie polega na podawaniu środków lekko czyszczących, najlepiej solnych, uregulowanie diety, z której napoje wysokie wykluczyć należy. Skutecznem bywa przeprowadzenie kuracyi karlsbadzkiej lub maryenbadzkiej.

Przeciw nagromadzeniu się płynu w jamie brzusznej, środki moczopędne, gdy te nie są dostateczne i wobec *indicatio vitalis*, nakłócie powłok brzusznych i wypuszczenie płynu.

Jako moczopędne:

340. *Calomelanos* 0'10,

Sacch. albi 0'30,

Mfp. Dtur. tal. dos. N. XV.

DS. 5 proszków dziennie.

Przyczem jednak należy zwrócić baczną uwagę na dziąsła).

341. *Theobromini natriosalicyl.*
(*vel Diuretin*) 0'50,

D. tal. dos. N. XV.

DS. 5 proszków dziennie.

342. *Inf. fol. Digit.* 1'00:200'00,
Liqu. Kali acet. 20'00,

Trae cort. aurant. 25'00.

MDS. Co godz. łyżkę.

343. *Inf. Juniperi* 15'00:200'00,
Syr. simpl. 15'00.

DS. Co godz. łyżkę.

344. *Kali jodati* 10'00,

Aq. dest. 200'00.

MDS. 2 łyżki dziennie.

Colica flatulenta.

Uwzględnić powody: niestrawność, nieżyt żołądka, zaburzenia nerwowe, histeria, zaziębienie, zapalenie błony brzusznej, i t. d. i według tychże, stosować leczenie.

Ciepłe okłady na brzuch, masowanie brzucha, mięta pieprzowa, rumianek, herbata gorąca: Trae laudani 5—10 kropli co parę godzin, wstrzyknięcie morfiny, środki przeczyszcz., lewatywy.

345. *Aq. chloroform. saturatae*,
Aqu. Tiliae āā. 50'00.

MDS. Co godz. łyżkę.

346. *Chloroform* 1'50,
Trae Valerian. aeth. 10'00,
Morphii mur. 0'05.

MDS. Co godz. 10 kropli.

347. *Ol. chamomill. gtts.* 5,
Aetheris 5'00,
Trae chamomill. 20'00.

MDS. Co godz. 10 kropli.

U dzieci w pierwszych tygodn. ach życia, zazwyczaj z powodu niestrawności, u starszych z nieżyty kiszek, zatrzymania stolca, na tle zimnicy, hysteryi, czerwliwości (Helminthiasis).

W pierwszym przypadku uregulować karmienie, nieuspokajać dziecka pokarmem.

W napadzie: wilgotne ciepłe okłady na brzuch, smarowanie ciepłą oliwą, lub maściami aromatycznymi. Wprowadzić do kiszki stolcowej trestkę od lewatywy lub kateter (powyżej sphincter internus). Lewatywy z ciepłej wody z oliwą. Rumianek lub herbata z mięty, łyżeczkami. Starszym dzieciom przykładać płatki nakrapiane rumem, synapizma.

348. *Calomel.* 0'01—0'03,
Sacchari 0'20,

Mfp. dtur. tal. dos. N. V.
S. Co godz. proszek.

349. *Natri benzoici* 0'20,

Aqu. dest.

Aqu. foenicul. āā. 30'00,

Trae laudani gtts. duas.

Syrup simpl. 15'00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

350. *Chloral hydrat v. Urethan*
0'50,

Aqu. dest. 80'00,

Mucilag. gum. arab. 20'00.

MDS. Na 2 lewatywy.

(W razie długotrwałych boleści lub wystąpienia drgawek).

351. *Trae bellad. gtts.* X.

Aq. lauroc. 10'00.

MDS. 10—20 kropli co godz.

(Na tle nerwowem).

Colica saturnina zob. zatrucie ołowiem.

Collapsus.

352. *Acidi benzoici* 1'50,

Spir. vin. rectif. 12'00.

MDS. Wstrzykawkę pełną na raz.

Combustio.

W lekkich oparzeniach, posypywać pudrem, okłady z wody Goularda, Liquor Burowi, zanurzenie w mydlinach. Ból uśmierzają się tryskaniem wody selterskiej z syfona, pędzlowaniem 20% roztworem Cocainy.

Przy oparzeniach drugiego stopnia, przekłuć pęcherze, okłady:

353. *Aq. calcis.*

Ol. lini āā. 50'00,

Thymoli 0'10.

S. Przykładać na szmatkach.

354. *Jodoformii* 5'00,

Vaselini,

Lanolini āā. 25'00.

Mf. unguentum.

DS. Nałożyć maści na grubość noża i okryć papierem gumow. Codziennie opatrunek zmieniać

lub:

- 355.** *Jodoformii* 1·00,
Acid. borici,
Antipyrin āā. 5·00,
Vaselin 50·00.

Mfung. S. jak wyżej.

Posypywanie dermatolem, lub:

- 356.** *Europheni* 3·00,
Ol. olivar. 7·00,
Vaselin. 60·00,
Lanolini 30·00.

Mfung. S. Maść.

- 357.** *Aristoli* 3·00,
Ol. olivar. 20·00,
Lanolini q. s. ad 100·00.
 S. Maść.

Oparzenia trzeciego stopnia, wymagają uwagi na swobodny odpływ ropy. Opatrunek jodoformowy.

Rozległe oparzenie łagodzi się stałą kąpielą 25—30° R. ciepłą wodę zmienia się 2—3 razy dziennie.

Jeżeli po odpadnięciu strupa, ziarnina wybujała, łapisować, lub dać 1% maść łapisową, a w celu usunięcia bólu, zapędzłowac poprzednio Cocaina.

Na rany dobrą ziarniną pokryte stósować maści:

- 358.** *Acidi borici*,
Cerae albae āā. 10·00,
Paraffini
Ol. amygd. dulc. āā. 20·00.

- 359.** *Acidi carbol.* 1·00,
Ol. olivar. 25·00,
Cretae alb. q. s. ut f. pasta mollis.

W razie upadku sił przy rozległych oparzeniach: wino, Li-
 quor ammon. anis. po 5—10 kropli, wstrzyknięcie eteru.

Comedones.

Wyciskać palcami lub zapo-
 mocą kluczyka od zegarka. Wra-
 zie rozdrażnienia skóry, okłady
 z wody zimnej lub ołowiowej,

zmywać środkami alkalicznemi,
 np. Spir. sapo Kalin, smarowa-
 nie przetworami siarki. Pomimo
 zadrażnienia skóry, nie należy
 pudru używać, gdyż łatwo two-
 rzą się nowe.

- 360.** *Natri carbonici* 5·00,
Aq. rosar. 100·00,
Glycerin 50·00,
Extr. mill. flor. gtts. 10.
 DS. Do zmywania twarzy.

- 361.** *Kali carbonici* 10·00,
Aq. dest. 100·00,
Ol. aeth. cinam. gtts. duas.
Ol. aeth. rosar. gtt. unam.
 S. Do zmywania twarzy.

Commotio cerebri.

Spokój, zimne okłady na gło-
 wę. W razie bezprzytomności,
 skrapiania wodą, nacierania, sy-
 napizmy, lewatywy z octem.
 Później środki przeczyszczające.
 W razie zatrzymania moczu, od-
 prowadzić cewnikiem. Dalsze
 leczenie według objawów.

Condylomata acuminata.

Najpewniejszym środkiem jest
 usunięcie drogą operacyjną.
 Kłykciny szypułkowe odcina się
 krzywymi nożyczkami, bezszy-
 pułkowe wyskrobuje się ostrą
 łyżeczką,

Krwotok ztąd powstały mniej-
 szy, tamuje się przyżeganiem
 laseczką azotanu srebrowego,
 osuszywszy poprzednio z krwi
 watą Brunsa, krwotok większy,
 tamuje się Pacqnelinem. Inne
 sposoby następujące:

- 362.** *Acid. nitr. fumantis* 10·00.
 DS. Zwilżać kłykciny zapo-
 mocą przecika drewnianego.

- 363.** *Acid. bichloroacetici* 10·00.
 DS. Ut supra.

- 364.** *Ferri sesquichlorati soluti*
 20·00.

DS. Do pędzlowania.

365. *Plumbi oxydati* 0·25,
33%₀ *Sol. Kali caust.* 7·50.

MDS. Zapomocą lasecz. szklan-
nej napuścić, zetrzeć watą
powstałą przy tem z tkaniny
kłykein żółta masę, i jodo-
form zasypać.

366. *Pulv. frondum Sabinae*,
Aluminis usti,
Cupr. sulph. subt. pulv.
āā. 5·00.

Mfp. Do zasypywania.

367. *Resorcini* 5·00—10·00,
(20—40%₀).

Glycerini,
Vasellini flavi āā. 12·50.

Mf. Pasta. S. Raz dziennie
smarować.

Codylomata subcutanea.

1. Wygnieciecie przy pomocy
paznokci palców wielkich.

2. Wyskrobanie ostrą łyżeczką
i przyłożenie waty Bruns na
miejsca krwawiące.

3. W razie większej liczby
obok siebie gęsto ułożonych
kłykein, okład z mydła szarego.

Congelatio.

W świeżych przypadkach na-
cieranie śniegiem lub zimną
wodą, dopóki odmrożona część
ciała do właściwej ciepłoty nie
wróci. Przestrzegać wprowadze-
nia do miejsc ogrzanych. Poda-
wać napoje wysokowe. Pęche-
rze otworzyć i przyżęgać łapi-
sem lub opatrzyć:

368. *Argenti nitrici* 0·30,
Lanolini,
Vaselin āā. 15·00.

S. Maść do opatrunku.

Jeżeli tkanka skóry obumarła,
opatrunek jodoformowy, maść
borowa, okład z wody Goularda
lub:

369. *Alum crudi* 1·00,
Plumb. acet. bas. sol. 5·00,
Aqu. dest. 100·00.

DS. Do okładów.

Odmroziny zob. Perniones.

Conjunctivitis blennorrhoeica acuta (gonorrhoeica).

Groźne cierpienie, niebezpie-
czeństwo zniszczenia rogówki
wielkie. Przedewszystkiem za-
bezpieczyć dotąd zdrowe oko,
przez następujący opatrunek:
Zapomocą 4 mm. szerokich pas-
ków kitajki angielskiej lub Empl.
animale, zalepić szczelnie szpa-
rę powiekową, łącząc górną po-
wiekę z dolną, pionowo przyle-
pianymi szczelnie do siebie
przystającymi paskami. Naste-
pnie zagłębienia oczodołu szcze-
gólnie okolicę woreczka łzowego
wysłać watą Bruns, całość zaś
pokryć odpowiednio dużym o-
walnym kawałkiem płótna, który
przylepia się na około zapomocą
colodionu do brzegów oczodołu
i powleczone grubą warstwą
tegoż, daje pewną osłonę przed
dostaniem się wydzieliny z cho-
rego do zdrowego oka. Opatru-
nek ten należy co dzień zmieniać.

Dopóki jest I-szy okres infil-
tracyi (powieki silnie obrzmiałe,
przy dotknięciu twarde, skóra
na tychże, śluzowa, napięta, połys-
kująca, wydzielina ze szpary
powiekowej skąpa, brudnowo-
dnista, spojówka szarawo czer-
wonawo naciekła) jedynie sil-
ne przepłukiwanie (co 1/2 godz.)
worka spojówkowego, rozczyn-
nem sublimatu lub boru, ciągle
okłady lodowe na oko, pijawki
(4—5) na skroń i purgantia, są
wskazane obok leżenia w łóżku
i zaciemnionego pokoju.

W okresie II-gim (barwa skóry
powiekowej żywsza, napięcie
też ustąpiło miejsca licznym
fałdom w teży, spojówka wię-
cej soczysta i czerwona, wy-
dzielina obfita ropna) natenczas
wolno dopiero przejść do tu-
szowania spojówki 2—3% roz-

czynem lapisu; raz na dobę wystarczy, powtórzyć wcześniej nie wolno, aż strup z poprzedniego lapisu w zupełności, oddalił się. Przytem dalsze częste przemywanie borem lub sublimatem. Lodowe okłady, głównie przez 2 godziny po kauteryzowaniu. Leczenie to stosować do zupełnego wyleczenia. W razie zajęcia rogówki 1% atropin. (zob. Iritis) 2 razy dzień. obok powyższego leczenia, skrupulatne obmywanie rąk lekarza w 5% karbolu.

370. *Argenti nitr. cryst. 1:50,*
Aqu. dest. 50:00.

DS. Lapis 3% do rąk lekarza.
Pędzelek.

371. *Acidi carbol. cryst. 10:00,*
Aqu. dest. 200:00.

MDS. Karbol 5% do mycia rąk lekarza.

Conjunctivitis blennorrhoea neonatorum.

Początkowo b. ogłędne i lekkie tuszowanie spojówek powiekowych 1% rozczyntem argenti nitr. z chwilą jednak, gdy wydzielina staje się obfitszą i więcej ropną, a spojówka więcej rozpulchnioną, należy tuszować energicznie 2—2½% rozc. arg. nitr. — zwykle starczy raz dziennie. Jeżeli jednak po ostatniem tuszowaniu strup jeszcze nie oddzielił się, należy wstrzymać się z tuszowaniem lub wykonać to b. ogłędnie, omijając miejsca, gdzie się strup znajduje. Po każdym tuszowaniu przez 2 godziny okłady lodowe na oczy. Od samego początku choroby pilne (co ½ godz.) przepłukiwanie worka spojówkowego 3% rozczyntem kw. borowego, w celu dokładnego usunięcia wydzieliny. Z chwilą ustępowania objawów zapalnych, lapisować coraz słabiej, w końcu przejść do je-

dnego ze zwykłych Collyriów. Komplikacya ze strony rogówki nie zmienia powyższego postępowania. Baczyć pilnie na odżywianie dziecka.

Zapobiegawczo należy przed samym porodem przepłukać pochwę rodzącej kw. borowym, dziecku zaraz po urodzeniu zapuścić po jednej kropli 1% rozczyntu lapisu do obu ocz i nie obmywać powiek i twarzy wodą w pierwszej kąpieli, lecz szmatką zmaczaną w wodzie borowej.

Conjunctivitis blennorrhoea chronica.

Leczenie stosować w zupełności według wskazówek przy: *Conjunctivitis trachomatosa.*

Conjunctivitis catarrhalis.

W przypadkach lżejszych podostrych i chronicznych, zapuszczanie 3 razy dziennie Collyrium przez 4—5 tygodni, zmieniając toż po 2 tygodniach na inne, oko bowiem łatwo przyzwyczaja się i lekarstwo działać przestaje. W przypadkach ostrych i silniejszych chronicznych: tuszowanie spojówki powiekowej przez kilkanaście dni rozczyntem 1% lapisu, a potem Collyrium. Obmywanie powiek ciepłą wodą rano i wieczór, unikanie kurzu, dymu, silnego gorąca, zakazanie pracy wieczornej, regularny tryb życia, przebywanie na świeżem powietrzu. Wrzód rogówkowy kataralny nie przeciwskazuje użycia lapisu.

372. *Acidi borici 1:50,*
Aqu. dest. 50:00,
Zinci sulphur. 0:20.

MDS. 3 raz. dzień. zapuszczać na dolną powiekę 2 krople. Zakraplacz.

373. *Argenti nitr. cryst. 0'25,*
Aqu. dest. 25'00,
D. in v. n.
 DS. Lapis 1 $\frac{1}{2}$ do rąk lekarza.
 Pędzelek.

374. *Sublimati corrosivi 0'01,*
Aqu. dest. 50'00,
Trae Opii crocat. gtts. 3.
 MDS. 3 r. dz. zapuszczać.

375. *Collyrii adstr. lutei 15'00,*
Aqu. dest. āā. 5'00,
D. in v. n.
 S. 3 r. dz. zapuszczać.

Conjunctivitis crouposa.

Przebieg zazwyczaj lekki, komplikacje rogówkowe rzadko występują. Przepłukiwanie częste worka spojówkowego kwasem borowym; w razie silniejszego obrzmienia powiek zimne okłady. Po oddzieleniu się błon z nastaniem drugiego okresu, przejść do lekkiego łapisowania 1—2 $\frac{1}{2}$ roztynem Arg. nitrici; w końcu jedno ze zwykłych Collyriów na katar ocz. Zapuszczanie Collyrium z kw. borowego i cynku (zob. Conj. catarrhalis).

376. *Acidi borici 6'00,*
Aq. dest. 200'00.
 DS. Woda oczna.
 Zakraplacz.

Conjunctivitis diphtheritica.

Najcięższe cierpienie oczne, niszczące zwykle zajęte oko. U nas bardzo rzadkie. Zwykle równocześnie z dyfteryą gardła i nosa.

Szczelne zamknięcie odpowiednią opaską oka zdrowego (vide Conjunct. blennorrhoeica); przemnywanie częste oka chorego roztynem sublimatu lub kwasu borowego, zasypywanie jodoformem i smarowanie powiek wasełina, lodowe okłady i zapuszczanie 3 razy dziennie atropinu (zob. Iritis).

Skoro błona śluzowa z nacieków dyfterycznych się uwolni ostrożnie tuszowanie 1 $\frac{1}{2}$ lapisem raz dziennie. Liczne blizny spojówkowe wymagają po ustąpieniu choroby, następowego leczenia.

377. *Jodoformii subtiliss. pulv.*
 10'00.

DS. Proszek oczny.
 Pędzelek.

378. *Argenti nitr. cryst. 0'25,*
Aqu. dest. 25'00,
D. in v. n.

DS. Do pędzlowania ocz do rąk lekarza.
 Pędzelek

379. *Sublimati corrosivi 0'02,*
Aqu. dest. 100'00.

DS. Woda oczna sublimatowa.

380. *Acidi borici 9'00,*
Aqu. dest. 300'00.

DS. Woda oczna borowa.
 Zakraplacz.

381. *Vaselinæ flavæ 15'00.*

DS. Maść do smarow. powiek.

Conjunctivitis follicularis.

Na pierwszy rzut oka podobna do jaglicy, różni się jednak swą lokalizacją: usadowienie bowiem follikułów, znajduje się przeważnie w dolnym załamku spojówki dolnej powieki, jaglicy zaś głównie na powiece górnej.

Leczenie miejscowe w lżejszych przypadkach polega na zapuszczaniu do worka spojówkowego 3 razy dziennie Collyrium plumbi acetici, w cięższych przypadkach, tuszowanie silniejszym roztynem powyższego środka. Kuracya 5—6 tygodni.

Podstawa żółtowa wymaga również uwzględnienia (zobacz Conjunct. phlyctenulosa).

382. *Plumbi acet. basici perf. neutr. 0.25,*

*Aqu. dest. 25.00,
Filtr. exactissime.*

DS. 3 r. dz. po 3 krople do obu ocz zapuszczać.

(Lekarstwo ma być przeźroczyste jak woda i silnie zatykanie. Po tygodniu świeże powtórzyć).

383. *Plumbi acet. basici perf. neutr. 0.50,*

Aqu. dest. 25.00.

DS. Do pędzlowania ocz, do rąk lekarza.

Pędzelek.

(Po zatuszowaniu należy dokładnie spłukać lekarstwo ze spojówki wodą).

Conjunctivitis scrophulosa (phlyctenulosa).

W przypadkach zwykłych, zasypywanie raz dziennie w małej ilości (lepiej zamała niż za dużo) kalomelu (pro oculis), lub wprowadzanie maści z hydrarg. praecip. fl. v. album. (zob. hordeolum) pędzelkiem do worka spojówkowego z następstwem massowaniem palcem przez powiekę, dotąd, dopóki spojówka powiekowa nie utraci chorobowego przekrwienia (zaczerwienienia).

W razie komplikacji z katarrem, (silne zalepianie się powiek rano, liczne nitki śluzowe w załamku dolnym, rozpulchnienie spojówki widoczne), lapisowanie 1% roztworem lapisu raz dziennie, a później dopiero Calomel. W razie komplikacji ze strony rogówki należy ostrożnie zasypywać calomel, jeżeli jednak oko zaczerwienia się silniej, lub też phlyctena dotąd szarawa, przybiera zabarwienie więcej żółtawe lub też powiększa się, zaniechać natychmiast dalszego zasypywania i leczyć dalej, jak

zwykły wrzód rogówki (zobacz Keratitis suppurativa).

Po zabliznieniu wrzodu rogówkowego przejść do kalomelu.

Keratitis phlyctenulosa maligna, wymaga również leczenia takiego, jak wrzody rogówkowe ropne.

Przytem nie zaniedbać leczenia przeciwozłozowego: Dużo świeżego powietrza, unikanie wilgotnego, dusznego, ciemnego mieszkania, dobre odżywianie (mleko, mięso, jaja, mało mącznych pokarmów, pedantyczna czystość ciała i głowy, hartowanie racjonalne dziecka, zimne zmywania wodą, gimnastyka). W porze zimowej tran rybi wewnętrznie, w lecie wysyłanie do zakładów kąpielowych (Rabka, Rymanów, Iwonicz).

Podczas używania wody zawierającej jod, środków rtęciowych używać nie można. Również dopóki zapalenie ocz nie jest usuniętem, kąpiele pełne wstrzymać należy na razie. W razie światłowstrętu zobacz Blepharospasmus.

384. *Calomel. v. h. p. et subt. pulv. 10.00.*

DS. Proszek oczny do rąk lekarza.

Pędzelek.

Conjunctivitis trachomatosa (aegyptica, Trachoma).

Choroba bardzo u nas częsta, szczególnie między ludnością żydowską i klas ubogich, wymaga wiele cierpliwości tak ze strony lekarza, jak i chorego do zupełnego wyleczenia. Występuje głównie w formie ostrej, i chronicznej.

Ostra forma wymaga codziennego tuszowania spojówek powiekowych 2% roztworem lapisu; skoro zaś objawy zapalne (obrzemienie powiek, znaczna

wydzielina, silne zaczerwienienie i obrzmienie spojówek) w znacznej części ustapia, przejść należy do tuszowania codziennego cum cupro sulphurico in substantia. Siny kamyk powinien być należycie wygładzonym.

Chroniczna forma wymaga od początku tuszowania sinym kamieniem, chyba że nadmierna sekrecja śluzu, czasowo lapisu wymaga.

Obok powyższego leczenia, należy choremu przepisać sublimat 1:5000·00 lub też 1% roztwór Creoliny, aby kilka razy dziennie zapuszczał po kilka kropel do worka spojówkowego. W razie wrzodów rogówkowych, lepiej jest tuszować lapisem, a po zabliznieniu się tychże: Cuprum sulphuricum.

Pannus nie wpływa zupełnie na wybór lapisu lub cuprum, decyduje tylko w tej mierze wyż przytoczona okoliczność.

W przypadkach, w których znaczniejsza jest ilość ziarn jaglicowych, przyspiesza się znacznie leczenie, wygniatając (na jednym posiedzeniu lub też kilka dni z rzędu) ziarna jaglicowe; rękoczyn ten najdogodniej jest wykonać palcami: Po odwinieciu odpowiedniej powieki wprowadza się jeden wielki palec pod fałd powiekowy, drugim zaś wielkim palcem, uciska się z góry; naturalnie zabieg ten wykonywa się powierzchniami paznokci.

Skrupulatna czystość oczu, unikanie wpływów szkodliwych (zob. Conj. catarrh) objaśnienie chorego, że choroba łatwo innym udzielić się może; powinien więc mieć osobny ręcznik i pościel do spania.

W razie zajęcia tylko jednego oka, baczna uwaga, aby na dru-

gie choroby nie przenieść. Kuracja trwa czasem rok i dłużej.

Po zupełnem usunięciu objawów chorobowych, przepisać roztwór Cuprum sulph. do domu, i przedstawianie się lekarzowi raz na miesiąc przez czas dłuższy.

385. *Argenti nitrici cryst.* 0·50,
Aqu. dest. 25·00.

S. Lapis 2% do rąk lekarza.
Pędzelek.

386. *Cupri sulph.* 1·00,
Glycerini 15·00.

S. Raz dziennie zapuszczać po 2 krople do oka chorego.
Zakraplacz.

Contusio.

W pierwszych dniach po uderzeniu, zimne okłady (worek z lodem) i spokój; po tem należy część chorą masować a po dokonaniem masowania najlepiej owinać bandażem flanelowym.

Convulsiones vide Eclampsia.

Coryza.

387. *Acid. carbol. pur.* 5·00,
Ammon. liq. 5·00,
Aq. dest. 15·00,
Alcohol 10·00.

MDS. Puścić kilka kropli na bibułkę i wachać.

388. *Bismut. subnitric.*
Benzoin pulv. āā. 6·00,
Acid. boric. pulv. 4·00,
Menthol. 0·20.

Mfp. S. Do zażywania.

Coxitis.

W początkach cierpienia należy zalecić absolutny spokój: pacjent powinien leżeć bez przerwy na wznak na twardym materacu. W okresach późniejszych choroby, w których występuje skłonność do patagognomicznego ustawienia kończyny, wypada założyć opatrunek

naciągający z przylepca. Jak długo sprawa zapalna trwa, nie wolno na kończynę chorą następować: jeżeli się tedy pozwoli choremu chodzić, to tylko o kulach, z podwyższonym obcasem i podeszwą po stronie zdrowej, lub w aparacie Taylora. Kontraktury pozostałe po zapaleniu stawu biodrowego, można usunąć albo forsownie (zabieg o tyle niebezpieczny, że często spowodować ponowne zaostrzenie się całej sprawy), lub zwolna w aparacie naciągającym. W przypadkach opierających się leczeniu konserwatywnemu, wykonujemy resekcyję stawu biodrowego. Rozumie się samo przez się, że podczas całego leczenia energicznie także należy działać przeciwko ogólnemu zakażeniu żółzowemu przez dobre odżywienie, świeże powietrze, kąpiele jodowe i t. d.

Cystitis vide catarrh. vesicae.

Dacryocystitis.

W pierwszych dwóch dniach, założenie silnie uciskającej opaski może chorobę powstrzymać, przyczem bardzo uważać należy, aby oko nie uległo równocześnie uciskowi. Skoro jednak uczuć się daje już choćby niewyraźna fluktuacja, należy przejść od razu do ciepłych wilgotnych okładów, a skoro fluktuacja jest wyraźną, wykonać przecięcie woreczka i wypuścić ropę. Po należytem przestrzykaniu borem lub sublimatem wprowadzić cieniutki zwitek gazy przez ranę do woreczka a koniec jej wystający na zewnątrz, przylepić do skóry poniżej otworu kitajką angielską, nie zalepiając ranki. Procedurę tę co dzień powtórzyć,

aż do zupełnego wykleśnięcia całej okolicy woreczka.

Następnie dopiero przejść do wprowadzenia sondy Bowmanna przez punkt łzowy, (zob. Ble-norrh. sacci lacrim.) nie wprowadzając już gazy, ranka zaś sama się zagoi.

Decubitus.

Największy nacisk należy położyć na profilaxę. We wszystkich przypadkach chorób obłożnych, dłuższy czas trwających, należy się postarać o to, by chorzy leżeli na materacach, na których prześcieradło najmniej-szych nie śmie robić fałdów. Jeżeli to tylko jest możliwem, należy choremu zalecać zmianę położenia kilka razy na dzień. Jeżeli mimo przestrzegania tych ostrożności wystąpi na okolicy kości krzyżowej zaczerwienienie, to należy tę część ciała kilka razy w ciągu dnia zmywać octem, sokiem z cytryny lub jakimś przetworem wysokokowym (wódka francuską), chorego zaś ułożyć na materacu wodnym. Jeżeli wystąpi otarcia lub głębsze rany, należy przyłożyć albo opatrunek jodoformowy albo jedną z podanych poniżej maści lub posypek. Skoro się wrzód oczyści, przykładany masć lapisową. W przypadkach rozległych odleżyn, najlepiej ułożyć chorego na stałe w kąpieli wodnej:

389. Ac. boric.

Ol. olivar.

Cerae. alb. āā. 15'00,

Ung. simpl. 100'00.

Mfung. S. Maść.

390. Zinc. oxyd. 10'00,

Ung. simpl. 100'00.

Mfung. S. Maść.

391. Ac. boric.

Zinc. oxyd. āā. 5'00,

Ung. simpl. 100'00.

Mfung. S. Maść.

392. *Emplastr. cerussae* 100·00.
S. Plaster.

393. *Plumb. tannic.* 10·00,
Ung. simpl. 30·00.
Mfung. S. Maść.

394. *Ac. tannic.* 2·00,
Plumb. acet. bas. 10·00,
Ung. simpl. 50·00.
Mfung. S. Maść.

395. *Camphor.*
Spir. vin. āā. 2·00,
Mucill. gum. arab. 6·00,
Vin. generos. 90·00.
S. Do zmywania rany.

396. *Argent. oleinici* 50·00.
S. Do posypywania.

397. *Argent. nitric.* 1·00,
Bals. peruv. 10·00,
Ung. simpl. 100·00.
Mfung. S. Maść.

Defluvium capillorum vide Alopecia.

Delirium tremens.

Unikać leczenia osłabiającego, upustów krwi, dyeta pożywna, oraz nie wielkie ilości piwa lub wina. Uspokoić chorego środkami nasennymi: opium, chloral, (kaftan tylko w celu ochrony, przeciw uszkodzeniom, zwłaszcza po operacjach).

Chloral można podawać po 3, 4 lub 5 gram. jeżeli nie ma wady serca. Jeżeli chloral nie działa, lub wada serca istnieje: Tra. opii w lewatywie, lub Extr. opii 0·03 podskórnice.

398. *Amylenhydrat.* 6·00,
Aqu. dest. 60·00,
(*Morph. mur.* 0·02).
Extr. liquir. 10·00.
DS. Na noc połowę użyć.

399. *Paraldehydi* 4·00,
Aqu. dest. 80·00,
Rum,
Syrup simpl. āā. 10·00.
DS. Połowę na raz użyć.

400. *Tinct. capsici* 5·00,
Aqu. dest. 180·00,
Syrup aurant. 20·00.
DS. Co 2 godz. łyżkę.

Diabetes insipidus.

Pożywna dyeta, mierne użycie napojów. Leczenie hydropatyczne, pobyt w górach. Kąpiele morskie.

401. *Infus Valerian e* 5·00,
ad 100·00,
Natri bromati 1·00,
Syrup 15·00.
MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

402. *Codeini phosphor.* 0·10,
Syr. simpl. 30·00.
MDS. 3 razy dz. łyżeczkę.
(Dla dziecka 10 lat).

Diabetes mellitus.

Tylko pożywienie złożone z mięsa, jaj i mleka, to ostatnie jeżeli procent cukru nie wysoki. Tłuszcze nie są zabronione.

Chleba najwyżej 100—150 grm. na dzień, z jarzyn wolno szpinak, sałatę, zielony groszek i fasolkę, kalafior, szparagi, kapustę; z mącznych jedynie trochę ryżu. Do picia: kawa, herbata osłodzona sacchariną, która nawet w większych ilościach nie szkodzi, kwaśkowate wina, wódka, cognac, woda.

Z lekarstw najlepiej jeszcze działa woda Karlsbadzka, potem Vichy, Neuenahr, spore dawki opium do 1·0—2·0 pro die.

403. *Acid. lacticum* 5·00—10·00
pro die.
Acid. carbol. według Ebsteina:

404. *Acid. carbol.* 5·00,
Aqu. dest. 150·00,
Aqu. menth. pip. 50·00.
DS. 3—4 łyżeczki na dzień.

405. *Antipyrina* 2—3·00 pro die.

406. *Extr. fol. Myrtillor* 5·00,
Extr. et pulv. Gentian q. s.
f. pill. N. 50.

S. Od 3 pig. dzien. do 10—12.
 lub (Pill. Myrtill. Jasper).

407. *Jodoformii*
Extr. lactucae sativ. āā. 1·00,
Cumarin 0·10,
M. ut f. pill. N. XX.
 S. 2—3 pigułki na dzień.

408. *Pilocarpini mur.* 0·20,
Aqu. dest. 10·00.
 DS. Podskórnice $\frac{1}{2}$ —1 strzyk.
 Do osłóżenia płynów używa
 się pigułek z saccharyny.

409. *Saccharini* 3·00,
Natri carb. sicc. 2·00,
Manniti 50·00,
f. pill. N. 100.
 S. Pigułkę na $\frac{1}{2}$ —1 szklanke
 płynu.

W ryzine coma diabeticum środ-
 ki podniecające, wstrzykiwanie
 eteru, ciepła kąpiel ze zlewa-
 niami głowy zimną wodą.

Dilatatio ventriculi.

W przypadkach, gdzie przy-
 czyną cierpienia jest zwężenie
 odźwiernika czysto bliznowate,
 czy nowotworowe, wskazany jest
 zabieg operacyjny.

Chwilową poprawę osiągnąć
 można przez systematycznie,
 dłuższy czas stosowane przepłu-
 kiwanie żołądka, raz lub 2 razy
 dziennie roztynem kw. boro-
 wego lub salicyl. resorecyny, lub
 w razie oddziaływ. kwaśnego
 roztynem sody, soli lub wody
 karlsbadzkiej.

W razie bólów wskazane są
 środki odurzające i to lepiej pod-
 skórnice niż wewnętrznie, gdyż
 w wypełnionym i rozszerzonym
 żołądku trudno ulegają wessaniu.

W razie, gdy przyczyną cier-
 pienia jest zwioteczenie ścian żo-
 łądka, należy przepisać dyetę
 pożywą, w małych ilościach a
 często podawaną z wykluczeniem

o ile możności płynów; co dzień
 na czczo uwolnić żołądek zapo-
 mocą aspiratora żołądkowego od
 zalegającej treści, a w razie to-
 warzyszącego nieżytu żołądka,
 takowy stósownie leczyć.

Skutecznie też działają za-
 biegi wodolecznicze, mięsienie
 i prąd indukcyjny, w okolicę
 żołądka stósowane.

W celu wzmocnienia mięśni
 żołądka: ipecacuanha 0·02—0·05
 w przeciągu 24 godz., raz w pół
 godziny po jedzeniu, drugą da-
 wkę (0·01) po całej godzinie.

Przy zaparciu stolca: przed
 jedzeniem dwie łyżeczki: Sul-
 phat Magnes., Cremor tartari, et
 flor. sulphur. aa. p. aeq. Lewa-
 tywy z gliceryny. Jeżeli po je-
 dzeniu występują boleści, poleca
 się 2—4 łyżek wody chloroform-
 owej. Przeciw wzdęciu: kreda,
 węgiel, magnesia w bardzo ma-
 łych ilościach.

**Diphtheritis vide Angina
 diphtheritica.**

Dysenteria.

W czasie epidemii unikać nie-
 stosownego pożywienia. Ściśle
 odłączać chorych, a zwłaszcza
 desinfekcya wypróżnień. Chorzy
 powinni leżeć w łóżku, miesz-
 kanie przewietrzać.

Dyeta ścisła, kleik, rosół, mle-
 ko. Słabszym można dozwolnić
 bulion z jajem, wyciągów mię-
 snych, wina. Dzieciom mleko
 z wodą wapienną, kawa żół-
 dziowa, herbata — osłabionym
 z rumem, wino burgundzkie
 z kleikiem, starsze dzieci mogą
 dostawać winnej polewki.

Wszystkie pokarmy należy po-
 dawać nieco ogrzane.

Dzieci przy piersi będące do-
 stają pokarm regularnie, lecz
 wszelkie dodatki usunąć.

Leczenie rozpocząć należy od
 środków przeczyszczających, Ca-

lomel. Ol. ricini, dorosłym 2—4 łyżek dziennie, dzieciom w emulsyi, lub: Infus rhei.

Później środki ściągające, miejscowe przepłukiwania kiszek letniemi rozcżynami. Starcia około odbytnicy troskliwie oczyszczać i zasypywać pudrem salicylowym.

Codziennie kąpiel ciepła, dorosłym jedną dzień, starsze dzieci 2, ssawcy najmniej 3. Ciepłota kąpeli 27° przez 5—10 minut. Okłady wysychające, kąpielażmy, zawijania ciepłe sprawiają ulgę.

Podane tutaj recepty odnoszą się do dzieci, dorosłym dawki większe.

410. Ol. ricini 30·00,
Inf. fol. menth. 60·00,
Gum. arab. 5·00,
Succi citri 10·00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

411. Salol 4·00,
Ol. oliv. fervid 4·00,
Aq. chloroform. 120·00.

MDS. Z początku co $1\frac{1}{2}$ godz. później co godz. łyżeczkę.
(Dla 8 letn. chłopca).

Co 10 minut łyżeczkami lekką letnią herbatę naprzemian z kleikiem.

412. Calomelanos 0·01—0·05,
Sacchari 2·00,
Mfp. dtr. tal. dos. N. V.
S. Co godz. proszek.

Jeżeli stolce nie zawierają już kału, można podawać opium ze środkami ściągającymi, jednak po paru dniach znowu środek przeczyszczający.

413. Acidi Salicyl 10·00,
Opil pulv. 0·20,
Mfp. div. in dos. N. XX.
S. 3—4 proszki dziennie (dorosłym).

414. Natri Salicyl 2·50,
Laudani 0·05,
Mfp. div. in dos. N. X.
DS. 3 pr. dzien. (dzieciom).

415. Natri Salicyl 5·00,
Aqu. dest. 80·00,
Trae laud. gtts. V.
Syrup simpl. 20·00.
MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

416. Liquor. alum acet. 30·00,
Aqu. dest. 60·00,
Syrup simpl. 15·00.
MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

Do lewatywy używa się: sól kuchenna (0·5%), Acid. salicyl. (0·5%), Thymol (0·10%).

417. Liquor. alum acet.
Aqu. dest. āā. 100·00.
DS. Na 2 lewatywy.

Po lewatywach jakoteż w razie silnego parcia dać czopki:

418. Butyri Cacao 0·50,
Trae opii guttam
Mf. supposit.
S. 2—3 r. dziennie.

419. Extr. bellad. 0·10,
Morphii mur. 0·05,
Butyr Cacao q. s. f. sup.
N. V.

S. 1—2 czopków dziennie (dorosłym).

W przypadkach przewlekłych podawać dalej lewatywy i środki lekko ściągające.

W razie zapadu: Cognac, wino, kamfora, eter.

W okresie zdrowienia przechodzić z wolna do pokarmów: jaja, skrobane mięso itd.

420. Bismut. Salicyl 1·00,
Pulv. Doveri 0·20,
Sacchari 2·00,
Mfp. div. in dos. N. 10.
DS. 3 pr. dziennie.

421. Chinini tannici
Bismuti salicyl. āā. 1·00,
Laudani 0·10.
Mfp. div. in dos. N. X.
S. 3 pr. dziennie.

Dysmenorrhoea.

U panien: unikać ruchu bezpośrednio przed i podczas peryo-

du, zaziębienia, szkodliwych wpływów moralnych. Regulować dytę. Jeżeli chora niedokrewna lub skrofuleiczna, odpowiednie leczenie stanu chorobowego ogólnego. Leczenie kąpielowe: Iwonicz, Rabka, Krynica, kąpiele borowinowe, (Mattoniego sól borowinowa).

Podczas boleści spokój, suche ciepło na okolicę podbrzusza, środki kojące jak: lewatywa z Tra. opii simpl. (15 kropli na lewatywę albo Chloral hydrat (1'0) na lewatywę). Czopki do kiszki stolcowej, zawierającej opium lub morphinum, wstrzyknięcie morphiny pod skórę, u osób silnych, krwistych po jednej pijawce na wewnętrznej powierzchni obu ud.

W cięższych przypadkach należy zbadać dokładnie miejscowo narząd płciowy, przez odbytnicę, albo jeżeli możebne przez pochwę i leczyć, jak u osób zameężnych.

Najczęstszą przyczyną bolesnego miesiączkowania, bywa niedrożność przewodu szyi macicy.

Niedrożność pochodzić może ze zmiany położenia macicy jak np. zagięcia tejże, z wrodzonej wąskości przewodu, z krętego przebiegu tegoż.

W tych razach u mężatek zazwyczaj napotykamy równocześnie nieplodność.

W przypadkach takich wskazaniem jest leczenie mechaniczne, polegające na wyrównywaniu zagięcia macicy, na rozszerzaniu przewodu szyi macicy sposobem tępym, wprowadzaniu zgłębnika lub rozszerzaczy na ten cel zbudowanych do jamy macicy. Jeżeli te sposoby nie prowadzą do celu, wskazaniem jest rozszerzenie macicy sposobem krwawym (Hysterostomatemia).

W ostatnim czasie polecają:
Elektryzowanie według metody Apostolego.

422. *Extr. hydrast. canad. fluid.*
2 razy dziennie po 25 kropli na 8 dni przed regularnością.

423. *Chloral hydrat. 8'00,*
Kali brom. 16'00,
Aqu. camphor. 200'00.

S. Co 2 lub 4 godz. łyżeczkę.

Dyspepsia nervosa.

Cierpienie to najczęściej stoi w związku z czynnościowym, nadmiernym wydzielaniem soku żołądkowego, lub z niedomogą wydzielniczą żołądka.

Stosownie do tego w 1-szym przypadku wskazane są środki alkaliczne, wody: Karlsbad, Vichy, Szczawnicka Magdalenka, w 2-gim kwas solny i środki gorzkie.

W innych razach zboczenia w wydzielaniu soku żołądkowego niema, tylko błona śluzowa żołądka jest nadczołną, a w tych przypadkach należy przed jedzeniem podawać środki znieczulające (cocaina) i zapomocą przepłukiwań żołądka zmniejszać przeculicę błony śluzowej, można też podawać przetwory bromowe.

Prócz tego należy zwrócić uwagę na ogólny stan chorego, u anemicznych wskazane są środki żelaziste (Krynica, Żegiestów-Francensbad i t. d.) u neurasteników i hysteryczek skutecznem bywa leczenie wodolecznicze.

424. *Natri bicarbon.*

Magn. carbon.

Kali carbon. āā. 5'00,

Pulv. rad. Rhei 7'00,

MD. in scatula.

S. 3 razy dnia na koniec noża zażywać.

425. *Sal. therm. Carolin 100'00.*

DS. Co dzień rano łyżeczkę w pół szklanki ciepłej wody.

426. *Strontium brom.* 2—3'00.
Po obiedzie i po kolacyi.

W razach niedomogi wydzielniczej:

427. *Acid. hydrochl.* 3'00.
Pepsini German. solub de
Rostock 2'00,

Aqu. dest. 150'00,
Syr. simpl. 15'00.

MDS. Po każdym jedzeniu 2 łyżki zażyć.

428. *Acid. hydrochl. dilut.*
Trae absinthi aa. 15'00.

DS. Po każdym jedzeniu 20 kropli w łyżce wody zażyć.

U anemicznych z niedomogą wydzielniczą:

429. *Trae ferri pomati* 25'00,
Trae Rhei vinosae
Trae amarae aa. 15'00.

MDS. 3 razy dnia po łyżeczce zażyć.

430. *Ferri carb. sacchar.* 5'00,
Extr. nucis vomicae 0'50,
Pulv. et extr. Rhei aa. q. s.
ut f. pill. N. 100.

DS. 3 razy dnia po 2 pigułki zażyć.

Dyspepsia u dzieci.

Regularne karmienie osesków, jeżeli przyczyną mleko krowie, wrócić do piersi, lub w miejsce tego kleik jęczmienny, owsiany, woda cukrzona z białkiem, rosół cielecy.

Z poprawą stolców zwiększać ilość mleka. Jeżeli są odbijania, czuć kwas z ust, wymioty, stolce serowate: *Calomel* (0'01—0'03) lub *Natrum benzoic.* (3%) co 2 godziny łyżeczkę.

W razie wzdęcia bolesnego, wprowadzić kanke lub kateter do odbytnicy. Jeżeli wymioty nie serowate, cuchnące, wskazują na brak kwasów: *Acid. mur.* 0'30:50'0) lub:

431. *Pepsin* 1'00,
Ac. muriat. gtts. tres.
Aqu. dest. 90'00,
Syr. simpl. 15'00.

S. Przed pokarmem łyżeczkę.

Papayotin 0'25,
Acidi lactici 1'00,
Aq. dest. 80'00,
Syr. simpl. 30'00.

MDS. łyżeczkę po ssaniu.

432. *Pepsin* 10'00,
Vini Xerens. 300'00,
Acidi mur. 1'00,
Sacch. 20'00.

MDS. Co 4 godz. łyżeczkę.

W razie nagromadzenia się kału w jelitach. Ol. ricini.

Przy Intertrigo towarzyszącym zmywanie wodą mydlaną.

433. *Magnes ustae* 5'00,
Talci praepar. 20'00,
Acid. salicyl. 0'20.

MDS. Do posypywań.

U starszych dzieci:

434. *Trae Colombo*
Trae cascarrillae aa. 5'00,
Trae bellad. 2'00,
Trae opii gtts. IV.

S. 5—10 kropli przed jedzeniem.

Dyspepsia u suchotników.

Napoje wyskokowe w miernej ilości, środki gorzkie, kreozot, Strychnina, Rheum, Gentiana.

Dyspnoe.

Wyszukanie przyczyny powodującej duszność i leczenie stosowne choroby głównej.

W razie większej duszności, otwarcie okna w pokoju, usadowienie chorego na łóżku, skropienie twarzy zimną wodą, natarcie czoła, twarzy, wodą kolońską lub eterem, podanie wina, cognacu, czarnej kawy, wzięcie eteru, roztarcie nóg i rąk, synapizma na piersi.

435. *Extr. alcohol. Quebracho*
10'00,

Aqu. dest. 200'00,

Succi citr. 20'00.

Łyżkę podczas napadu.

Eclampsia infantum.

Uwzględnić przyczyny: Początki chorób ostrych i zakaźnych, zimnica, wpływ przestarchu, użycie środków odurzających, przepalenie głowy, kolki brzuszne, niestrawność, robaki, choroby dróg moczowych (phimosi), koklusz, skurcz głosi, ciała obce w nosie, zranienia.

Wśród samego napadu zimne okłady (woda z octem) na głowę co parę minut, lewatywy, gorczyzniki na kark i łydki, w razie długotrwałych drgawek wdychanie chloroformu (ostrożnie!) kilka kropel na chustec trzymać pod nosem. Lewatywy z chloralu.

W razie powtarzających się napadów:

436. *Chloral hydratis* 1'00,

Natri bromati 1'00,

Aqu. dest. 60'00,

Syrup sacchari 15'00.

MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.

437. *Chloral hydratis* 0'50,

Aqu. dest. 80'00,

Mucilag. gum. ar. 20'00.

MDS. Połowę do jednej lewatywy.

438. *Urethani*

Sacchari aa. 0'20,

Mfp. dtur. tal. dos. N. V.

S. Co 2 godziny proszek w łyżeczce wody.

Jeżeli stolec zaparty:

439. *Calomelanos* 0'30,

Sacchari 2'00,

Mfp. div. in dos. N. X.

DS. Co godzina proszek.

Eclampsia puerperalis.

Ucieźnarnych okazujących cierpienie nerek, znaczniejsze obrzę-

ki, podawać środki moczopędne (kali aceticum, Acidum benzoicum) środki wypróżniające, środki napotne, mleczna dyeta.

Podczas napadu ułożenie w łóżku otoczonem materacami, aby chorą uchronić od obrażeń; przed wystąpieniem szczękowości, wsunąć język do jamy ust i między szczęki wsunąć kawałek drzewa okrytego płótnem. Ruchów nie kępować. Znieczulić chorą silnemi dawkami narkotyków, morfin podskórnio 0.02 — 0.03 lub chloral w lewatywie (2.0). Gdy się chora budzi lub napad występuje, ponowić dawkę. Można użyć chloroformu do wdychania. Po napadzie kąpiel ciepłą 30° R., potem zawinąć w prześcieradło i koc, aby wywołać poty.

Podczas ciąży napady mogą ustać i ciąża być donoszona, dlatego tylko w razach, gdy powyższe leczenie niepomaga, napady występują zbyt często, albo grozi oedema pulmonum, wzniecenie porodu przedwczesnego (założenie świeczki elastycznej do macicy, niektórzy radzą przebicie pęcherza płodowego).

Jeżeli napady występują podczas porodu najlepiej chloroformować, można użyć i narkotyków jak wyżej i kombinować jedno z drugim. Podaje się narkotyk, a oprócz tego ilekroć występują objawy zwiastunowe napadu, chloroform. Unikać częstego badania wewnętrznego, aby nie drażnić chorej. Jeżeli są warunki do łagodnego ukończenia porodu, to takowy ukończyć. Zabiegów gwałtownych, w celu rozwiązania rodzącej używać nie należy. Jeżeli napady występują w połogu postępowanie jak podczas ciąży.

- 440.** *Chloral hydrat.* 5'00,
Aqu. dest.
Mucilag g. ar. āā. 50'00.
 MS. Na 2 lewatywy.

Eczema acutum.

W okresie rozwoju unikanie tarcia bielizny, gorąca, potu, wilgoci a więc: zmywań i kąpiei. Dla ochronienia od potu i tarcia najlepszym środkiem jest puder, do którego dla zapachu nie dodaje się olejków eterycznych, bo drażnią.

- 441.** *Amyli Orizae* 50'00,
Pulv. alum. plumos. 10'00,
Zinci oxydati
Pulv. Ireos florent. āā. 3'00.
 Mfp. DS. Puder.

- 442.** *Zinci oxydati*
Magist. Bismut. āā. 5'00,
Cerussae 2'50,
Pulv. talci venet. 5'00.
 Mfp. S. Puder.

Puder zmienia się tak często, ilekroć takowy zwilgotnieje i zagrzeje się.

Przy objawach silnego zapalenia (silne obrzmienie, śczenie z uczuciem bólu i napięcia) okłady zimne z:

- 443.** *Plumbi acet. basici* 10'00,
Aqu. dest. 500'00.

MDS. Do okładów
 lub okłady z liquor Burowi 10%—25% zmieniając takowe co 2 godziny lub Thymol 1:1000.

Najkorzystniej wszakże prawie zawsze ograniczyć się do samego pudru.

W *eczema acutum papulosum* wśród którego istnieje swędzenie powodujące drapanie i pogorszenie sprawy chorobowej pędzluje się:

- 444.** *Acidi carbol* 0'50,
Spir. vini gallici 100'00.
 MDS. Zewnętrznie.

- 445.** *Acidi carbol* 1'00,
Spir. vini gallici 150'00,
Spir. lavandulae
 „ *coloniensis āā.* 25'00,
Glycerini 2'50.
 MDS. Zewnętrznie.

- 446.** *Olei Rusci* 50'00,
Aetheris sulphur.
Spir. vini rectific. āā. 75'00,
M. filtra adde olei lavandulae 2'00.

MDS. (Tra Rusci) Zewnętrznie.

W stadium decrementi usuwa się strupy olejkiem migdałowym, lub oliwą. Na miejsca śące daje się 2 razy dziennie masę rozciągniętą na płótnie (na twarz maskę płócienną) i przymocowuje opaskami flanelowymi.

Maści używa się:

- 447.** *Unguent. Diachylon Hebrae* 50'00.

DS. Maść.

- 448.** *Empl. Diachyl. simpl.*
Vasellini āā. 25'00,
Liquefac. misce
 S. Maść lub:

Pasta Lassara:

- 449.** *Zinci oxydati*
Amyli tritici āā. 25'00,
Vasellini puri 50'00,
Acidi salicyl. 1'00.

Mf. Pasta.

S. Maść.

Neisser poleca:

- 450.** *Tumenoli* 2'00—5'00,
Flor. zinci
Magist. bismut. āā. 2'50,
Ung. lenientis
Ung. simplic. āā. 25'00.

Mfung. S. Maść lub:

- 451.** *Dermatoli* 5'00,
Vaselin. 50'00.
 Mfung. S. Maść.

W stadium squamosum naciera się kilka razy dziennie szorstką, łamiącą się skórę tłuszczem i posypuje się pudrem.

452. *Unguenti emolientis* 20'00.
MS. Maść.

453. *Zinci oxydati* 1'00,
Unguenti simpl. 40'00.
Mf. ung. DS. Maść.

Lub Maść Wilsona :

454. *Benzoes pulverisati* 5'00,
Axung. porci 160'00,
Digere cola adde
Zinci oxyd. 25'00.
Mfung. DS. Maść.

Najlepiej wszakże w tym okresie osobliwie w razie swędzenia używać dziegciu z początku, dając powyższe maści na miejsca dziegiem zapędzowane, później używać samego dziegciu, lub

455. *Tumenoli* 5'00,
Aether. sulphur.
Spir. rectif.
Aq. dest. āā. 15'00.
MDS. Do pędzlowań.

Eczema chronicum.

Wskazania:

1) Rozmięczenie i usunięcie strupów jakoteż zgrubiałego czasem modzelowatego przyskórka.

2) Zniesienie chronicznego przekrwienia.

Do rozmięczenia strupów i przyskórka używa się tranu, maści Hebry. Tłuszcze płynne należy kilka razy dziennie napuszczać, maści zaś na płatkach płótna nasmarowane opaskami flanelowemi, ściśle do części schorzałych przystosowane przykładć. Bardzo dobre usługi robi także Emplastrum saponato salicylicum 10%.

W celu usunięcia strupów rozmiękłych: zmywania szarem mydłem, spirytusem mydlanym, mydłem naftolowem. W razie znacznego zgrubienia przyskórka, środki te niepomagają, używa się tedy okładów z mydła szarego na 24—48 godzin, lub

naciera się rozczytnem kali caustici 1:2.

Skoro skóra pod wpływem tych środków stanie się podatną, gładką, nie sączącą, używa się dziegciu w celu usunięcia przekrwienia.

456. *Olei Rusci*
„ *olivarum* āā. 25'00.
MDS. Zewnętrznie.

457. *Trae Rusci* 100'00.
S. Zewnętrznie.

458. *Olei Rusci* 20'00,
Spiritus saponato Kalini 50'00,
Glycerini 10'00.
MDS. Zewnętrznie.

459. *Olei fagi* 10'00,
Glycerini 5'00,
Ung. emolientis 50'00,
Balsami peruviani 2'00.

460. *Glycerini* 40'00,
Olei rosarum,
Olei flor. aurant. āā. gtts. II.
Kali carbonici 2'50.
MDS. Zewnętrznie.

lub maść cynkowa, lub z białego praecipitatu (1:40). Przy E. na tle grzybkowem, charakteryzującym się naciekiem na wielkiej przestrzeni ciała, porozrzucaniem najeżściej w postaci łuszczącej się, znakomite usługi oddaje maść Wilkinsona.

Eczema poszczególnych części ciała.

Eczema capillitii.

Rozmięczyć strupy tłuszcza mi (oliwa karbolowa 10/0, tran), zmywać w dzień c. spirytu. saponato kalino. W stadium squamosum pędzlowanie cum Tra. Rusci, w ostatku maść cynkowa, praecipitatuowa biała (1:40) lub pasta Lassara (Rp. 449).

W E. seborrhoicum bardzo dobrze działa maść Wilkinsona (R. 464).

Eczema faciei impetiginosum.

Usuwać strupy jak wyżej, po ustaniu sączenia, dziegieć, maść praecipitadowa, cynkowa lub Wilsona. Do dziurek nosowych tampony z gliceryną lub oliwą, ragady przyżęga się lapisem.

Przy eczema powiek:

- 461.** *Praecip. rubri* 0·15,
Ung. emolientis 10·00,
Mf. unguentum.
 S. Maść.

E. sączące uporeżywe u dzieci ustępuje czasem po kilkorazowych $\frac{1}{2}$ godzinnych okładach z argent. nitric. 1 $\frac{1}{10}$ ·0.

Chroniczne eczema brzegu warg ustępuje nieraz dopiero po kilkakrotnem przypalaniu cum kali caustico 1:2, również eczema sutka i brodawki sutkowej.

Eczema chron. scroti.

Unguentum Hebrae, empl. sa-ponato salicylicum 10 $\frac{0}{10}$ ·0. Zmywanie 2 razy dziennie mydłem szarem w kąpieli, gdy sączenie ustąpi, dziegieć.

Eczema perinei et ani.

Unguentum Hebrae, maść borowa, przy ragadach w rectum czopki.

- 462.** *Cocaini muriat.* 0·02,
 lub: { *Extr. Belladonae* 0·02,
 Extr. Opii aquosi 0·02,
Zinci oxydati 0·15,
Butyri Cacao 1·50,
Mf. Suppositorium dtr. tal.
 dos. N. X.

DS. Czopki.

Przy swędzeniu ma znakomicie działać 4—10 $\frac{0}{10}$ maść tumenolowa.

- 463.** *Tumenoli* 3·00,
Bism. subnitr. 2·00,
Lanolin
Vaselin. āā. 25·00.
 Mfung. S. Maść.

Jeżeli eczema jest podtrzymywane lub spowodowane chorobami wewnętrznymi, należy takowe leczyć, a więc przy skrofulozie dawać tran, usunąć anemię, choroby żołądka etc.

Eczema marginatum.

1) bez istniejącego zgrubienia przyskórka: Wcieranie zapomocą pędzla szczecinowatego przez 8—12 dni:

(Maść Wilkinsona):

- 464.** *Olei Rusci*
Lactis sulphur. āā. 25·00,
Sapo viridis
Axungiae porci āā. 50·00,
Pulv. cretae albae 5·00.
 Mf. unguent. DS. Maść.

- 465.** *Naphthol* 2·50,
Ungu. simpl. 50·00.
 Mf. unguent. DS. Maść.

- 466.** *Chrysarobini* 5·00,
Unguenti simpl. 50·00.
 Mf. unguent. DS. Maść.

- 467.** *Naphtol-B* 1·00,
Spirit. vini rectific. 100·00.
 MDS. Zewnętrźnie.

- 468.** *Sublimati corrosivi* 1·00,
Spirit. vini rectific. 100·00.
 MDS. Do pędzlowania.

Lub nacierania dziegciem, trąjodową.

2) Jeżeli istnieje zgrubienie przyskórka należy takowy zapomocą rozczyńu kali caustici 1:2, lub okładów z mydła szarego usunąć, a następnie, gdy się przyskórek odnowi, powyższe środki pędzlem wcierać.

Emphysema pulmonum.

Przeważnie leczenie symptomatyczne.

Unikanie zaziębień, przemoczenia nóg, w ogóle wszystkiego, co może spowodzić lub powiększyć nieżyt oskrzelowy. Główne zadanie leczyć nieżyt o-

skrzelowy przez pobyt na świe-
żem górskiem powietrzu, picie
wód w Ems, Reichenhall, Nau-
heim, Szczawnicy; na wewnątrz
Pulv. Doveri, Amonium muriat,
Tannina z morfiną, Stibium sul-
phurat. aurant. z morfiną, apo-
morphin, Inf. Ipecacuanhae lub
radix Senegae, przetwory balsa-
miczne jak: Balsam peruv. to-
lutanum, ol. terebinth. terpinol,
terpinhydrat (3:00: na 30 pigu-
łek, z tego 1—3 pig. dziennie).

Leczenie w gabinetach pneu-
matycznych lub za pomocą przy-
rządów Waldenburga lub Geigla
i Majera (Würzburg) lub Schniz-
lera.

U ludzi otyłych można po-
lecić picie wód Karlsbadzkich
lub Kissingen. Przy osłabieniu
akcyi serca, podawać obok środ-
ków wykrztuśnych i nasercowe.
Uważać na wypróżnienia, w ra-
zie braku tychże, podać odpo-
wiednie środki,

Dyeta pożywna, ale nie wzdy-
mająca.

469. *Terpinoli* 3:00,
Extr. et pulv. liquir. q. s.
ut. f. pil. N. 30.
S. 3—4 pig. dziennie.

470. *Apomorph. hydrochl.* 0:05,
Morphii mur. 0:03,
Acidi mur. gtts. X.
Aqu. dest. 180:00,
Da in vitro nigro.
S. Co 3 godziny łyżkę.

471. *Stibii sulph. aurant.* 0:30,
Morph. mur. 0:10,
Natri bicarb. 5:00,
Mfp. div. in dos. N. XV.
S. 2—3 proszki dziennie.

472. *Gutti*
Fol. digit.
Bulb. Scillae
Stibii sulphur. aurant.
aa. 1:50,
Extr. Pimpinellae q. s. ut. f.
pil. N. 60.
DS. Co 2 godziny pigułek.

473. *Ol. terebinth.* 2:00,
Aqu. menth. pip. 150:00,
Mucil. g. arab. 30:00.
DS. Co 2—3 godz. łyżkę.

Endocarditis.

Właściwego leczenia niema,
i ogranicza się tylko do sympto-
matycznego.

Spokojne leżenie w łóżku, dyc-
ta płynna, niepodniecająca. Na
okolicę serca okłady zimne lub
worek z lodem.

Na wewnątrz cardiaca, zwła-
szcza digitalis, strophantus, w ra-
zie bólu mierne dawki morfiny.

Przy znacznem osłabieniu: ka-
wa czarna z cognakiem, wino
mocne, kamfora lub eter pod-
skórnice wstrzyknięty. Coffeina
lub Theobromina po 0:10 na daw-
kę, 1:00 pro die.

Przy gorączce wysokiej, mier-
ne dawki antipyretyków, z oba-
wy groźnego zapadu najlepiej
razem z Coffeiną lub Theobro-
miną.

474. *Infus. fol. digit. e* 1:50
ad 150:00,
Coffeini citrici 5:00,
Liquor. Kali acet. 50:00,
Succ. liquir. 10:00.
S. W ciągu 2 dni użyć.

475. *Tinct. Strophanti*
Aq. lauroc. aa. 10:00.
S. 3 r. dz. po 10—20 kropli.
W zaparciu stolca:

476. *Pulv. fol. digit.*
Calomelanos aa. 0:40,
Sacchari 3:00,
Mfp. div. in dos. 10.
S. Co 3 godz. proszek (dla
dzieci).

Endometritis.

Ostry nieżyt: spokojne le-
żenie w łóżku, środki lekko wy-
próżniające, okłady wysychają-
ce na brzuch, wstrzykiwania let-
nie, (niezbyt silnym prądem) —

zawierające środki desinfekcyjne: Acidum boricum (3:100) Ac. carbolicum (2:100) i t. d. W razie bólów, czopki cum laudano lub cum morphio.

Przewlekły nieżyt wymaga jużto leczenia ogólnego w przypadkach niedokrewności, żółtów i t. d., już też leczenia miejscowego.

W tym celu można używać wprowadzania środków żrących przypiekadłem Chiarego, albo za pomocą sondy owiniętej watą i napojonej n. p. cum Tra jodi. cum liquore ferri sesquichl. i t. d. Przeplukiwania macicy za pomocą cewnika Bozemanna, Olchausena, i t. d. rozczynikami: kwasu borowego, karbolowego jak wyżej. Schulze radzi przedtem rozszerzyć macicę sposobem tępym. Wprowadzenie rozczyńników silniejszych, jak kwas karbolowy 4%, Cuprum sulphuricum 10% zapomocą rurki Bandla w jego wzierniku do jamy macicy.

Dawniej wstrzykiwano rozczyzny do jamy macicy strzykawkami Brauna, Madurowicza. Wprowadzenie do jamy macicy przeczków zawierających jodoform, tanninę i t. d. Wprowadzanie do jamy macicy gazy jodoformowej w postaci długiego paska, którego jedna część wypełnia macicę, druga zaś sterczy do pochwy.

Gdy te sposoby nie wystarczają, wyskrobanie jamy macicy (Abrasio mucosae).

Owrzodzenia części pochwowej należy goić przyżeganiem zapomocą: nastoju jodowego, azotanu srebrowego w lasęczce, Cuprum sulphuricum w kryształach, Acidum nitricum fumans, który się stosuje ostrożnie za pomocą przecika szklanego albo asbestowego.

W przypadkach dawnych owrzodzeń z przerostem gruczo-

łowym, najlepiej wyskrobać ostrą łyżeczką dno wrzodu i przypieć następnie, do czego użyć można ferrum candens, thermocauter Paquelina, Galvanocauter.

Enuresis nocturna.

Uwzględnić powody: Ascaridy, Oxyuris. Phimosi, pavor nocturnus, zboczenia w odżywieniu, Onania.

Zimne obmywania, kąpiele nasiadowe chłodne od 5—20 minut, na wieczór, wstrzymywać od napojów. Polecać przez dzień wstrzymywać moc.

Polecają unikać spania na wznak, lub ułożyć pacjenta, aby była podwyższoną miednica. Prąd stały, a mianowicie wprowadzić wąską elektrodę metalową (nasmarowaną oliwą) do odbytnicy (u dziewcząt do pochwy) drugą elektrodę zwilżoną na spojenie kości łonowych lub perineum, prąd słaby można z wolna wzmacniać — elektryzować przez 5 minut. Antipyrina po 0.50—1.00 na noc między 9 a 11 godziną przez 14 dni z rzędu.

477. *Atropin sulphur.* 0.05,
Aqu. dest. 30.00.

DS. Po tyle kropli ile dziecko ma lat, o 4 i 7 godzinie wieczorem.

478. *Extr. chinæ aqu. sic.* 5.00,
solve in
Aqu. dest. 100.00,
Natri bromati 2.00,
Trae bellad. gtts. X.
Syrup sacchari 20.00.

MDS. 3 razy dziennie łyżkę.

479. *Extr. bellad.* 0.05,
Extr. nuc. vomic. 0.10,
Sacchari 2.00,
Mfp. div. in dos. N. X.

DS. Na noc jeden proszek.

480. *Strychnini nitrici* 0·001,
Sacchari 10·00,
Mfp. div. in dos. aequal.
 N. XX.

S. Na noc proszek.

481. *Extr. fluid rhois arom.* 10·00.
 S. 5—10 kropli 2 razy dziennie
 podawać we wodzie.

W razie nadczołości pęcherza,
 podać na noc Chloral na we-
 wnątrz lub też w lewatywie. Po-
 lecają też vesicatoryę przyłożyć
 na kark.

Skrofulicznych i źle odżywio-
 nych leczyć zarazem chininą i
 środkami żelazistemi.

Enteritis follicularis.

Zmiana mamki. Odstawione
 dzieci wrócić do piersi. Smietana
 Biederta lub zupa Liebiga za
 pokarm. Kleik jęczmienny, ka-
 wa żółędz., kakao.

Przeplukiwanie kiszki 1% wo-
 dą słoną, Liquorem alum. acetici
 aa. c. Aq. Toż i na wewnątrz.

482. *Liquor. alum. acet.* 30·00,
Aqu. dest. 50·00,
Syrup 20·00.

S. Co 2 godz. łyżeczkę.

Bismut. 0·10—0·20 *pro dosi*
 3—4 r. dziennie.

Chinin tannic. 0·05—0·10
pro dosi.

W razie bólesci i parcia Extr.
 opii aq. 0·01 pr. dosi, 3—4 r. dz.,
 Tra Opii według wieku.

W razie krwawienia Liquor
 ferri sesqui 3—5 kropli kilka
 razy dz. Wśród zapadu herbata
 z cognakiem, wino czerwone,
 liquor ammon. anis.

Ephelides (piegi).

Energiczne leczenie z silną
 reakcją, trwające tydzień, pole-
 ga na okładach z rozczynu:

483. *Hydr. bichlorati* 1·00,
Spir. vini rectif.
Aq. destil. aa. 50·00.
 MDS. Venen! Do okładów.

Łagodniej działa natarcie sza-
 rego mydła i pozostawienie ta-
 kowego na twarzy przez jeden
 dzień, przykrywając twarz fla-
 nelą namoczoną in Spir. Sapon.
 Kalino.

Nacieranie maścią:

484. *Lactis sulphur.* 3·00,
Kali carbon. 1·50—3·00,
Ung. rosati 30·00.
 Mfung. S. Maść.

lub:

485. *Hydr. praecip. albi*
Bismut. subnitr. aa. 2·00,
Ol. olivar. 1·00,
Ung. glycerin. 4·00.
 Mfung. S. Maść.

Epididymitis.

Pozostanie w łóżku, ułożenie
 wysokie scrotum, zapomocą ręcz-
 nika, lub podusieczki trójkątnej,
 okłady z acetas plumbi basiçi 1%,
 by uniknąć wyprysku, okłady
 zimne (lecz nie lodowe) środki
 przeczyszczające, na noc maść
 z extractum Belladonae (1:25).
 Okłady robi się tak długo, do-
 póki ból trwa (4—10 dni), gdy ból
 ustąpi lub znacznie się zmniej-
 szy, staramy się o usunięcie wy-
 pociny przykładając plaster:

486. *Emplastri hydrargyri*
sapon. aa. 15·00,
leni calore liquefac. ut fiat
emplastr. extende supra lin-
teum.

Plaster taki nosi chory 4—5 dni
 i zdejmuję go w ciepłej kąpieli,
 przykładając nowy plaster. Po
 2—3 tygodniach wypocina ustę-
 puje i pozostaje tylko guzek
 stwardniały w dolnej części, w ce-
 lu usunięcia tegoż zapisujemy:

- 487.** *Kali jodati* 2'00,
Jodi puri 0'10,
Lanolini 9'00,
Olei olivar. 1'00.
Mf. Unguentum.
 S. Maść.

Jeżeli chory w łóżku pozostać nie może, koniecznem jest, aby przynajmniej w nocy przez kilka godzin robił okłady zimne, na dzień zaś w celu umożliwienia chodzenia, zakłada się mu suspensorium Horanda.

Epilepsia.

Przedewszystkiem starać się wykryć przyczynę padaczki i takową o ile można usunąć, zwłaszcza przy epilepsji odruchowej.

Chory nie powinien fizycznie lub umysłowo nateżać się, unikać napojów wysokokowych, żyć higienicznie, uważać na regularny stolec, nie pić kawy, herbaty, mało lub wcale nie palić, unikać wszelkich gwałtownych wzruszeń.

Podezas aury chory powinien położyć się do łóżka, lub na sofkę, porozpinać ubranie i podczas napadu ktoś powinien być obecnym, ażeby chory wśród silnych drgawek nie wyleciał z łóżka i nie potłukł się. Nieraz udaje się napad usunąć, mając przygotowany Amylnitrit, kilka kropli na chustkę i parę razy tem oddechać. Czasem zaś kieliszek cognacu, wina, na razie może wstrzymać napad. Podezas bardzo silnego napadu można robić inhalacje chloroformowe.

Jako środki polecane przeciw epilepsji przedewszystkiem: kali bromatum po 2—5 do 10 i 15 grm. na dzień, lub mięszanki bromowe:

- 488.** *Ammon. bromati*,
Natri brom.
Kali brom. āā. 3'00—5'00,
Aqu. dest. 200'00.
 DS. 2—3 łyżek dziennie, dalej Curara podskórnie (0'005).
- 489.** *Curare* 0'10,
Aqu. dest. 10'00,
Acid. muriat. gtt. unam.
 DS. $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{2}$ strzykawki na raz.
 Polecano też:
- 490.** *Decoct. artemisiae*
e 15'00 ad 250'00,
Kali bromati 10'00—20'00.

Podawać też można Valerianę w proszku (0'50—2'00) pro die, albo jako infusum e 10—15'00 na 200'00. Belladona w pigułkach np.:

- 491.** *Extr. Belladon.*
Fol. Bellad. āā. 1'00,
Extr. et pulv. liquir. q. s. ut
f. pill. N. 100.
 S. Codziennie 2—3 do 6—7 pigułek.

Następnie Zincum oxyd. od 0'05—0'20 p. dosi, w połączeniu z innymi środkami, lub atropinę na wewnątrz:

- 492.** *Zinci oxydati* 0'05,
Rad. Valer. 2'00,
Extr. Hyoscyam. 0'06,
Ol. Valerianae 0'05,
Mfp. D. tal. dos. N. X.
Da in charta cerata.
 S. 3 proszki na dzień.

- 493.** *Atropini sulphur.* 0'01,
Aqu. dest. 10'00.
 DS. 2—3 razy na dzień po 10 kropli (uważać na żrenice!).

Dalej przetwory arsenikalne jak: Sol. Fowleri, woda Levico, Roncigno.

Przytem można zastosować procedury hydropatyczne i elektryzowanie, prądem stałym głowy n. sympaticus. Podezas status epilepticus można robić inhalacje chloroformowe lub eterowe.

494. Aethyleni bromati

Spir. vini rectific. āā. 5'00,
Aqu. menth. pip. gtts. 2.

S. 3—3 razy dziennie po 5—10 kropli w $\frac{1}{3}$ szklanki mleka.

Epistaxis.

Wstrzykiwanie zimnej wody z rozcżynami ałunu (20:50) tanniny, octu, ferri sesquichlor. 1 $\frac{0}{10}$. soku ze świeżej cytryny itp. Przestrzykiwania bezustanne wodą gorącą najmniej $+ 53^{\circ}$ C., aż do ustania krwotoku. Radzą też ręce i nogi zanurzyć w gorącej wodzie.

Ucisk zewnętrzny na skrzydło nosa, przyczem głowę chorego naprzód pochylić.

Tamponada nosa zapomocą rurki Belocq'ua. Do tamponady z przodu nosa, polecają zamazać czop z waty w olejku terpentynowym lub też w stężonym roztworze Antipyriny, lub Extr. fluid. hydrast. canad.

W uporczywych krwotokach nosa podać można Ergotin 0'10 co $\frac{1}{2}$ godziny.

Epulis.

Guz cały wraz z schorzałą częścią szczęki należy usunąć ostrą łyżeczką, dno rany wypalić termokauterem i następnie całą jamę wytamponować gazą jodoformową. Usta należy pilnie płukać antyseptycznym roztworem:

495. Ac. borici 15'00,

Aqu. dest. 500'00.

S. Płukanie.

496. Kali hypermang. 1'00,

Aqu. dest. 50'00.

S. Kilka kropli do szklanki wody.

Erysipelas.

Leczenie ogólne niczem nie różni się od leczenia innych chorób gorączkowych. Przy lecze-

niu miejscowem, przedewszystkiem wysledzić punkt wyjścia róży, a więc przy róży twarzy, zbadać czy nie ma abscessu z powodu periodontitis i takowy przeciąć, osobliwie zaś dokładnie zbadać jamę nosa i jeżeli tamże znajdują się exkoryacje strupami pokryte, takowe rozmiękczyć przez wkładanie tamponów, napojonych oliwą karbolową 1 $\frac{0}{10}$, wkładać waciki z maścią: Hydrarg. praecipit. flavi (0 15:15'00).

Miejsce uległe zapaleniu okłada się suchą watą, lub robi się okład z Plumbum acet. basicum solut. 1 $\frac{0}{10}$, 2 $\frac{0}{10}$ roztwór ichtyolu lub z płynu Burowa. Najpowszechniejszym środkiem jest maść kamforowa. Polecają również: Nacierania 4—5 r. dz. ol. therebint. rectific. zapomocą pędzla lub wacika po poprzednim zmyciu alkoholem lub eterem miejsca schorzałego. Nacieranie dość środkowo, by zarazka na skórę zdrową nie przenieść. Leczenie to przy białkomoczu nie może być użytym. Cavarri pędzuje 10 $\frac{0}{10}$ roztworem alkoholowym Fuchsinu.

Lodowych okładów używa się tylko przy róży głowy, połączonej z majaczeniami i utratą przytomności.

497. Acidi tannici

Camphorae āā. 2'00,

Aether 15'00.

MDS. Zewnętrznie.

Miejsca zajęte pędzlować co 3—4 godzin.

Erythema multiforme et nodosum.

W przypadkach zwykłego erythema multiforme zaniechać wszelkiego leczenia. Przeciw swędzeniom przy Erythema urticatum et papulatum daje się okłady zimne, lub pędzuje się roztworem:

498. *Acidi salicylici* 1'00,
Spir. vini gall. 200'00.

MDS. Zewnętrznie. Następnie posypuje się pudrem.

W razie bólów stawowych, obrzmienia stawów, lub gorączki, pozostaje pacjent w łóżku, nawewnątrz zaś podaje się: Natrum salicylicum, Antipyrinę, Chinin. Wielką ulgę robią w tych razach okłady z lodu, zimnej wody, plumbum acet. basicum solut. 1%. W razie gorączki, przypadków gastrycznych, daje się kwaski, antifebrilia, środki przeczyszczające i stosowną dietę.

W razie częstych nawrotów u kobiet, badać czy nie ma jakich zboczeń w narządzie płciowym, leczyć istniejącą chlorosę i zboczenia w narządzie pokarmowym.

Favus.

1) Usunięcie ciałek i strupów woszczynowych, przez polewanie przez 2—3 dni, kilka razy dziennie 1% oliwą karbolową i zmywanie mydłem szarem lub spirytusem mydlanym.

2) Usunięcie grzybków znajdujących się w torebce włosowej środkami płynnymi, dostającymi się do torebki.

Metoda: Po wyciągnięciu włosów zmywa się rano i wieczór skórę głowy cum Spirytu saponato kalino. Następnie wciera się w $\frac{1}{2}$ godziny po tem, po osuszeniu skóry zapomocą pędzla szczecinowatego.

499. *Lactis sulphur.* 5'00,

Trae Rusci

Spir. Lavandulae āā. 50'00,

Glycerini 1'50.

MDS. Zewnętrznie.

By zapobiedz zsychnianiu się skóry, powstającemu po zmywaniu spirytusem mydlanym lub mydłem, wciera się w południe

maść, do której dodaje się antiparasiticum.

500. *Acidi salicyl.* 5'00,

Vaselini flavi 35'00,

Olei naphae gtts. V.

Mf. Ungu. S. Pomada.

Ponieważ druga i trzecia generacya odrastających włosów zawiera jeszcze grzybki, należy je wyrywać, zmywać głowę spirytusem mydlanym obetrzeć na sucho, wcierać następnie rozczyn sublimatu (0'03—0'05:100) a nazajutrz rano wetrzeć powyższą pomadę.

Febris intermittens zob. **Intermittens.**

Fluor albus = Blenorhoea Vaginae = Catarrhus Vaginae.

Ostry nieżyt: spokojne leżenie w łóżku, lekko wypróżniające środki. Letnie wstrzykiwania wodą przegotowaną z dodatkiem soli kuchennej, kwasu borowego 3:100, i t. d.

Przewlekły nieżyt:

Wstrzykiwania środkami ściągającymi 1—2—3 razy dziennie.

501. *Plumb. acet. b. purum* 2'00,

Dtur. dos. tal. decem.

S. Proszek do litra wody do wstrzykiwań.

502. *Plumb. ac. b. sol.* 100'00.

DS. 2 łyżki na litr wody do wstrzykiwań.

503. *Sulph. Zinci*

Aluminis pulv. āā.

DS. $\frac{1}{2}$ łyżeczki na litr wody do wstrzykiwań.

Sulph. Zinci 1:100, wody,

Kali chlor. 1:100, wody.

504. *Creolini* 15'00.

DS. 5—10 kropli na litr wody do wstrzykiwań.

505. *Acidi salicylici* 1·00,
Dtur. dos. tal. decem.

S. Proszek do litra wody do wstrzykiwań.

506. *Acidi pyrolignosi crudi*
300·00.

DS. Trzy łyżki do litra wody do wstrzykiwań.

Do wstrzykiwań należy do rozczynów używać wody przegotowanej. — Oprócz powyższych wstrzykiwań, gdy nie usuwają cierpienia, należy we wzierniku dobrze oczyścić pochwę i zapędzlować takową np. octem drzewnym, co można powtarzać co 3 dni kilkakrotnie, w tym celu można użyć i innych silniejszych rozczyńców. Po zapędzlowaniu wypłukuje się pochwę wodą i zakłada tampony. Można także używać proszków: *Acidum salicylicum*, *Alumen*, *Zinc. sulph.* i t. d. samych na wacie, albo w połączeniu z *Amylum*.

Wreszcie zalecają: tampony napojone lekami:

507. *Kali jodati* 5·00,
Glycerini 100·00.

DS. Do tamponów.

508. *Tannini puri* 3·00,
Glycerini 100·00.

DT. Do tamponów.

Foetor ex ore.

509. *Coff. tost.* 15·00,
Carbon. lign. 5·00,
Acid. borac. 5·00,
Sacchari 13·00,
Vanilin q. s.
Mf. pastillae pond 0·75.

Trzymać w ustach dopóki się nie rozpuści.

510. *Saccharin*
Natri bicarb.
Acid. salic. āā. 5·00,
Alcohol vini 220·00.

DS. Łyzeczkę na szklanke wody do płukania.

511. *Thymol.* 0·50,
Boracis 1·00,
Spir. vini 2·00,
Aqu. dest. 1000·00.

S. Do płukania.

Fungus umbilici.

Przyżęgać lekko lapisem (codziennie) i posypywać pudrem (ac. salicyl. 0·20:50·00 amyli), lub też Catgutem lub jedwabiem podwiązać u podstawy.

Furunculosis.

Zwrócić uwagę na możliwy diabetes. Kataplazmy ustawicznie stosowane, dopóki choćby mały guzek zostawał. Wczesne nacięcia, opatrunek jodoformowy. Wśród obfitej furunculosis, ciepłe kąpiele, kąpiele ze sodą (1 klgrm.) kąpiele borowinowe (*Mattoniego sól borowinowa*), dobre odżywianie, chinina, żelazo.

512. *Ichtyoli* 4·00,
Aqu. dest. 15·00.

MDS. Co 3 godz. pędzlować.

Podskórne wstrzykiwanie 3^o/₁₀ rozczynu kwasu karbolowego 1¹/₂ strzykawki.

513. *Acid. salicyl.* 7·50,
Empl. saponati 60·00,
Empl. diachylon 30·00.

DS. 2 razy dnia przykładać.

Furunculosis przewodu usznego zewnętrznego.

514. *Mentholi* 5·00,
Ol. olivar. 25·00.

MDS. Raz na dzień wkładać na wacie.

515. *Acidi borici* 3·00,
Alcohol absol. 25·00.

DS. Napuścić do ucha i 10 minut zostawić.

Gangraena pulmonum.

Świeże powietrze, częste przewietrzanie pokoju. Chory powinien leżeć w łóżku na stronie chorój. Dyeta pożywna i pod-

niecająca (przetwory wysokowe), jeżeli niema przeciwskażeń.

Podawać na wewnątrz środki wykrztuśne i balsamiczne (bals. peruv. bals. tolutan.) obok niewielkich dawek chininy, oraz robić częste wziewania z ol. terebinth 1,0—3,0 na 200 wody lub ol. pini pumilionis polonicae po 10—15 kropli na kieliszek wody do maszynki inhalacyjnej Siegla. Lub też kwas karbolowy 2% do wziewań, ale w takim razie uważać na moc, czy nie wystąpi zabarwienie ciemne. Również wziewania z Thymolu 0·20 z dodatkiem kwasu borowego 3·0 na 100 wody.

Na wewnątrz podać n. p.:

516. *Terpinol.* 3·00,
Natr. benzoici 2·00,
Sacch. albi q. s. ut f. pill.
N. 30.

S. Co 2 godziny pigułkę.

517. *Menthol.* 3·00,
Sacch. albi
Gum. arab. āā. 2·00,
Aqu. dest. q. s. ut. f. pil.
N. XX.

S. Co godzinę pigułkę.

Lub menthol podawać w kapsułkach wyrobu Zachradnika po 1·0 grm. z dodatkiem ol. olivar. 2·0.

Do spłuwaczki przykrywanej szczelnie wlewać 5% kw. karbolowy lub 2%-ej kreoliny.

Gingivitis.

Leczenie przyczyn (Periodontitis, Epulis, Stomatitis mercurialis, Stomacace). Częste płukanie ust.

518. *Kali hypermang.* 0·05,
Aqu. fontis 200·00.
DS. Płukanie.

519. *Tannini* 3·00,
Spirit. vini rectific. 80·00,
Bals. Hoffman. 20·00.

MDS. Łyzeczkę na szklanę do płukania.

520. *Tinct. Ratanhae*
Tinct. Gallar. āā. 10·00,
Tinct. opii 1·00.

MDS. Do pędzlowania.

Glaucoma (Jaskra)

Zaczerwienienie spojówki gałkowej, któremu towarzyszy równoczesne rozszerzenie źrenicy (jeśli możemy wykluczyć zapuszczenie atropiny) budzi wielkie podejrzenie o jaskrę.

Przy stwierdzonej jaskrze, zapuszczać roztwór Ezerynu lub Pilokarpinu, z początku, dopóki się objawy nie uśmierzą, 5—6 razy dziennie, potem 3 razy dziennie, a skoro napad zapalny zostanie choć w części usunięty, wykonanie Iridectomii.

Pilocarpina jest lepszą do dłuższego użycia, bo nie ulega tak szybkiemu rozkładowi, jak Eseryna.

Pamiętać należy, że zdarza się jaskra prosta (niezapalna) gdzie jedynym objawem jest podupadanie wzroku i ekskawacye tarczy nerwu wzrokowego.

Atropinu pod żadnym pozorem używać nie wolno, nawet tam, gdzie jest tylko podejrzenie o jaskrę.

521. *Pilocarp. muriat.* 0·20,
Aqu. dest. 10·00.

DS. Krople oczne.
Zakraplacz.

522. *Eserini sulphur.* 0·05,
Aqu. dest. 15·00,
Dt. in v. n.

DS. Krople oczne (szczelnie zatykać).

Glossitis.

W przypadkach ostrych należy podawać lód w kawałkach do polykania, na szyję zimny okład.

W przypadkach groźnych wskazane są: liczne głębokie nacięcia i skaryfikacye. Z powodu możliwego ostrego obrzęku głośni, należy mieć narzędzia do tracheotomii pod ręką.

Ropnie przewlekłe, należy rychło otworzyć.

Fisura linguae:

523. *Acid. carbol.* 2·50,

Trae jodi

Glycerini āā. 12·50.

MDS. Do pędzlowania.

Gonitis.

W pierwszym rzędzie należy leczyć przyczynę wywołującą zapalenie stawu, o ile takowa da się wykazać, a więc ogólny reumatyzm stawowy, choroby układu moczopłciowego i t. d. W okresie ostrym zaleca się absolutny spokój w łóżku, ewentualnie opatrunek ustalający. Na wewnątrz podajemy przetwory kwasu salicylowego a zewnętrznie preparaty jodowe lub ichtyolowe.

W okresie przyostrem lub przewlekłym, opatrunek uciskający, massowanie, kąpiele ciepłe siarczane.

Zapalenie stawu kolanowego natury gruźliczej, leczymy według ogólnych prawideł leczenia gruźlicy stawów (patrz Tumor albus).

524. *Trae jodi* 50·00.

S. Zewnętrznie.

525. *Trae jodi*

„ *gallarum* āā. 25·00.

S. Zewnętrznie.

526. *Kal. jodat.* 3·00,

Jodi puri 0·30,

Ungu. simpl. 30·00.

Mf. Ungu. S. Maść.

527. *Kal. jodat.* 5·00,

Glycer. q. s. ad solut.

Sapon. virid. 50·00.

Mf. Ungu. S. Maść.

528. *Natri sulphoichtioli*

Vaselin āā. 10·00.

S. Maść.

529. *Natr. sulphoichtiol.* 30·00,

Ol. olivarium 100·00.

S. Zewnętrznie.

530. *Natr. sulphoichtiol.* 10·00,

—50·00,

Aqu. dest. 100·00.

S. Do okładów.

531. *Ammon sulphoicht.* 10·00,

Chloroform 3·00,

Lanolin 10·00.

Mf. Ung. S. Maść.

532. *Ammon. sulphoicht.* 10·00,

Ac. salicyl. 2·00,

Collod. 100·00,

Ol. ricin. 10·00.

S. Zewnętrznie.

Haematemesis.

Przedewszystkiem należy uważać przyczynę krwotoku. Chory powinien jaknajspokojniej leżeć i wstrzymać się od przyjmowania pokarmów przynajmniej 24 godzin, a nieraz 1—2 tygodni.

Jeżeli osłabienie jest znaczne, lub chory od pokarmów wstrzymuje się dłużej, należy podawać odżywcze lewatywy.

Na okolicę żołądka okład lodowy, kawałki lodu do połknięcia i środki przeciwkrwotoczne, obok laudanum, cocainy lub morfiny.

W razie zapadu eter podskórny, lub ol. camphoratum lub też rozczyn soli.

Gdy wzmagająca się ostra niedokrewność wskazuje, że krwotok nie ustępuje, wstrzykiwania podskórne przetworów sporyszowych.

Po ustąpieniu krwotoków dłuższy czas spokojne leżenie w łóżku, dyeta płynna, mleko zimne łyżkami, a obok tego leczenie przyczynowe.

533. *Tannini puri* 0·50,

Opii puri 0·10,

Sacchar. albi 3·00,

Mfp. div. in dos. N. V.

S. Co 2 godziny proszek, lub opium w czopkach.

534. *Liqu. ferri sesquichlor. guttas* 10.

Aqu. dest. 200·00,

Morph. mur. 0·05,

Syr. simpl. 15·00.

MDS. Co godzina łyżkę.

535. *Extr. Secal. cornut* 2·00,

Spir. dilut.

Glycerini aa. 5·00.

DS. $\frac{1}{4}$ do jednej strzykawki podskórnie.

Haematocele retrouterina.

Bezwzględny spokój, leżenie w łóżku na wznak.

Badanie miejscowe ostrożne. W czasie wzrostu guza krwawego, worek lodowy na brzuch albo przyrząd chłodzący Leitera. Przeciw bólowi środki kojące, przyczem należy zwracać uwagę na stan niedokrewności, najlepiej podawać w czopkach:

536. *Extr. opii aquosi* 0·10,

But. Cacao q. s. ut f. l. artis supp. ad anum quinque.

DS. W razie boleści czopek (3—4 dziennie).

Dyeta płynna pożywna, środki wypróżniające. Przeciw niedokrewności środki skrzepiające, wstrzykiwania podskórne eteru albo oleum camphoratum, lewatywy ze słonej wody w stosunku 0·60 : 1000.

Gorączka zwykle nie wysoka, nie wymaga w następnych dniach podawania środków.

Jeżeli w przypadku danym można rozpoznać jako przyczynę pęknięcie ciąży zamacicznej, wskazanem jest usunięcie tejże sposobami operacyjnymi.

Skoro ustanie gorączka i guz niezbyt bolesny: leczenie pobudzające wessanie, jak przy „Perimetritis“.

Po ustąpieniu guza można pozwolić chorej powstać, gdy regularność przebiegu prawidłowo.

Następne miesiączki powinna się chora szanować.

Haematuria.

Absolutny spokój, usunięcie przyczyny, o ile jest wiadomą. Zimne okłady na międzykrocze i nad spojeniem łonowem, (w razie krwotoków pęcherzowych lub cewkowych) lub na okolicę lędźwiową (w przypadkach krwotoków nerkowych). W przypadku gwałtownego krwotoku pęcherzowego, można stosować zimne lewatywy lub wprowadzić do odbytnicy mały kolpeurynter napełniony wodą lodową.

537. *Inf. Secal. corn.*

e 3·00—8·00 ad 200,

Trae opii gtts. XX.

Syr. simpl. 20·00.

S. Co godzinę po łyżce stołowej.

538. *Extr. Secal. corn.* 1·00,

Sacchar. alb. 2·00,

Mfpulv. div. in dos. N. V.

S. Co 3—4 godz. proszek.

539. *Ergotin Bombelon pro injectione.*

S. $\frac{1}{4}$ —1 strzykawki wstrzyknąć.

540. *Ergotin Denzel* 25·00,

Boracis 2·50,

Aqu. dest. 72·50,

Filtra!

S. Do iniekcji.

541. *Ergotin Denzel* 2·00,

Aqu. dest. 180·00.

S. Po 2—3 łyżek zażywać.

542. *Ferr. sesquichlorat.* 2'00—4'00,

Aqu. dest. 200'00,

Syr. rubi idaei 20'00.

S. Co 2 godz. łyżkę stołową.

543. *Ferr. sulph.*

Natr. bicarb. āā. 5'00,

Extr. rad. acori q. s. f. l. a.
pil. N. 50.

S. 5—10 pigułek dziennie.

544. *Plumb. acet.* 0'30,

Opii pur. 0'10,

Eleos. citri 5'00,

Mfp. div. in dos. N. X.

S. 3—5 proszków dziennie.

545. *Tannini puri* 1'00,

Opii pur. 0'20,

Sacch. alb. 5'00,

Mfpulv. div. in dos. N. X.

S. Co 3 godz. proszek.

546. *Extr. hydrastis. canad.*

(*Parke Davis e Co*) 30'00.

S. 3 razy dnia po 20 kropli.

547. *Hydrastinum mur.* 1'00,

Aqu. dest. 10'00—20'00.

S. $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki wstrzyknąć.

Haemoptoe.

Bezwzględny spokój, ułożenie chorego na wznak w łóżku, w pokoju o miernej ciepłocie, przykryć chorego lekko.

Nie pozwolić mu się ruszać i mówić — zwolna oddychać.

Pokarmy tylko płynne, zupełnie chłodne, (najlepiej mleko). Wstrzymywać się od kaszlu, a jeżeli kaszel trwa, to spore dawki morfiny 1—2 etg. na raz. Chorego nie badać. Na piersi lód w worku gumowym lub pęcherzu, połykać małe kawałki lodu. Obok tego na wewnątrz: *Plumb. acet.* z opium aa. 0'03 na dawkę, lub też *Liq. ferri susquiehl.* 25 kropli na $\frac{1}{2}$ szklanki wody, z tego łyżkami; lub też *Extr. Secal. cornuti. Pulv. secal. corn.*

aa. 2'00 na 30 pigulek, z tego co 2 godz. pigułek.

W cięższych krwotokach wstrzyknąć ergotynę *Bombelon* $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki na raz lub podać atropinę w dawce 0'0002 lub wstrzyknąć $\frac{2}{4}$ — $\frac{1}{2}$ strzykawki z rozczyntem 0'01:10'0.

Przy podniesionej akcyi serca, radzą *Inf. digitalis*, przez *Leydena* jednak przeciwskazane.

548. *Extr. fluidi hydrast. canad.* 10'00.

S. Po 20—30 kropli, kilka razy dziennie.

549. *Hydrastinin* 0'25,

Sacch. lact. 3'00,

Mfp. div. in dos. X.

d. in charta cerat.

S. 3 pr. dziennie (następnie 2—1).

550. *Ergotin dialys. Bombelon* 2'00,

Aqu. dest. 20'00,

Acid. carbol. gtts. tres.

MDS. Do wstrzykiwań (1 strzykawka *Prawatza* zawiera 1 decigr.).

551. *Ergotin*

Chinin. sulph. āā. 2'00,

Pulv. fol. digit.

Extr. hyosc. āā. 0'20,

Mf. pil. N. XX.

S. Co 2 godziny pigułek.

Haemorrhoids.

Należy się starać codziennie o należyte wypróżnienie przez podawanie środków lekko przeczyszczających, wodę karlsbadzką i t. p.

Gorące kąpiele nasiadowe, irygacye odbytnicy usuwają cząstki cierpienie.

W niektórych znów razach, nadaje się bardzo sonda chłodząca.

Óprócz tego można próbować czopków z ergotyny, chrysorabinu, lewatyw ściągających,

wstrzykiwań czystego kwasu karbolowego do guzów.

Jedynie pewnym środkiem jest tylko operacya. Guzy wypadnięte należy odprowadzić do wnętrza, jeżeli jednak już przeszły w stan zapalny lub zgorzelinowy, najlepiej ograniczyć się do posypywania proszkiem jodoformowym i okładów z octanu glinowego.

Przeciwno uporczywemu swędzeniu najskuteczniejszą są zmywania wysokiem.

552. *Pulv. liquir comp.* 50·00.

S. Łyzeczkę wieczór zażyć.

553. *Sal. thermar. Carolinens.* 50·00.

S. Łyzeczkę w szklance letniej wody rozpuścić.

554. *Extr. secal. corn.* 2·00,

Butyr Cacao q. s. f. l. a.
supposit. N. X.

555. *Chrysarobin* 0·80,

Jodoformii 0·30,

Extr. bellad. 0·60,

Vaselin. 15·00.

Mf. ung. S. Maść.

556. *Chrysarobin* 0·08,

Jodoform 0·02,

Extr. bellad. 0·01,

Butyr Cacao 2·00,

Glycerin. q. s. f. supposit.

Dtr. tal. dos. N. X.

557. *Calomel* 2·00,

Morphini 0·15,

Bism. subnit.

Vaselinii aa. 25·00,

Glycerini 8·00.

M. f. ung.

S. Zewnętrznie.

558. *Cocain hydrochl.* 1·00,

Morphii sulph. 0·20,

Atropin sulphur. 0·10,

Tannin. 0·20,

Vaselin 30·00.

Mfug. S. Po wypróżnieniu posmarować.

559. *Extr. Hamamel. virg. fluid.* 0·20,

Butyri Cacao 10·00,

Ol. amygdal. 7·50.

Mfug. S. W razie krwotoków.

Helminthiasis.

Zob.: *ascaris*, *oxyuris*, *taenia*.

Herpes.

H. *Zoster*. Pęcherzyki utrzymać aż do uschnięcia, posypując pudrem, nie robić nigdy okładów, bo te macerują przyskórek i odsłaniają warstwę skóry brodawkową. Na owróżdzenia b. bolesne przy herpes *Zoster haemorrhagicus* używa się maści z dodatkiem środków kojących.

560. *Cerae albae* 3·00,

Olei olivar. 10·00,

Leni igne misce adde

Extr. opii aquosi

(„ *bellad.*) 0·15.

Mf. ungu. S. Maść.

W celu usunięcia bólów neuralgicznych wśród stad. prodromum i wśród przebiegu choroby, w bezsenności, daje się morfin na wewnątrz, iniekcye morfinowe, chloral, zewnętrznie plaster:

561. *Empl. de Meliloto* 25·00,

Extende supra lintum, consperge pulver Laudani 2·00.

S. Plaster.

Neuralgie po herpes zostające wymagają prócz środków kojących, także środków wewnętrznych: Chinin, *Solutio Fovleri*.

Herpes labialis et progenitalis.

Pęcherzyki jak najtroskliwiej utrzymywać przez przysypywanie pudrem lub aristolem (Heckel).

Herpes tonsurans.

Wskazania patrz: Favus.

Herpes tonsurans capilitii.

Przez kilka dni zapuszcza się kilka razy dziennie miejsce schorzone oliwą karbolową 1%, zmywa się cum Spir. saponato kalino i wyrывa się włosy szczypczykami. Następnie naciera się skórę rozczynelem sublimatu (0·3—0·5:100) lub wciera się płyn:

562. *Lactis sulphur.* 5·00,

Trae Rusci

Spirit. vini gallici aa. 50·00,

Glycerini 1·00.

MDS. Zewnętrznie:

563. *Anthrarobin* 10·00,

Ol. oliv. 30·00,

Lanolin 60·00.

Mfungu. S. Zewnętrznie:

Herpes tonsurans tułowia.

W postaci pęcherzykowej lub chrostkowej nie wymaga leczenia, bo się sam organizm pozbywa grzybków.

Herpes tonsurans maculosus.

Sposób Hebry:

Przez 6 dni naciera się 2 razy dziennie mydło szare, bez zmywania warstwy poprzedniej, przez następne 6 dni, pozostaje mydło na skórze, 12-go dnia chory bierze kąpiel. Kaposi poleca wcierać przez 3 wieczory.

564. *Sapo viridis* 100·00,

Naphthol-B 4·00.

Maść ta pozostaje na skórze 8 dni, 12-go dnia kąpiel. Srodek ten poleca bardzo Prof. Rosner.

Można także używać maści Wilkinsona.

565. *Ol. Rusci*

Lactis sulph. aa. 25·00,

Saponis viridis

Azungiae porci aa. 50·00.

Mf. ungu. S. Maść.

Maść tę wciera się przez 4 wieczory, pozostaje przez 4 dni a 9-go dnia daje się kąpiel.

Hordeolum zob. Chalazeon.

Hydrocephalus.

H. acutus. Zimne okłady, wcieranie szaruchy (po 2·0—4·0 dziennie na głowę i kark), wewnętrznie podać Calomel, (0·01—0·03 co godzinę).

Dzieciom silnym można postawić 2—4 pijawek.

W razie drgawek chloral (0·50—1·0 pro dosi). Synapizm na łydki i kark.

Leczenie krzywicy i żółtów.

H. chronicus. Leki moczopędne (*Kali aceticum*, *Juniperus*) leki przeczyszczające. Wypuszczenie wody (punkcja) niewiele rokuje. Somna radzi leczyć działaniem słońca na głowę: codziennie 1/2 godziny do 50 minut.

Hyperaemia cerebri.

Uwzględnić przyczyny i te usuwać: nadużycia trunków, przeciążenie pracą umysłową, ucisk na szyję, grę na instrumentach dętych, wady serca, rozedma płuc i t. p.

Zimne okłady na głowę, środki przeczyszczające, dyeta.

U dzieci: Pijawki za uszami, zimne okłady na głowę, środki czyszczące (*Calomel*, *Rheum*, *Jalapa*) lewatywy, pryszczycidła na łydki. W razie drgawek lewatywy z chloralu (0·50—1·0).

Hyperemesis gravidarum.

Zbadać dokładnie ciężarna w celu czy się nie da wykazać przyczynowe cierpienie: tyłopochylenie, tyłozgięcie ciężarnej macicy, lub inne zmiany narządu płciowego, lub innych organów jak nieżyt żołądka, białkomocz, i w takich razach leczenie przyczynowe.

W przypadkach, gdzie żadne zmiany wyraźne wykazać się nie

dadzą, należy używać środków zrazu łagodniejszych, później coraz silniejszych, z tych, które bywają zalecane. Uregulowanie i zmiana diety, picie śniadania w łóżku, jedzenie z rana pokarmów ostrych j. n. p. kawałek śledzia, albo picie cognacu zaraz po przebudzeniu. Dyeta mleczna, podawanie pokarmów chłodnych, woda sodowa, wody mineralne alkaliczne, polykanie kawałeczków lodu. Kawa mrożona, lody, wino szampańskie przy jedzeniu. Stomachica, pepsyna, kwas solny.

566. *Mag. Bismuth 1·50,*
Natri bicarb.
Sacch. albi āā. 2·00,
Mf. pulv. div. in dos. X.
DS. 3 razy dnia proszek.

567. *Kali bromati*
Natri bromati
Ammon. bromati āā. 3·00,
Aqu. dest. 200·00,
D. in vitr. nigro.
S. Rano i wieczorem po łyżce w wodzie sodowej.

568. *Cerium oxalicum.*
1—2 pigulek (po 0·05) na dzień.

569. *Cerium valerianicum.*
5 pigulek po 0·05 dziennie.

570. *Cocaini muriat. 0·10,*
Aqu. dest. 100·00.
DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. pół łyżeczki.

571. *Cocaini muriatici 0·10,*
Aqu. dest. 10·00.
DS. 3—4 razy dzien. 10—15 kropli.

572. *Menthol 1·00,*
Spiritus vini 20·00,
Aqu. dest. 150·00.
S. Co godzinę łyżkę.

573. *Aqu. laurocer. 10·00,*
D. in l. nigra.
S. Kilka razy dnia po 10 kropli na lodzie.

Narkotyki jak opium, morfin, chloral, jużto przez usta, jużżeć podskórnice lub w lewatywach.

Lodowe okłady. synapizma, rozpylanie eteru na okolicę żołądka.

W cięższych przypadkach odżywianie przez odbytnicę.

Gdy te środki nie prowadzą do celu, pomazywanie części pochwowej rozczynek azotanu srebrowego (1:10) lub laseczką. Stosowanie na część pochwową belladonny lub cocainy.

Rozszerzenie palcem szyi macicy, w sposób aseptyczny, (zabieg ten ostrożnie, gdyż grozi poronieniem).

Gdy chora nie zatrzymuje zupełnie pokarmów i zachodzi obawa o życie, wskazanem jest, wzniecenie poronienia co jednak ex consilio winno być postanowione.

Hyperidrosis.

Axillae, genitalium palmae manus i lżejsze stopnie potu stóp, ustępują przy zmywaniach kilka razy dziennie wodą letnią i nacieranie wódką francuską lub wodą kolońską i przy częstej zmianie bielizny i obówia, które powinno być wietrzone. W wyższych stopniach obok powyższego zachowania czystości w każdym stopniu Hiperidrosy niezbędnego, używa się do zmywań następujących środków:

574. *Tannini 1·00,*
Spirit. vini rectif. 250·00.
DS. Zewnętrznie.

575. *Sublimati corross. 1·00,*
Aqu. dest. 400·00.
DS. Zewnętrznie.

576. *Decoct. cort. Quercus*
20·00 ad 500·00.
DS. Zewnętrznie.

577. *Kali hypermang. 1·00,*
Aqu. dest. 400·00.
MDS. Zewnętrznie.

W niektórych przypadkach potów rąk i stóp, robi dobre usługi zmywanie rozczynek:

578. *Naphthol* 10·00,
Spir. vini gallici 175·00,
Spir. coloniensis 25·00.
 MDS. Zewnętrznie.

Obok tych środków używa się pudru, który w miejsca stykające się z sobą z watą zakładamy.

579. *Acidi Salicyl.* 5·00;
Alum. 2·00,
Acidi tannici 3·00,
Amyli tritici 90·00.

S. Pudrować stopy i posypywać obówie wewnątrz.

W uporeczywem poceniu stóp, najlepsze usługi oddaje maść Hebry, na wypranem starem płótnie rozprowadzona. Płatek namaszczonej musi dokładnie przylegać do stopy, między palce daje się waciki z maścią, w ten sposób chory po wdzianiu skarpetki na wierzch, może bez dolegliwości oddawać się zwykłym zatrudnieniom.

Po 24 godzinach zmienia się maść, bez obmywania stóp, ściera się tylko dawna maść watą.

Leczenie takie trwa 10—14 dni. Po upływie tego czasu używa się pudru.

Ze środków wewnętrznych używanych przeciw potom są następujące:

580. *Agaricini* 0·005,
Extr. et pulv. Acori q. s. ut f. pil. dtr. tal. dos. N. XII.
 DS. 3 pigułki dziennie.

581. *Atropini sulph.* 0·007,
Extr. et pulv. Liquirit q. s. ut f. pil. X.
 DS. 2 pigułki dziennie.

Z innych środków wewnętrznych, tonica roborantia, diuretica.

Owzrozdzenia smarować 5% maścią resorcynową.

Hysteria.

Zwrócić uwagę na zmianę w poszczególnych organach, zwłaszcza

cza w narządzie moczopłciowym i starać się istniejące złożenia usunąć.

Chorą leczyć psychicznie i starać się zyskać zaufanie. Jeżeli jest anaemia, chlorosa, to odpowiednio leczyć. U osób wynędzniałych dobre skutki daje metoda Weir-Mitchella.

W cięższych przypadkach, chorego umieścić w odpowiednim zakładzie i leczenie systematycznie przeprowadzić.

W mniej wybitnych, leczenie w zakładach wodoleczniczych, zimne nacierania, kąpiele letnie, kąpiele borowinowe (sól borowinowa Mattoniego) i inne procedury. Elektryzowane prądem stałym, lub faradycznym także nieraz dobre skutki daje.

Ze środków wewnętrznych wszystkie nerwina, jak *asa foetida*, *Castoreum*, *Valeriana*, *Camphora bromata*, *Zincum valerianicum* i wiele innych. Obok tego pobyt na wsi, w górach lub kąpielach morskich, higieniczne życie, dyeta pożywna niepodniecająca.

Podczas napadu hysterycznego raptowne zlanie wodą twarzy, silny prąd elektryczny, chłodna kąpiel, Chloral w lewatywie lub na wewnątrz. W razie bezsenności Sulphonal 1—2 grm. lub Chloralamid 2—3 grm. na noc.

582. *Sulfonali* 1—2·00,
Dtr. tal. dos. 6.

S. Na noc proszek, popić znaczną ilością herbaty lub rosołu.

583. *Amylenhydrat*, 5·00,
Aqu. dest. 60·00,
Syrup aurant. 10·00.
 S. Na noc połowę.

Ichthyosis.

Usunięcie twardych blaszek przyskrórkowych zapomocą tłuszcz-

czów (oliwa, tran) maści Wilkinsona, którą się na noc naciera razem z mydłem szarem, a rano się zmywa. Kaposi chwali bardzo 5% maść naftolową, którą się 1—2 razy dziennie naciera, a co 2-gi dzień mydłem naftolowym zmywa. Skoro skóra pod wpływem tych środków stanie się podatną i gładką, staramy się utrzymać ją w tym stanie, przez kąpiele i wcieranie tłuszców obojętnych. Na wewnątrz podaje się chinin, żelazo, arszenik, pilocarpin.

Icterus.

Leczenie powinno być przede wszystkim zastosowane do przyczyny cierpienia, (vide Cattarrhus gastro-duodenalis, Cholelithiasis, Cirrhosis hepatis, Carcinoma hepatis etc.). Zresztą leczenie przypadkowe, w razie bólów w okolicy wątroby, okład ciepły i wstrzykiwania podskórne morfiny.

Swędzenie skóry łagodzą ciepłe kąpiele z dodatkiem sody i zmywania 2% kwasem karbowym, z dodatkiem sody lub rozczyn:

584. *Acidi carbol.* 10·00,
Chloralhydr. 5·00,
Aq. dest. 500·00.
S. Do nacierań.

Dyeta przeważnie mleczna i rosółowa (unikać mięsa).

585. *Infus. rad. rhei* e 10·00
ad 180·00,
Magnes. ustae 5·00,
Syr. simpl. 20·00.
MDS. Co 2 godz. łyżkę.

W chronicz. przyp. wody Karlsbad, Maryenbad. Przeciw bieguncie Bismut, Dover, opium. Przytem amara np.:

586. *Fol. trifol. fibrin*
Hb. Millefolii
Centaur. min.
Fol. menth. pip.
Fruct. foenicul. āā. 30·00,
Mf. Species.
S. Herbata: 1—2 łyżek na ½ litra wody.

W nowszych czasach używano z dobrym skutkiem wlewania zimnej wody w 1-szym dniu na 12—13° R., w 2-gim 15—16° 3 i 4-go dnia 18—20° w ilości 1—2 litrów. U dzieci również tak samo, płynu jednak nie więcej jak jeden litr.

587. *Argenti nitric.* 0·06,
Aqu. dest. 180·00.
DS. 3—4 razy dz. łyżkę.

W celu pobudzenia wydzielania żółci.

588. *Podophyllin* 0·015,
Extr. bellad. 0·01,
Extr. nuc. vom. 0·02,
f. pill. N. 1. tales 20.
S. 2—3 pig. na noc w ciągu godziny użyć.

Ileus.

Jeżeli przyczyną niedrożności jelit jest zwężenie, okrucenie, uwiąznięta przepuklina, nie wiele można się spodziewać z leczenia środkami wewnętrznymi, należy przystąpić do zabiegu operacyjnego, przedtem jednak należy przez podawanie przetworów mawkowa uspokoić gwałtowne ruchy jelit i zapomocą dużych lewatyw próbować przywrócić drożność. Lewatywy z wody sodowej: łączy się syfon z sondą do odbytnicy włożoną i powoli wypróżnia. Gdy powodem niedrożności jelit jest uwiąznięta przepuklina, należy starać się ją odprowadzić (vide Hernia incarcerata). Jeżeli niedrożność jelit pochodzi z wgłobienia, udaje się często zapo-

mocą przetworów makowca i lewatyw drożność przywrócić. W nowszych czasach polecają prócz tego, wypróżnienie żołądka zapomocą aspiratora żołądkowego.

Gdy te środki nie skutkują, nie należy długo zwlekać z zabiegiem operacyjnym.

Gdy przyczyną cierpienia jest zaparcie kału, a nie ma objawów zadrażnienia otrzewnej, należy podawać środki przeczyszczające w dużych dawkach, w razie przeciwnym lub, gdy środki czyszczące nie skutkują, przetwory makowca, okład lodowy na brzuch, kawałki lodu do połknięcia, zresztą leczenie przypadowe.

Impetigo vide: Eczema faciei impetiginosum.

Influenza.

W czasie epidemii zapobiegawczo brać po 0.25 chininy. Gdy choroba wybuchnie, środek przeczyszczający (Calomel 0.50 pro dosi, dzieciom 0.05—0.10). Dalej leczenie objawów, środki przeciwgorączkowe. Chinina, Antipyrina, Phenacetin, Coffeina, szczególnie, gdy bóle głowy zbyt silne. Natr. salicylicum (zwłaszcza dzieciom).

Przeciw nieżytom oskrzeli Inf. Ipec. cum Natro et Codeina.

Starcom zaraz podać wino i środki wzmacniające.

Insolatio.

Zdjęcie sukien, ochładzanie ciała, tryskanie zimną wodą. Po ocuceniu duże ilości kawy, herbaty. Kąpiel. W razie zapadu, sztuczne oddychanie, amoniak do wachania.

Intermittens.

W czasie napadu leżenie w łóżku. Podczas dreszczu, ogrzewa-

nie, wśród gorączki chłodzenie. Przed napadem wiadomym, na 5 godzin chinina.

Częste napady wymagają zmiany miejscowości.

589. Chinin muriatici 0.50,

Dtur. tal. dos. N. V.

S. Przed napadem proszek.

Przez kilka dni chociażby napad się nie powtórzył, rano i wieczór po proszku.

Jeżeli chory chininę wymiotuje, można ją dać w lewatywie z krochmalem lub:

590. Chinini muriat. 0.50,

Glycerin.

Aqu. dest. āā. 2.00,

(Disp. sine acido).

S. Wstrzyknąć pod skórę.

591. Phenocolli hydrochl. 1.00,

Dtur. tal. dos. VI.

S. Przed napadem na kilka godzin proszek i przez kilka dni podawać.

Przy dłuższem trwaniu:

592. Decoct. cort. chinæ

e 10.00 ad 180.00,

Sol. arsen. Fovleri 1.00,

Syrup Sacchari 20.00.

MDS. 4 łyżki dziennie.

593. Sol. arsen. Fovleri 5.00,

Trae chinæ comp. 15.00.

S. Rano i wieczór po 5 kropli, postępować co dzień o jedną kroplę, aż do 20-tu.

594. Trae Eucalypti glob. 15.00.

S. Kilka razy dziennie po 10—20 kropli.

Dzieciom:

Chinini muriat. 0.30—0.50.

Jeżeli wymiotują, dać w lewatywie lub czopkach.

595. Chinin muriatici 0.25,

Butyri Cacao 0.50,

Mf. supposit dtur. tal. N. IV.

S. Przed napadem na 3 godz. czopek, a później, po jednym przez kilka dni.

596. *Chinini tannici*
Sacchari āā. 2'00,
Mfp. div. in dos. N. VI.
 DS. 3 proszki dziennie, co go-
 dzinę jeden.

597. *Chinini muriat.* 0'50,
Acid. tartar. 0'30,
Syrup simpl. 60'00.
 DS. 2 lub 3 łyżeczki w małej
 ilości czarnej kawy parę ra-
 zy dziennie.

598. *Trae Helianthi* 1'00,
Aqu. dest. 5'00.
 DS. 3 razy dziennie po 10—20
 kropli.

599. *Sol. arsen. Pearsoni*
Trae chinae āā. 5'00.
 MDS. 3 razy dziennie po 2—3
 kropli,

Intertrigo.

Utrzymywanie czystości skóry
 i przed zamoczeniem chronić.
 Dzieciom tłustym pudrować
 we fałdach skóry.

600. *Acidi Salicyl.* 0'50,
Alum. plumosi
Amyli āā. 25'00.
Mfp. S. Puder.
601. *Kali sozojodolici* 5'00,
Talci 50'00.
Mfp. S. Puder.

Zakładać we fałdy skóry płat-
 ki posmarowane jedną z poniżej
 podanych maści. Kąpiele letnie
 na 26° z dodatkiem otrab lub
Bolus alba (50—100).

W przypadkach uporeczywych
 z dodatkiem Sublimatu (0'50).

Na częściach płciowych i od-
 bytnicy pędzlowanie Sublima-
 tem (0'50:100 aquae).

602. *Acidi borici* 0'50,
Lanolin 50'00,
Vaselin 10'00.
Mf. ungn. S. Przed posmaro-
 waniem oczyścić skórę.

603. *Acidi salicyl.* 0'20,
Lanolin 20'00,
Mf. Unguentum.

604. *Ichtyoli* 0'30,
Lanolin 30'00,
Mf. Unguentum.

605. *Cocain oleinici* 0'50,
Lanolin 18'00,
Ol. olivar. 2'00.
Mf. Ungu. S. W razie silnego
 świądu posmarować.

Przed smarowaniem maści o-
 czyścić skórę z resztek proszków
 lub maści, maść 2 razy dziennie
 nakładać.

Do zmywania.

606. *Aqu. Plumbi*
Aqu. boric. 5% āā. 100'00.
 DS. Zewnętrznie.

Iritis.

Zapalenie tęczówki występuje
 w następujących formach: *Iritis*
plastica, *serosa*, *suppurativa*,
gummosa lub forma mieszana
 z dwóch poprzednich.

Leczenie jest następujące:

1) Zapuszczanie atropinu z po-
 czątku co 2 godziny, aż osiągnie
 się maxymalne rozszerzenie źre-
 nicy, a obecne tylne przyczep-
 piny ulegną rozerwaniu.

Przy *Iritis plastica*, dobrze jest
 zapuszczać atropin z *Cocainą*
 w celu rozerwania synechii, po
 tem zaś sam atropin, który w dal-
 szym przebiegu choroby 3 razy
 dziennie zapuszczać należy, a
 po ustąpieniu choroby jeszcze
 przez 3 tygodnie raz dziennie.

Iritis serosa wymaga od po-
 czątku tylko 2 razy dziennie a-
 tropinu i badania napięcia ocz-
 nego.

2) Ciemny pokój, lekko prze-
 czyszczające środki, przebywa-
 nie dużo w łóżku, lekkie wie-
 czorne poty.

W razie bólów w nocy, injek-
 cya morfiny w skroń.

3) Ciepłe okłady wilgotne z ma-
 ki siemienia lnianego, robione
 przez cały dzień, wpływają le-

czaco na chorobę i kojaco na bóle; wcieranie maści belladonowej w skroń co 2 godziny w razie bólów.

4) Uwzględnienie przyczyny: Syphilis, wcieranie Ungu. cin. systematycznie przeprowadzone. Rheuma, Natr. salicylicum wewnętrznie; diabetes: sól karlsbadzka; przy zółtach: jod.

Jeżeli źrenica mimo energicznego atropinizowania rozszerzyć się nie chce, postawić na skroń 4—5 pijawek. Zarośnięcie źrenicy (occlusio vel seclusio) wymaga wykonania Iridectomii.

607. *Atropini sulph.* 0·05,
Cocaini muriat. 0·10,
Aqu. dest. 5·00.

MDS. Atropina do oka. Zakraplać.

608. *Atropini sulph.* 0·05,
Aqu. dest. 5·00.

DS. Atropina do oka.

609. *Morphii muriat.* 0·10,
Aqu. dest. 10·00.

DS. Morfina 1% do iniekcji podskórnych — do rąk lekarza.

610. *Ung. hydrarg. cin.* 15·00,
Extr. belladonnae 2·00.

MDS. Maść belladonowa na czoło.

611. *Ung. hydrarg. cin.* 30·00,
Div. in p. aequ. N. X.

DS. Szara maść do wcierań.

612. *Kali chlorici* 10·00,
Aqu. dest. 500·00.

DS. Plukanie do ust.

613. *Natri salicyl.* 10·00,
Aqu. dest. 200·00.

DS. 2 łyżki dziennie.

614. *Natri jodati* 8·00,
Aqu. dest. 200·00,

D. in v. n.

DS. 2 łyżki dziennie.

615. *Farinae sem Lini* 100·00.

DS. Mączka do okładów.

Dla dzieci:

616. *Natr. jodati* 4·00,

Aqu. dest. 200·00,

D. in v. n.

DS. 2 łyżeczki dziennie z mlekiem słodkiem.

Ischias.

Przyczynę wynaleść i takową usunąć.

Jeżeli na tle malaryi, to chinina, arsen; jeżeli wskutek zaziębienia: kąpiele ciepłe, łaźnia parowa, leżenie w łóżku, ciepło utrzymywanie nóg, środki odwodzące, wzdłuż nerwu kulszowego, jak: suche bańki, Tinct. jodi, synapizma, vesicatoria, obok tego massage, prąd elektryczny stały (anoda na miejsce bolesne), rozpylanie eteru przyrządem Richardsona, na wewnątrz antipyrina. Natr. Salicylicum, phenacetyne, antifebryne, salol, betol, kali jodatum w dawkach kilkagramowych dziennie.

W razie silnych bólów iniekcye morfiny. Można też wstrzykiwać:

617. *Acid. hyperosmici* 0·10,

Aqu. dest. 10·00.

S. $\frac{1}{4}$ strzykawki Prawatza.

Jeżeli neuralgia się zmniejszy i chorego można wysłać do kąpiel to: Swoszowice, Krzeszowice, Lubień, Cieplice czeskie, Trenczyn, Piszczany, Busk, kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa),

W przypadkach ciężkich ucieć się można do naciągania nerwu.

618. *Antipyrin.*

Chinini muriat. āā. 0·50.

S. 3 proszki dziennie.

619. *Euphorin* 0·40,

Dtur. tal. dos. 20.

S. 2—3 razy dziennie.

620. *Salophen* 1'00,
D. tal. dos. Nr. 10.
 S. Co 2 godziny proszek.

621. *Analgeni* 0'50,
D. tal. dos. Nr. 10.
 S. 3—5 pr. dziennie.

622. *Betoli* 3'00—5'00,
Sacchari 3'00,
Mfp. div. in dos. N. X.
 S. 4 proszki dziennie.

623. *Salol* 0'50—1'00,
Sacchari 3'00,
Dtr. in capsul. amylac.
 S. 3 proszki dziennie.

624. *Antinervin* 0'20—0'30.
 Kilka razy dziennie.

Exalgin 0'30—0'40 *pro dosi.*
Methylen. coerul. 0'02—0'03
pro dosi.

Kephalhaematoma.

Pokryciem z waty chronić guz od urazów. Nie robić nacięć, tylko w razie ropienia.

Keratitis.

1) Zapalenie rogówki ropne (*Keratitis suppurativa*).

W lżejszych przypadkach leczenie ambulatoryjne: Przepłukanie raz dziennie worka spojówkowego roztworem sublimatu 1:5000'00 zasypanie drobno-miającego jodoformu i założenie opaski. Procedurę tę powtarzać co dzień, aż do zupełnego wyleczenia.

W cięższych przypadkach przepłukiwania sublimatem co 2 godziny, jodoform, atropin 1% kilka razy dziennie i ciepłe wilgotne okłady z siemienia lnianego (zob. *Iritis*) na noc opaska, ciemny pokój i łóżko.

Skoro powyższe leczenie zawodzi, wypalenie części rogówki nacieklą ropą, a więc żółtawo zabarwioną, galwanem lub termokauterem, lub też keratotomia *Saemisch*a obok powyższego le-

czenia. Po wyleczeniu należy dłuższy czas jeszcze nosić opaskę.

W razie obecności ciała obcego w rogówce, wydobycie tegoż bezzwłoczne.

2) Zapalenie rogówki mięszowe (*Keratitis parenchymatosa diffusa*).

W okresie 1-szym progressy (zaćmienia zwiększają się, nastrzykanie rząskowe, powierzchnia rogówki jakby drobno pokłuta, światłowstręt i łzawienie) nie można używać środków drażniących i jedynie ciemne, dymanne okulary litera C., zapuszczanie atropinu 3 razy dziennie (zob. *Iritis*), zasypywanie bardzo małej ilości jodoformu raz dziennie. Zakazać pracy oczyma, ograniczenie ilości światła, jednak nie zamykanie w ciemnym pokoju. Jod wewnętrznie lub w razie nabytej kiły wcieranie *Ungu. ciner. à* 3'00 (zob. *Iritis*) są wskazane, a przy tem jak najlepsze łatwo strawne a niepodniecające odżywianie.

W okresie 2-gim (objawy zdrażnienia i zaczerwienienia oka zupełnie ustąpiły, zaćmienie rogówki od obwodu zaczyna ustępować, rogówka na powierzchni gładka) przejść na leży do środków lekko drażniących, raz dziennie zaczynając od *Calomelu* i zmieniając co jakiś czas (zob. *Maculae corneae*).

3) *Keratitis phlyctenulosa* (zob. *Conjunct. phlyctenulosa*).

Zapalenie rogówki występujące, jako następstwo cierpienia spojówek (*Trachoma. Phlycteny, Ulcera corneae catarrhalia, Blepharorrhoea*) wymagają głównie przyczynowego leczenia i są w odnośnych rozdziałach uwzględnione.

Laryngitis acuta.

Pobyć w dobrze przewietrzanym mieszkaniu, najmniej mówić, co 6 godzin okład wysychający. Środki napotne (herbata lipowa, lemoniada). Woda Szczawnicka, Giesshübler, Selterska z mlekiem. W celu zmniejszenia kaszlu narcotica. W razie silniejszego zapalenia środki oczyszczające, okłady lodowe, pigułki z lodu, synapizma na szyję.

625. *Det. alth. e* 10'00 ad 200'00,
Morphii mur. 0'05,
Syrup Sacchari 20'00.
DS. Co 2 godz. łyżkę.

626. *Natri benzoic.* 15'00,
Syrup terebinth. 50'00,
Syrup tolutan. 15'00.
MDS. Co 2 godz. łyżkę.

627. *Sal. ammoniaci* 5'00,
Aqu. dest. 500'00.
S. Do inhalacyi.

628. *Natri borici* 10'00,
Aqu. dest. 500'00.
S. Do inhalacyi.

629. *Natri bicarb.*
Natr. chlorat. āā. 5'00,
Aqu. dest. 500'00.
S. Do inhalacyi.

630. *Aqu. lauroc.* 5'00,
Spir. vini rectif. 50'00—100'00.
S. Łyżeczkę do inhalacyi.

631. *Acid. carbol.* 0'50—1'00,
Cocain hydrochl. 0'25,
Glycerin 50'00,
Aqu. 450'00.
S. Do inhalacyi 3 razy dzien.
U dzieci zob. Pseudocroup.

Laryngitis chronica.

Wzbronąć nadużywania głosu, wychodzenia wśród niepogody, palenia tytoniu, używania napojów wysokich. Polecieć w razie zółzów kąpiele słone (w domu), pobyt w okolicach górzystych i lesistych, zwłaszcza

gruźliczym, a również picie mleka, żentycy, kefiru.

Otyłym zalecić picie wody Karlsbadzkiej, Maryenbadzkiej.

W razie podrażnienia do kaszlu, duszności: narcotica.

632. *Ammon. muriat.*
Succi liquir āā. 5'00,
Aqu. dest. 120'00,
Morph. mur. 0'03.
S. Co 2 godz. łyżkę.

633. *Zinci sulphur.* 1'00,
Aqu. dest. 500'00.
S. Inhalatio.

634. *Alumin crudi* 5'00,
Aqu. dest. 500'00.
S. Inhalatio.

635. *Tannin.* 3'00—5'00,
Spir. vini rectif. 50'00,
Aqu. dest. 500'00.
S. Inhalatio.

636. *Ol. Juniperi*
Ol. Terebinth. āā. 10'00.
S. Po 10—20 kropli do inhalacyi.

637. *Ol. pini pumilion.*
Ol. juniperi āā. 10'00.
S. Po 10—20 kropli do wzięwania.

Do wdmuchiwania:

Alum. crud.
Tannin. pur.

Pędzlowania:

638. *Argent. nitr.* 1'00—5'00,
Aqu. dest. 50'00.
S. Do Pędzlowania.

639. *Zinci sulphur.* 2'00,
Aqu. dest. 20'00.
S. Do pędzlowań.

640. *Jodi puri* 0'50,
Kali iod. 1'00,
Glycerin 50'00.
S. Do pędzlowań.

Laryngitis crouposa.

W początku nieżyty, czem się dławiec rozpoczyna, dać dziecko do łóżka i stosować środki wy-

krztuśne, w połączeniu z Kali chloricum, Kali carbonicum. W celu zachowania sił dziecka dać pożywną dyetę — skrobane mięso, jaja, winną polewkę, mleko z herbatą, cognakiem.

Nieużywać ani upustu krwi, ani pijawek, pryszczydeł. Lekkie środki przeczyszczające.

Aby zapobiedz wytwarzaniu się błon, zimne okłady na szyję, polykanie lodu lub lodów. Inhalacye z aparatu Siegla, już to z wody wapiennej, już to z podanych niżej środków, z początku co 3 godziny.

Obok tego improwizowana parówka t. j. okrywa się pewną małą przestrzeń pokoju prześcieradłami szczelnie. W takiej budce trzyma ktoś dziecko, aby wdychało parę, zrobioną przez puszczenie rozpalonego żelaza do wody w naczyniu na podłodze stojącym — powtórzyć parę razy dziennie.

W celu pobudzania do rychlejszego odrywania się błon, robi się weierania z szaruchy 3 razy dziennie, a to można połączyć z mieniem krtani. Podawać obficie napoje. Inhalacye częste, w pokoju utrzymywać dużo pary.

Wrazie silnej gorączki chinina, po 0·20—0·30 już to w proszkach, w roztworze do wewnątrz, już to w lewatywie, dawszy poprzednio lewatywę odczyszczającą. Gdy występują objawy ścieśnienia krtani, (stenosis) przeczem i błony zaczynają się odrywać, dawać środki wykrztuśne.

W razie upadku sił: wino, cognac, czarna kawa z rumem, kamfora. Jeżeli przy wdechu i wydechu słycać rżenia z odrywających się błon, wtenczas można dać środek wymiotny.

Gdy się jednak ścieśnienie krtani wzmacnia, występuje zapadanie dołków nadobojczykowych, zaciąganie się dołka pod-

sercowego, bezgłos i napady duszności — nie zwlekać z wykonaniem Tracheotomii lub intubacji.

641. *Inf. ipecac. e 0·20 ad 80·00,*
Kali chlorici 1·00,
Syrup rubid. 20·00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

642. *Ungu. hydrgr. ciner.*

Lanolin aa. 6·00,

Mfung. div. in dos. N. VI.

S. 3 razy dnia po jednej sztuce wetrzeć w szyję.

643. *Ammon. muriatici 1·00,*
Aqu. dest. 200·00.

DS. Do inhalacji.

644. *Acidi lactici 2·00,*

Aqu. dest. 300·00.

DS. Do inhalacji.

645. *Sublim. corrosivi 0·05,*
Aqu. dest. 300·00.

DS. Do inhalacji.

Używa się również do inhalacji:

Kali chlorici 2½%, Acid. borici 2½%, Resorcini 1½%.

646. *Infus. ipecac. e 0·20 ad 100·00,*

Pilocarp. muriat. 0·02,

Syr. Rubi idaei 15·00.

MDS. Co pół godz. łyżeczkę.

647. *Pilocarpin 0·02,*

Ammon. carb. 2·00,

Kali chlor. 2·00,

Cognaci 20·00,

Syr. Senegae 25·00,

Aqu. dest. 170·00.

DS. Co godz. 2 łyżeczki.

648. *Inf. Senegae e 3·00 ad 80·00,*

Liquor amon. anisati 1·00,

Syrup simpl. 15·00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

649. *Inf. ipecac.*

e 1·00 ad 50·00,

Tart. emetic. 0·05,

Syrup rubid. 10·00.

MDS. Co 5 minut łyżeczkę aż do wymiot.

Radzą też w razie duszności, gdy niemożna robić tracheotomii:

- 650.** *Aether sulphur.* 3'00,
Aether acetic. 1'00,
Menthol 0'10.

Co kwadrans kilka kropli na na wacie trzymać przed ustami, jak przy chloroformowaniu.

Leukaemia.

Przyczyna niewiadoma. Leczenie prawie zawsze bez skutku.

Podawać należy chininę z żelazem, lub dodatkiem arszeniku. Po dłuższem użyciu zmienić na ol. eucalyptusowy i piperynę, lub polecić pić wodę Gubera, Levico lub Roncegno. — Krynica, Żegiestów.

Próbowano robić wstrzykiwania do mięszu śledziony:

Ergotyny 0'50—1'0, lub Sol. arsen. Fowleri. Żywić chorego forsownie, pobyt na świeżem powietrzu najlepiej górskim, mierny ruch, zresztą leczenie symptomatyczne.

- 651.** *Piperini* 5'00,
Ol. eucalypti e foliis rec. 10'00,
Chinin muriat. 4'00,
Extr. et pulv. liquir q. s. ut f. pil. N. 100.

S. 4—8 pigułek dziennie.

- 652.** *Trae eucalypti* 50'00.
 DS. 2—3 łyżeczki na dzień.

Lichen scrophulosorum.

Poprawienie odżywienia, pobyt na świeżem powietrzu, suche mieszkanie, wewnątrznie tran.

- 653.** *Jodi puri* 0'10,
Olei jecoris aselli 150'00.

MDS Rano i wieczór łyżkę.

W celu szybszego usunięcia wysypki, naciera się skórę 2—3 razy dziennie tranem i układa się pacyenta między kocami wełnianymi.

Lichen ruber.

Jedynym środkiem usuwającym tę chorobę jest arszenik, który należy podawać przez 6—9 miesięcy, by zapobiedz nawrotowi choroby.

- 654.** *Pillularum arsenic. asiaticarum Hebrae* N. 100.

DS. Z początku 3 pigułki dziennie, co 4-ty dzień podwyższa się dawkę dzienną o jedną pigułkę, dochodząc do 8 nawet do 10 dziennie, trzymamy się tej ilości dawką, dopóki sprawa w znaczniejszej części nie ustąpi, następnie schodzi się do 6 pigułek dziennie, które się przez 3—4 miesięcy używa.

Szybciej działają, lecz od recydywy nie zabezpieczają:

- 655.** *Solut. arsen. Fowleri* 4'00,
Aqu. dest. 20'00,
Acid. carbolici 0'40.

DS. Co 2-gi dzień wstrzyknąć całą strzykawkę Prawaza —

Unna podaje maść, którą się 2 razy dziennie wciera:

- 656.** *Sublimati corrosivi* 0'10,
Acid. carbol. 2'00,
Unguenti Hebrae 50'00.

Mf. ungu. S. Maść.

W razie swędzenia używa się kąpeli siarczanych, sodowych i naciera się skórę płynem:

- 657.** *Acid. salicyl.* 2'00,
Spirit. vini gallici 100'00,
Glycerini 6'00.

Następnie posypuje się pudrem.

W razie bezskuteczności arszeniku podają na wewnątrz tartras antimon. 0'008 pro dosi, z początku 5 razy dz., później 4 razy dz. Zewnętrznie hydroterapia.

Lupus vulgaris.

Dopóki lupus występuje w formie plam lub guzków odoso-

bnionych wystarcza wypalenie c. nitrato argenti in substantia, guziczek przebija się aż do tkan-ki łącznej zdrowej.

Jeżeli już są wystające rozle-glejsze nacieki: wyłyżeczkowa-nie i wypalenie Pacquelinem, lub gdy naciek bardzo znaczny, przykładą się przez 8—10 dni masę pyrogallusową 10% tak, by masę dniem i nocą stykała się z naciekiem, lub używa się emplastrum hydrargyri, okłady z gazy jodoformowej tranem na-pojonej co 2-gi dzień naprze-mian z opatrunkiem jodoformowym.

Lupus erythematosus.

Poprawienie odżywienia (tran, żelazo, arsenik).

Miejscowo: zmywanie codzien-ne c. spiritu saponato kalino, na noc emplastrum hydrargyri.

Lymphangioitis.

Usunięcie przyczyny (otwarcie ropnia, oczyszczenie rany pier-wotnej, zdjęcie strupa, pod któ-rym się ropa zatrzymuje i t. p.). Na część zajętą chorobą, okłady wysychające z octanu glinowe-go. Dyeta pożywna, wyskok w znaczniejszej ilości.

658. Alum. crud. 40'00,
Plumb. acet. 70'00,
Aqu. dest. 600'00.
Filtrować!

S. Do okładów.

Lymphoma.

W pierwszym rzędzie lecze-nie przyczynowe (serophulosis, pseudoleukaemia i t. p.)

Na wewnątrz z początku wy-pada stosować masę jodową, a w razie nieskuteczności tejże, zwłaszcza jeżeli gruczoły oka-zują dążność do ropienia, naj-lepiej takowe wyłuszczyć lub wykrobać ostrą łyżką. W przy-

padkach t. zw. lymphoma mali-gnum najskuteczniejszem jest leczenie zapomocą przetworów arsenu.

Na wewnątrz należy podawać Sol. arsen. Fovleri lub wody arsen zawierające, (woda Gubera, Roncegno, Levico), do mięszu zaś gruczołów wstrzykiwać co-dziennie po kilka kropli Sol. arsen. Fovleri. W niektórych przypadkach, w których arsen zawodzi, działają bardzo dobrze wstrzykiwania kwasu nadosmo-wego.

659. Sol. ars. Fovleri

Trae ferr. pom. āā. 10'00.

S. Codziennie przed obiadem od 2 kropli począwszy o 2 krople zwiększać dawkę aż do 50, a potem znów o 2 krople codziennie zmniejszać.

660. Sol. ars. Fovleri 10'00.

S. Do wstrzykiwań.

661. Ac. hyperosmic. 0'10,

Aqu. dest. 10'00,

D. in vitro nigro.

S. Do wstrzykiwań.

662. Jodol 5'00,

Vaselin 50'00.

Mf. ungu. S. Maść.

Lyssa.

Rany nie wysysać! Wyciąć o-kolicę miejsca ukąszonego, przy-żegać rozpalonem żelazem lub kali caustic., lub acid. carbol. pur., oraz dobrze opatrzyć. Gdy wścieklizna wybuchnie, można próbować wstrzyknięcia Curary.

663. Curare 0'20,

Aqu. dest. 5'00,

Acid. mur. gttam.

MDS. Na 5 wstrzyknięć.

Chloral, morfina podskórnie użyta, chloroformowanie służy do uspokojenia.

Maculae corneae.

Plamki rogówkowe są to więk-sze lub mniejsze zaćmienia po

przebytych różnych formach zapalenia rogówek.

W celu wyjaśnienia stosować środki lekko drażniące (raz na dzień) zaczynając od kalomelu i zmieniać je co kilkanaście dni.

664. *Calomelanos v. h. p. et subtiliss. pulv.* 10'00.

DS. Proszek oczny, pędzelek.

665. *Præcip. flavi vel albi* 0'20, *Vasel. fl.* 4'00.

DS. Maść. Wprowadzić pędzelkiem za powiekę i lekko masować przez powiekę palcem.

666. *Trae Opii crocati* 5'00.

DS. Krople oczne zakraplacz.

667. *Ol. therebint. rectif.*

Glycerini aa. 5'00.

MDS. Krople oczne (środek Dondersa).

668. *Ung. hydrarg. cin.* 1'00,

Vasel. flav. 2'00,

Lanolin 1'00.

S. Jak maść 665.

Malleus.

Zmianę pierwotną wycina się i wypala kwasem azotowym, przy nacieku miękkim stosuje się szaruchę i okłady ciepłe z płynu Burowa, jeżeli naciek zbity, robi się głębokie nacięcia. Na wewnątrz spore ilości alkoholu, chinina.

Mania.

Odosobnienie zabezpiecza chorego i otoczenie. Dyeta pożywna mięsna.

Tylko w razie silnego podrażnienia mózgu (zrywań, zgrzytania zębami, przy zwięzieniu żrenic) można stawiać pijawki i podać środki przeczyszczające. Kąpiel, lodowe okłady. Jeżeli przeważa podrażnienie płciowe Kali bromatum 4—10'0. Jeżeli mania skutkiem opilstwa: morfina, opium.

Przy objawach anaemii mózgu wino, piwo, chlorał.

Mastitis.

Uniesienie piersi za pomocą chustki lub bandażu, okłady z liquor alum. acetici, wcierać maść belladonową.

669. *Solutio Burowi* 500'00.

DS. Do okładów.

Extr. bellad. 2'00,

Lanolin 30'00.

Mfu. S. Zewnętrznie.

Nadto dyeta skąpa, unikanie napojów wysokich, środki przeczyszczające ol. ricini, woda gorzka, Victoria, Hunyady Janos.

670. *Magnesiae sulph.* 35'00,

Aqu. dest. 120'00,

Syr. simpl. 15'00.

DS. Co 2 godz. 2 łyżki, do skutku.

671. *Acidi tartar.* 10'00,

Syr. rubi Id. 70'00.

S. Kwasek do wody do napoju.

Jeżeli sprawa nie ustępuje, bolesność i zaczerwienienie wzrasta, okłady z gorącej wody, kaptaplazmy. Skoro chęłbotanie można wykazać, przeciąć wcześniej i założyć opatrunek aseptyczny.

Melancholia.

Największy spokój, położyć chorego do łóżka.

Czuwać, aby chory sobie lub otoczeniu szkody nie zrobił. Dyeta pożywna, w razie potrzeby sztuczne karmienie. Środki nasenne, opium, sulfonal, letnia kąpiel 26—28 R.

672. *Sulfonal* 1'00,

Dtur. tal. dos. N. V.

S. Na noc proszek w gorącym mleku lub rosole.

Mastodynia.

Podwiązanie gruczołu, obłoższywszy poprzednio watą. Wstrzykiwanie morfiny w okolicę bolesną.

673. *Chloroformii* 5·00,
Ol. camphorati 15·00,
Mf. liniment.
 DS. Do wcierania.

Meningitis cerebro-spinalis epidem.

Leczenie objawów. Rozpocząć podaniem Calomelu, w dużych dawkach. Lód na głowę i na kark; pijawki, bańki wzdłuż kręgosłupa. Wcieranie szaruchy. Wstrzykiwanie morfiny, chlorał i natrum bromatum. Natrum jodatum (1—2 gramów dziennie). Przeciwn gorączce: Antypiryna, wobec obrzęku stawów acid. Salicyl.

Przeciw wymiotom pigułki lodowe, Cocain. muriatic. (1:10, po 5 kropli).

Meningitis simplex.

Zimne okłady na głowę, wcieranie szaruchy (2·00—4·00) w tyłogłowie i kark. Do wewnątrz Calomel (0·01—0·03 co godzinę), przyszczydła — starszym dzieciom i silnym można postawić pijawki. W razie drgawek chlorał w lewatywach. Przeciw wymiotom pigułki lodowe. Po uspokojeniu unikać gwaru, rażącego światła; dyeta z początku ścisła, później pożywna.

Przetwory jodowe, Natrum jodatum 1% co 2 godz. łyżeczkę, wcieranie 10% maści jodoform.

Meningitis tuberculosa.

Jeżeli dzieci chudną, gruczoły obrzmiewają dawać chinin z żelazem i wcierać jod w gruczoły. Gdy choroba wybuchnie, leczenie według objawów. W pierwszych chwilach przeciw podrażnieniu mózgu natr. bromat. (1—2 grm. pro die) zimne okłady na głowę. Pokój zaciemnić. Lewatywy i środki przeczyszczające. Pokarmy dawać często w małych

ilościach. Baczość na oddawanie moczu.

674. *Calomelanos* 0·30—0·50,
Sacchari 2·00,
Mfp. div. in dos. N. 10.
 DS. Co 2 godz. proszek.

675. *Kali v. Natr. jodat.* 1·00
 —2·00,

Aqu. dest. 100·00,
Syrup Sacchari 20·00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

676. *Natri bromati* 1·00—2·00,
Aqu. dest. 100·00,
Syrup Sacch. 20·00.

MDS. Co 2 godz. 2 łyżeczki.

W razie wielkiego rozdrażnienia lub drgawek:

677. *Chloralhydrat.* 1·00,
Natri bromat. 1·00,
Aqu. dest. 80·00,
Syrup rubid. 20·00.

MDS. Co godzinę łyżeczkę.

678. *Urethani* 1·50,
Natri brom. 0·50,
Aqu. dest. 100·00,
Syrup simpl. 15·00.

MDS. Co godz. łyżeczkę

679. *Jodoformii* 2·00,
Lanolin
Vaselin āā. 10·00.

Mf. ungu. DS. Wcierać na tyłogłowie.

Po obcięciu włosów przy skórze posmarowawszy przykryć cienką ceratką.

Metritis.

W przypadkach ostrego zapalenia macicy: spokojne leżenie w łóżku, u osób silnych kilka pijawek na okolicę podbrzusza, zimne okłady, worek lodowy. Scarificatio części pochwowej macicy.

Środki solne wypróżniające. W razie boleści maść:

680. *Extr. bellad.* 2·00,
Vasellini flavi 30·00.

Mf. ungu. DS. Zewnątrznie.

681. *Extr. opii aquosi 0·10,*
But. Cacao q. s. ut f. l. artis
suppositoria ad anum N. V.
 DS. Co 3—4 godz. czopek.

Po ustaniu bólów, okłady wysychające na brzuch zamiast lodu.

W przypadkach przewlekłego zapalenia: unikanie pracy fizycznej nateżającej, gwałtownego spółkowania, uregulowanie stolca (środkii solne, Cascara Sagrada, Hunyady Janos).

U niedokrwężnych podawanie żelaza. Jeżeli równocześnie miesiaczkowanie zbyt obfite:

682. *Extr. Hydrastis Canad. fabricationis Parke et Davis*
 40·00.

D. in l. guttatoria.

S. 3 razy dnia po 20 kropel.

Leczenie miejscowe: pomazywanie części pochwowej we wzierniku co 2—3 dni cum Trajodi, albo Ichthyolem. Tampony w przypadkach świeżych.

683. *Ammon. sulpho ichthyol.*
 5·00,

Glycerini 200·00.

DS. Do tamponów lub

684. *Kali jodati 5·00,*
Glycerini 100·00,
D. in v. nigro.

S. Do tamponów.

Nakłuwanie co kilka dni części pochwowej we wzierniku, massage.

W przypadkach zastarzałych amputatio portionis vaginalis.

Nadto w porze letniej, w przypadkach świeżych, gdy powiększenie macicy znaczne, leczenie kąpielowo zdrojowe: Iwonicz, Rabka, Ciechocinek, Rymanów. W późniejszych okresach: Krynica, kąpiele morskie. Kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa).

Metrorrhagia.

Dokładne wykazanie przyczyny krwotoku.

W przypadkach krwotoku porodowego z macicy, jeżeli przyczyną złe kureczenie się tejże: nacieranie dna macicy przez powłoki brzuszne ręką, okłady zimne na brzuch, Secale cornutum przez usta, w lewatywie lub podskórnice. Wstrzykiwania gorące na 40° do pochwy. Uciskanie macicy dwuręczne. W ostatnich czasach Dührssen tamponuje macię gazą jodoformową.

685. *Extr. secalis cornut. 3·00.*
 DS. Na koniec noża w rosole zażyć.

686. *Extr. secalis cornuti 2·00,*
Aqu. dest. 100·00,
Syr. cort. aurant. 15·00.
 DS. Co godzinę łyżkę.

Gdy macica dobrze skurezona i nie zawiera, a krwotok trwa, domyślać się należy przyczyny krwotoku w pęknięciu ujścia zewnętrznego macicy, lub na innym miejscu. Założyć wziernik i tamować krwotok miejscowo przez podwiązanie, ucisk, tamponadę, zeszywanie pęknięcia.

Jeżeli przyczyna są pozostałe części łożyska, błon, skrępy: usunąć je dokładnie jeżeli można ręcznie, a gdy to niemożliwe, wyskrobać jamę macicy.

Gdy to nie pomaga wytamponować pochwę zapomocą Penawar-Djamby w gazie jodoformowej i jeżeli przyczyną — nowotwory macicy — usunięcie tychże sposobem operacyjnym. Na razie podczas krwotoku tamponada pochwy po przestrzyknięciu tejże rozezynem środka przeciwniegnilnego j. n. p. 2% rozezyin kw. karbol.; 1:2000—3000 rozezyin sublimatu i t. d. Do tamponowania najlepiej użyć kulek waty oczyszczonej zamoczonej w glicerynie, pierwsze kulki owinąć gazą jodoformową.

W przypadkach gwałtownych wstrzyknięcie do jamy macicy

rozczyntu *Liquor ferri sesquichlor.* strzykawką *Madurowicza* lub *Brauna*, przyczem warunek konieczny, aby kanał macicy był dostatecznie drożny, aby rozczynt mógł przez szyję macicy do pochwy spływać. (Postępowanie obosiecznie ze względu na możebność dostania się rozczyntu do jamy brzucha).

Równocześnie zwalczanie powstającej ostrej niedokrewności: ułożenie spokojne, poziome, ciepłe okłady na głowę, chłodne napoje, wino, kawa czarna, cognac, rum, *Tinct. cinam.*, *Tra ferri acet. aeth.* Wstrzykiwania podskórne eteru, ol. *camphoratum*, wstrzykiwania podskórne większych ilości rozczyntu soli kuchennej 0·5:1000; lewatywy z tegoż rozczyntu.

687. *Trae Cinnam.* 50·00.

S. Co $\frac{1}{2}$ godziny $\frac{1}{2}$ łyżeczki we wodzie.

688. *Tinct. Ferri acet. aeth.* 15·00.

S. 15 kropli do $\frac{1}{2}$ szklanki wody do popijania.

Bandaże na kończyny, ucisk na tętnicę główną przez powłoki brzuszne.

Migraena.

Uwzględnić: ogólne osłabienie, choroby nerwów, chor. narządów trawienia, zboczenia płciowe. W czasie napadu spokój. Masowanie czoła i skroni (można użyć maści z mentholem lub co-cainą). Smarowanie przecikiem z mentolu.

689. *Chinin. muriat.* 0·25,

Coffeini natro salic. 0·10,

Sacchari 0·20,

Mfp. dtur. tal. dos. N. 10.

DS. W czasie napadu co godzinę proszek (użyć 2 lub 3).

690. *Antipyrin* 0·50,

Dtur. tal. dos. N. 10.

DS. Jak wyżej.

691. *Phenacetin* 0·50,

Chinin. 0·20,

Mfp. dtur. tal. dos. N. 10.

S. Jak wyżej.

692. *Natri Salicyl.* 0·50,

Dtur. tal. dos. N. 10.

DS. Jak wyżej.

693. *Euphorin* 4·00,

Div. in dos. N. 10.

S. 3 proszki dziennie.

694. *Coffeini citrici* 1·00,

Phenacetin 2·00,

Sacchari 1·00,

Mfp. div. in dos. N. 10.

DS. Co 2 godziny proszek.

Podskórne zastrzyknięcie *Ergotyny* (*Bombellon*) 0·25. *Chloralhydrat* 1—2 gram. w lewatywie.

Do dalszego leczenia można użyć:

695. *Chinin. muriat.* 5·00,

Pulv. fol. digital. 1·50,

Extr. gent. et pulv. q. s.

f. pil. N. 30.

DS. Na noc pigułkę.

696. *Solut. arsen. Fowleri* 5·00,

Trae ferri pomat. 10·00.

MDS. Rano i wieczór po 5 do 10 kropli.

Woda arsenikalna *Gubera*.

697. *Ammon. bromati* 1·00,

Kali bromati

Natri bromati aa. 2·00,

Aqu. dest. 180·00,

Syr. aurant. 20·00.

MDS. 3 razy dziennie łyżkę.

Morbilli, Odra, Kur.

Niemowlęta i chorowite dzieci oddzielić. Jeżeli przebieg prawdziwy nie trzeba uciekać się do lekarstw. Pokój ostrożnie przewietrzać, ciepłota od 15—16° R. okrycie średnio ciepłe, lekkie przysłonięcie okien, jeżeli jest światłowstręt.

Dyeta w czasie gorączki ścisła, po jej przebyciu pożywna, za

napój lekkie kwaski, lub wody (szczawy alkaliczne). Dopóki trwa łuszczenie nie wypuszczać dzieci z łóżka, a mniej więcej 8—14 dni nie wypuszczać z pokoju, zwłaszcza, gdy są objawy nieżyty.

Przeciw nieżytowi spojówek wystarczają przemywania 2% kw. borowego. Silny świąd uspakaja się nacieraniem tłuszczami.

698. *Lanolin anhydr.* 50·00,
Vaselin americ. 20·00,
Aq. dest. 25·00.
Ms. terendo f. Ung.
S. Co 3 godziny nacierać.

Silny kaszel wymaga podania naparu ipecac. ze środkami narkotycznymi, wzięwania pary wodnej, napoje ciepłe, odwar ślazu i t. p. W razie biegunki dyeta i opium.

Wysokie gorączki i majaczenia, uśmierzać zimnemi okładami na głowę. Chinina — antypyryna, Natr. salicylicum.

Wśród upadku sił, stygnięcia kończyn: wino, cognac, camphora, Acid. benzoicum.

Przeciw drgawkom: Chloral w lewatywach (0·50:50) kali bromatum (2:100) co godzinę łyżeczkę.

Jeżeli gorączka przewleka się ponad 4 dni, zwrócić uwagę na przełyk, uszy i nerki.

Powikłania: błonica, dławiec, nieżyt oskrzeli, zapalenie płuc, leczyć według wskazówek odpowiednio podanych.

699. *Codeini phosphor.* 0·02,
Linctus gummosi 50·00,
Syrup Altheae 30·00.

MDS. Co 2 godziny łyżeczkę w razie silnego kaszlu.

700. *Extr. hyoscyami* 0·15,
Aqu. dest. 70·00,
Syr. simpl. 10·00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

701. *Infus. ipecac.* e 0·20 ad 100·00,

Tinct. laudani gttis. duas.
Liquor ammon. anisat. 1·00,
Syrup altheae 20·00.

MDS. Co godzinę łyżeczkę.

Morbus Basedowi.

Regularne, higieniczne życie, unikanie zmęczenia fizycznego i umysłowego, wstrzymanie się od nadużywania a nawet od picia alkoholików, herbaty, kawy, nadmiernego palenia. Pobyt na świeżem powietrzu, zwłaszcza w górach lub nad morzem.

Na okolicę serca okład zimny lub lód, zwłaszcza podczas silniejszej akcyi serca, oraz digitalis lub strophantus w miernych dawkach.

U chorych osłabionych, anemicznych: żelazo, chinina, arsen, procedury wodolecznicze, obok systematycznego stosowania prądu galwanicznego na sympaticus (ganglion supremum i processus mastoidei).

Przetwory bromowe i nervina, woda Gubera, Levico, Roncegno, Żegiestow, Krynica, Elster, Francensbad, obok należytego odżywiania i psychicznego spokoju.

702. *Natri brom.*

Aq. amygd. am. āā. 15·00,
Trae convall. maj. 12·00,
Aq. dest. 60·00.

DS. 2—3 łyżeczek na dzień.

Morbus Brighti.

Jeżeli mamy do czynienia z ostrym Morb. Brighti, to chory powinien bezwarunkowo leżeć w łóżku, w jednostajnej ciepłej temperaturze. Dyeta złożona z mleka, kleików, rosółów, lekkich zupek, trochę kaszki, lub ryżu w mleku. Do picia wodę selterską, bilińską, gieshübelką, ubogim zaś zwykłą wodę z dodatkiem cytryny lub kwa-

sku, uważać przytem by stolce były regularne.

Na okolicę nerek stawiać bańki suche, nawet cięte lub pijawki, jeżeli mocz bardzo krwawy i zawiera wiele białka.

Jeżeli opuchliny są znaczne, to polecić kąpiele gorące zaczynając od 28° R. do 30° i 32° R. po 15—45 minut, ze zlewaniem na głowę, następnie zawija się chorego w kocę na 1—2 godzin, żeby się dobrze pocił. Jeżeli chory czuje się w kąpieli bardzo osłabionym, dać można kieliszek wina. Albo też urządza się choremu w łóżku sztuczną parówkę za pomocą przyrządu opalanego spirytusem. Obok tego można dawać mierne dawki cardiaców, jak digitalis, strophantus lub coffein dla połączenia działania napotnego z moczością. Wstrzykuje się też pilokarpinę po 0.01—0.02 na dawkę, uważając jednak czy nie nastąpi zapad. Obok napotnych i moczością polecają silne środki przeczyszczające jak colocynth, Jalapa, gumi gutti, Rheum, nawet pig. Morisona.

W razie przypadków mocznicy, kąpiel gorąca ze zlewaniem zimnem, silny laxans, podskórnie eter lub kamfora, albo też do lewatywy Hydras chlorali 2—3 gramów lub Acid. benzoicum po 0.2 co 2—3 godz. Zob. Uraemia.

Jeżeli okres przewlekły, chory niekoniecznie ma leżeć w łóżku, zwłaszcza, jeżeli opuchliny nieznaczne.

Dyeta przeważnie mleczna, 2—4 litry mleka, jaja, mięsa mniej, jarzyny, żadnych alkoholików i korzeni.

Do picia wody: Bilińska Giesshübel lub woda z kwaskami. Unikać zmęczenia fizycznego, odziewać się ciepło, nie nara-

żać się na niepogodę i zmiany temperatury.

Choremu należy polecić mierne dawki tanniny lub Plumb acet, Ferr. sesquichloratum obok ciepłych kąpiel, mniej energicznie stosowanych jak w okresie ostrym i zawijania w kocę. Nadto podawać diuretica: Coffein 1.0—1.50 p. die, theobrominum salicyl. w tych samych dawkach, digitalis, adon. vernalis z dodatkiem Liqu. kali acet. 15—20 na 200. W razie zaparcia stolca, środki przeczyszczające.

703. *Diuretini* 5.00,

Aq. dest. 100.00,

Syr. aurant. 15.00.

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

704. *Strontii lactici* 50.00,

Aqu. dest. 250.00.

MDS. 2 łyżki dziennie.

Morbus maculosus Verlhofii.

Lekka pożywna dyeta, spokój w łóżku, kwaśne napoje (kawa, herbata wzbronione). (Leczenie krwotoków zob. Epistaxis, Haematemesis).

705. *Dct. Chinae reg. c* 10.00
ad 180.00,

Acid. sulphur. dil. 3.00,

Syrup s. 20.00.

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

706. *Extr. secal. corn.* 1.00,

Aqu. dest. 100.00,

Syr. sacch. 20.00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Morphinismus.

Najlepszą metodą, powolne odzwyczajenie, z początku do połowy lub trzeciej części, później w przeciągu 10—20 dni zejść do 0 morfiny, w końcu wstrzykiwać Aq. destil., dając natomiast cokolwiek morfiny do wewnątrz, lub małe wstrzyknięcia Codein hydrochl. lub extr. opii aqu.

Dobre żywienie, mleko z cog-nakiem, mocne wina, kąpiel 28° R.

Przeciwno bezsenności brom z makowcem, Amylenhydrat, Sulfonal, unikać Chloralu.

Wpływ moralny, usunięcie powodów, jakie doprowadziły do Morf., chronić od powtórzenia się choroby.

Przeciwskazanie do odzwyczajania morfiny stanowi tylko bolesna ciężka choroba, gdzie morfina mniej szkodzi.

Morpiones zob. pedic. pubis.

Mydriasis (rozszerzenie źrenicy).

Towarzyszy zwykle porażeniu accomodacyi; przyczyny, prognoza i leczenie takieżsame, jak przy paralysis accomodationis.

Myelitis.

W ostrej:

Ułożenie chorego równo w łóżku, najlepiej na poduszkach powietrznych. Bańki cięte lub pijawki w samym początku choroby, potem Tra. jodi, wciěrki z Ung. cinereum 3—4 grm. p. die i jednocześnie kali jodatum, jeżeli była lues, a nawet jako środek przeciwzapalny.

Uważać przy tem na ślinotok, lodowe okłady na stos pacierzowy. Równocześnie silne środki przeczyszczające: Kalomel, Jalapa, Senna. Uważać na odleżyny, na zatrzymanie moczu.

W przewlekłej formie:

Kąpiele ciepłe, wyjazd do Cieplic, Gasteinu, Trenczyna, Wildbadu, Swoszowic, Piszczan, Lubienia itp. wód. Elektryzowania prądem stałym i faradycznym. Na wewnątrz kali jodatum z 10:200, 2 łyżki dziennie. Arg. nitricum 0·01—0·02 w pigułkach,

arsen po 0·001 lub Ergotyne po 0·10—0·50 2—3 razy dziennie (skutek jednak wątpliwy).

Myringitis.

Jeżeli ból wielki 1—2 pijawek na Tragus, gdy widać tworzący się ropień, nacięcie. W razie miernego bólu wcierać w okolicę ucha:

707. *Morphii muriat.* 0·30,
Ol. hyosc. 15·00.

jako też włożyć do ucha watę napojoną kilkoma kroplami tego roczynu.

Leczenie zapalenia B., jak przy Otitis media acuta.

Nephritis zob. Morb. Brighti.

Nephrolithiasis.

Zalecić wody alkaliczne (Karlsbad, Vichy, Ems, Kissingen, Saluator, Wiesbaden. Zabronić zbytńego pożywania mięsa, za to więcej jarzyn, mleka, w ogóle dużo płynów.

Napoje wyskokowe w małej ilości; kwaśne napoje i potrawy wzbronione. Mierne używanie ruchu.

Przeciw krwotokom z nerek Ergotin, Tannin. Przeciw kolce nerkowej, narcotica: Morfina, Opium, dalej Urethan 3—4·0 dziennie. Ciepłe kąpiele, bańki suche, nacieranie oliwą z chloroformem, ciepłe okłady. Wstrzykiwania morfiny.

708. *Butyl Chloral* 5·00,
Aqu. dest. 120·00,
Spir. vini rectific. 10·00,
Glycerin 2·00.

DS. 2—3 łyżek jedna po drugiej.

709. *Lithii carbon.*
Natri bicarb. aa. 0·50,
Tal. dos. N. X.
S. 3 pr. dziennie.

710. Piperazin 5·00,*Div. in dos. 10.*

DS. 3 pr. dziennie w opłatku, lecz znacznie lepiej w syfonie wody sodowej lub Giesshübelskiej.

Neuro - retinitis (Zapalenie nerwu wzrokowego i siatkówki).

Cierpienie objawiające się jedynie podupadaniem bystrości wzroku rozpoznawanem być może jedynie wziernikiem. Obok ograniczenia światła, jużto okularami, jużto w pewnych formach zapalenia, ciemnym pokojem i zakazanie pracy, wymaga przedewszystkiem leczenia przyczynowego, a więc: Syphilis (secundaria) wcierania ungu. cinereum; diabetes: Karlsbad, albuminuria: mleczna kuracja itd.

Rheuma i leukemia dają również powód do zapaleń siatkówki. Zmiany chorobowe w ścianach naczyń siatkówki (kruchosć tychże) dają powód do zapal. siatkówki połączonego z licznymi wynaczynionkami krwi w tejże osłonie, jakoteż w ciałku szklanem (Ret. haemorrhagica). Wzrok zwykle bezpowrotnie stracony; jeżeli zaś, co się przydarza przyłączy się podwyższenie ucisku śródocznego (Glaucoma haemorrh.), oko takie ze względu na dolegliwość często wyjętem być musi. Choroby mózgu wogóle, a najczęściej nowotwory w mózgu ($\frac{2}{3}$ i więcej) sprowadzają najczęściej w obu oczach t. z. tarczę zastoinową.

Neuralgia intercostalis.

Przedewszystkiem wysledzić przyczynę, najczęściej malaria.

Elektryzowanie, wcierania kojących maści. Wstrzykiwania morfiny lub antipyriny. Jeżeli przyczyną jest liszaj (herpes)

pudrować lub smarować maścią cynkową, lub morfinową.

711. Chloroformii 10·00,*Ol. hyosc. cocti**Ol. olivar. āā. 20·00.*

MDS. Do nacierania.

712. Veratrini 0·50,*Chloroformii 10·00,**Spiritus 50·00.*

MDS. Do nacierania.

713. Antipyrin.*Aqu. dest. āā. 5·00.*

MDS. 1 lub 2 strzykawki wstrzyknąć w okolicę bólu.

Neuralgia trigemini, Prosopalgia.

Uwzględnić i leczyć przyczyny: anemia, histerya, zimnica, choroby ucha, zębów itp.

Wycięcie blizny ugniatającej nerw. Leczenie przymiotu, zatrucia ołowiem.

714. Chinin muriat. 0·50,*Dtur. tal. dos. N. X.*

S. Jeden proszek przed napadem.

715. Chloral. croton. 0·30.

Pro dosi w pigułkach 4—5 razy dziennie.

716. Solut. arsen Fowleri 10·00.

DS. 3 razy dziennie od 3—5 kropli po jedzeniu.

Wrazie bólu powstałego z przeziębienia:

717. Natri Salicyl. 5·00,*Aqu. dest. 180·00,**Syrup aurant. 20·00.*

MDS. Co godz. łyżkę.

718. Butyl chloral 2·00—3·00,*Spir. vini rectif. 10·00,**Glycerin 20·00,**Aqu. dest. 120·00.*

MDS. 3—4 łyżek na raz.

(Dawki według stopnia bólu i indywidualności chorego).

719. *Extr. Gelsemii fluid.* 10'00.
DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. po 5 kropli.
(Najwyżej 3 dawki).

720. *Analgeni à 0'50.*
3—4 razy na dzień.

721. *Antipyrin 0'50,*
Dtur. tal. dos. N. 10.
DS. Rano i wieczór proszek.

722. *Exalgin 0'30—0'40.*
Kilka razy dziennie.
Methylen caerul. 0'02—0'03.
pro dosi, 2—3 razy dziennie.

723. *Veratrin. 0'15,*
Morphii acet. 0'10,
Ungu. cerei 10'00.
Mf. ungu. S. Weierać w miejsc
sca bolące.

Elektryczność, naciąganie lub
wycięcie kawałka nerwu.

Noma.

Najglówniejszym czynnikiem
lecniczym jest pożywna i pod-
niecająca dyeta.

Części zgorzelą dotknięte na-
leży przypalić zgęszczonymi
kwasami lub sześciochlorkiem
żelaza, najlepiej jednak lapisem
lub termokauterem.

Do opatrunku najlepiej nadaje
się jodoform lub płatki waty ma-
czane w kreolinie. Usta należy
pilnie płukać, lub wymywać roz-
czynami przeciwnilnymi (3%)
woda borowa, słaby roztwór
nadmagnezianu potasowego, 3%
kwas salicylowy itp. Ubytki po-
wstałe, wymagają najczęściej po
zupełnem zablżnieniu, zabiegów
plastycznych.

Obstipatio alvi habitualis.

Usunąć przyczyny cierpienia,
środkii lekko czyszczące, dyeta
mieszana, kompoty, jarzyny, o-
woce, figi, miód, pierniki, zimna
woda na czczo, u chorych, któ-
rzy znoszą mleko, dawać tak-
we w sporych ilościach.

Obok tego zabiegi hydropa-
tyczne, mięsienie, codzienne le-
watywy, wody mineralne: Karls-
bad, Marienbad, Hunyady Janos,
Kissingen (Rakoczy).

724. *Pulv. liquir comp.* 40'00.
Co dzień na noc $\frac{1}{2}$ —jednej
łyżeczki.

725. *Trae Rhei vinos.*
Extr. fluid. Cascar. Sagr.
āā. 25'00.
DS. 2 razy dnia po $\frac{1}{2}$ —1 ej
łyżeczki.

726. *Extr. Aloë aquos.*
Extr. taraxaci āā. 5'00,
f. pil. N. 50.
S. Rano i wieczór po 1—2 pi-
gułek.

727. *Trochisci compressi e Rho*
à 0'50 N. 50.
DS. Co dzień na noc 1—3 pa-
stylek.

728. *Trochisci campressi e Cas-*
car. Sagrad à 0'50 N. 50.
S. Co dzień na noc 1—3 pa-
stylek.

729. *Sal. therm. Carolin. 100'00.*
DS. Co dzień na czczo łyżecz-
kę w $\frac{1}{2}$ szklanki ciepłej
wody.

730. *Natri bicarb.*
Magnes carbon. āā. 10'00,
Pulv. rad. Rhei 7'00.
DS. 2 razy dnia na koniec noża.

Nadzwyczaj zalecają:

731. *Podophyllini 0'30,*
Extr. aloes
Extr. rhei āā. 3'00,
Extr. taraxaci q. s. f. pil.
N. 40.

S. Na noc 1—3 pigułek.

Przy uporeczywem zaparciu,
wlać przez wysoko do rectum
wprowadzoną sondę: 70 gr. ae-
ter sulph. z 300 gr. Ąq. foeniculi.

Dzieciom:

U osesków, zmiana mamki, od-
sunąć dodatki mączne, woda z cu-

krem lub extractem słodowym. U starszych regularne żywienie, mieszany pokarm, unikać środków rozwalniających. Lewatywy ze słonej chłodnej wody (14° R.), płynu do 1 roku 100—200 gr., starszym do 500 gr.

W razie koniecznej potrzeby, oseskom: *Rheum cum magnesia* 2 r. dziennie na koniec noża, starszym: *Aq. laxat.* 2—3 łyżeczki dziennie, *Trae rhei vin.* 1—2 łyżeczki, opaski z chłodnej wody na noc, po poprzedniem masowaniu brzucha. *Extr. fluid. Cascar. Sagr.*, rano i wieczór po 10—15 kropli.

732. *Extr. Casc. Sagr.* 5'00,
Aqu. dest. 50'00,
Syrup zingib. 20'00.
S. Na noc łyżeczkę.

733. *Tinct. nuc. vom.* 1'00,
Tinct. rhei aquos 14'00.
MDS. 2 razy dz. po 10 kropli dla dziecka 8—12 mies. przez dłuższy czas.

Rp. Ol. ricini 15'00,
Inf. coffeae tost. 60'00,
Sacch. 20'00,
Vitell. ovi N. 1.
f. emulsio.

S. Co godz. łyżeczkę.
Infus. fol. Senn. e 10'00
ad 100'00,
Syr. Mannae 10'00.
S. Na 2 razy użyć.

Odontalgia.

Jeżeli z powodu pruchnienia zęba i zapalenia nerwu: płukanie w celu oczyszczenia, osuszenie jamy w zębie i założenie kwasu karbol. czystego na kuleczkę z waty.

734. *Morphii mur.* 0'03,
Spir. vini rectific. 5'00,
Chloroformii 20'00.

MDS. Na kulce z waty włożyć do jamy zęba.

735. *Mentholi* 2'50,
Chloroformii 4'00.
Na wacie włożyć do zęba.

736. *Extr. opii*
Camphor. tritae
Bals. peruv. āā. 0'50,
Masticis 1'00,
Chloroformii 10'00.
S. Kuleczkę waty w tym rozczynnie zmaczaną włożyć do zęba.

Pulpitis ac. Po oczyszczeniu zęba.

737. *Thymol* w substancji włożyć do jamy zęba.

Periodontitis: płukanie zimną wodą, zimne okłady. Tra jodi do pędzlowania dziąsła około chorego zęba, 1—2 razy dziennie. Jeżeli bóle się zwiększają, przejść do okładów ciepłych, płukania kojące.

738. *Decoet. althaeae* 200'00,
Trae opii 2'00,
Aqu. menth. pip. 10'00.
DS. Płukanie.

Z powodu zwioteczenia dziąseł: usunąć kamień ze zębów i płukanie środkami ściągającymi.

739. *Acidi tannici* 4'00,
Spir. vini rectific. 80'00,
Bals. vitae Hofm. 20'00.
MDS. łyżeczkę na szklanekę płukania.

740. *Infus. fol. Salviae* 200'00,
Spir. cochlear.
Trae myrrhae āā. 25'00.
MDS. Woda do ust.

Jeżeli ból bez wiadomej przyczyny: antipiryn, phenacetin, *Natr. salicylicum* 0'75, co 1/2 godz.

741. *Cocaini oleinici* 1—2'00,
Ol. olivar. 10'00.
DS. Kilka kropli ogrzanego płynu wpuścić do ucha.

Przeciw krwotokom po wyrwaniu zęba:

742. *Chloroform.* 4'00,
Acid. tannic.
Menthol aa. 2'00,
Tinct. ratanh. 25'00,
Aqu. dest. 500'00.
 MDS. Do płukania.

Oedema glottidis.

Uważać na czystość powietrza, unikać pyłu, dymu, zakazać rozmowy. Przy nieznacznym obrzęku, można dać inhalacye z Acid. tannicum, Kali bromatum, płukanie roztworami środków ściągających lub też pędzlowanie c. Arg. nitrico (1:20) raz dziennie. Łykanie pigułek z lodu, zimne lub wysychające okłady na szyję, wcieranie szaruchy. Środki przeczyszczające oraz wymiotne. Znaczniejsze obrzęki wymagają nacięć (scarificatio) przy pomocy wżiernika.

W ostateczności Tracheotomia.

Oedema pulmonum.

Leczenie głównej choroby w odpowiedni sposób.

Przy pierwszych objawach obrzęku płuc ostrego, podać środki podniecające akcyę serca jak: czarna kawa, cognac, grog, wino, kamfora, piżmo. Podskórnie wstrzyknąć eter, ol. camphoratum lub coffeinę.

Zewnętrznie położyć na piersi i łydki synapizma, rozcierać nogi i ręce, dać choremu kąpiel i zlewać głowę i piersi zimną wodą.

Jeżeli chory jest krwisty, można puścić krew, zwłaszcza w obrzęku płuc wśród spraw zapalnych.

Nadto można dać lewatywę ze środków ostrych jak: Decoct colocynt., octu, roztworu soli itp.

Jeżeli niebezpieczeństwo na razie minęło, dawać cardiacą i digitalis, coffeinę, theobrominę, Sparteinę, Tra stroph. — Po tem leczyć główną chorobę i zwracać

cać uwagę na pierwsze objawy zastoinowe.

743. *Infus. flor. arnicæ*
 e 15'00 ad 120'00,
Camphor. trit. 1'25,
Mucil. g. mimos. 20'00.

Mf. emulsio. S. Co $\frac{1}{2}$ godziny łyżkę.

744. *Acidi benzoici* 3'00,
Camphor. pulv.

Stibii sulph. aurant aa. 0'50,
Sacch. alb. 5'00.

Mfp. div. in dos. X.

S. Co 2 godz. proszek.

Omphalitis.

Opatrunek przeciwniepalny (salicylowy, jodoformowy) okłady z letniej wody (2% maść salicylowa z waseliną), rocznie wcześnie otwierać.

Onania (Masturbatio) Samogwałt.

Zapobiegać wypryskom na częściach płciowych, oxyuris; nieprzykrywać dzieci pierzaną pościelą. Wzbraniać nieobyczajnych rozmów, czytania. Ręce wśród nocy kazać trzymać na koldrze.

Leczenie polega na wpływie moralnym, z środków ostatecznych w razie potrzeby, obrzezanie, względnie przypiekanie łechtaczki.

Przeciw niedokrewności przetwory chinowe, żelazo, pobyt na świeżem powietrzu, gimnastyka.

Onychia.

Po stłuczeniach okłady z Aqu. Goulardi, Liquor alum. acet. Kąpiele sublimat. (0'50:1000'00).

Najprostszym sposobem leczenia wrastającego paznokcia jest usunięcie wrastającej połowy (po poprzednim zamrożeniu palca eterem) zapomocą nożyczek. U ludzi bojących się tej małej ope-

racyi można osiągnąć wynik korzystny przez codzienne głębokie wprowadzenie kawałka gazy jodoformowej do załamka pomiędzy paznogieć a skórę.

Ophoritis.

Schodzi się z leczeniem perimetritis.

Otalgia.

Leczenie zależne od przyczyny. Wskutek zimnicy: chinina, jednak w przebiegu nieżyty lub ropienia ucha środk. szkodliwa.

W przebiegu syfilis: kali jodatum.

Zwrócić szczególną uwagę na spróchniałe lub źle wprawione sztuczne zęby. W każdym razie można użyć maści kojących, wkraplać Cocainę.

Otitis.

a) *Ot. externa circumscripta*
(v. *Furuncul*).

W pierwszej chwili leczenie poronne, w pobliżu furunkulów robi się lekkie nacięcia (jak przy szczepieniu) i napawa maścią (Resorcin 2·00 Lanolin 20·0) kilka razy dziennie. Przewód uszny wypełnia się również maścią a w pobliżu Tragus zakłada się watę borową. W dalszym okresie kataplazmy do przewodu usznego, oraz za muszlą ucha. Częste przepłukiwanie ciepłą wodą, wprowadzenie pary do ucha. Wczesne przecięcie, przed tem można dla uniknięcia bólu wielkiego wstrzyknąć 10% roztworu Cocainy. Po ustaniu krwawienia, przestrzyknąć i watą wysuszyć ucho, po czem 5% maścią borową wysmarować.

745. *Cocaini muriat.* 0·20,
Aq. dest. 10·00.

DS. Watę napojoną kilku kroplami włożyć do ucha.

Resorcin 0·10,
Cocain mur. 0·20,
Morphii mur. 0·10,
Aq. dest. 10·00.

MDS. 2—4 razy dz. po kilka kropeł do ucha.

746. *Veratrini*

Morphii muriat. āā. 0·10,
Lanolin
Vaselin āā. 7·00.

Mf. ungu. DS. Wcierać w okolicę ucha.

Jeżeli ból bardzo silny nie ustaje, podskórne wstrzyknięcie morfiny.

b) *Otitis exter. diffusa.*

U silnych osób pijawki (na Tragus, nie na proc. mastoid). Ustawiczne przepłukiwania ciepłą wodą, a jeżeli i to bez skutku, kataplazmy do przewodu usznego, na proc. mastoideus i przed muszlą uszną, (lecz nie jeden duży kataplazm na całe ucho).

Kataplazmy tylko parę godzin przykładać, poczem założyć watę napojoną gliceryną. W razie silnego bólu wkraplanie Cocainy i zewn. maści kojące, lub też podać morfinę i chlorał wewnętrznie.

Jeżeli pojawi się ropienie, przestrzykać 1—3 razy dziennie i oczyścić ucho watą.

Następnie wdmuchiwać kwas borowy, wkraplać 5% roztwór kw. borowego, a w upórczywych ropieniach, pędzlowanie roztworem Arg. nitrici 1:30.

Otitis media.

Dopóki trwa ból, postawić na Tragus 1—2 pijawek, wkraplać 10% roztwór Cocainy. Jeżeli się błona bębenkowa wypukła, przekłucie (*Paracentesis*).

W razie obrzęku proc. mastoid.: kataplazmy, wcieranie szaruchy.

Częste przestrzykiwania lub wkraplanie ciepłej wody do ucha.

Po przebicu błębenka 2 razy dziennie przestrzykać ucho i równocześnie przedmuchiwanie według metody Politzera.

Chory powinien być w łóżku, gdy potrzeba, płukać gardło, brać środki napotne. Na wewnątrz podać wrazie silnego bólu morfinę — chloral — kali bromat, zewnętrznie stosować kojącą masę (zob. Otitis exter.).

Po kilku dniach ropienia wdmuchiwanie kw. borowego raz na dzień a jeżeli to nie zmniejszy wydzieliny, wkraplać środki ściągające.

747. *Zinci sulphur.* 0·20,
Aqu. dest. 20·00.

MDS. Po przestrzykaniu ucha wlać kilkanaście kropli nieco ogrzanego płynu.

W razie cuchnącego odpływu, przestrzykiwania 2⁰/₀ kw. karbolowym lub kali hypermang. 0·50 : 100·0.

Ozaena (Rhinitis catarrh. acuta).

Jednostajna ciepłota, zaprzestanie kąpieli.

W zatłokane przewody nosa u ssawców napuszczać pędzelkiem 2⁰/₀ roztwór Cocainy 3 razy dziennie. Starszym przestrzykać roztworem sody lub soli, (łyżeczkę na 1¹/₂ litra wody) lub alunu (1¹/₃ łyżeczki na 1¹/₂ litra).

Pędzlowanie maszczem z praecipit. rubri (0·50 : 10·0), kwasu borowego 5⁰/₀; podawać środki napotne.

748. *Zinci sozodol.* 5·00,
Vaselini
Lanolini aa. 40·00,
adde Paraff. liq. q. s. f. ung. molle.

S. Posmarować gazę i wkładać do nosa.

Wdmuchiwać:

749. *Bismut. salicyl.* 5·00,
Talci 2·00.

Mfp. S. 2 razy dziennie wdmuchiwać do nosa.

750. *Cocain mur.* 0·50,
Aqu. dest. 10·00.

MDS. Watę zmoczoną w płynie co 5 godzin wkładać.

Wziewanie do nosa pary z kamfory lub:

751. *Zinci sulphur.* 2·00,
Thymol 0·20,
Menthol 0·30,
Alcohol. absol. 50·00,
Aqu. dest. 120·00.

DS. Rozpylaczem wtryskiwać do nosa 2 razy dziennie.

752. *Saloli* 5·00,
Acidi borici 3·00,
Acidi salicyl. 0·50,
Thymol 0·20,
Talci pulv. 10·00.

Po przestrzykaniu nosa wodą karbolową 1⁰/₀ i osuszeniu, wdmuchiwać do nosa.

Ozaena chronica.

Uwzględnić: ciała obce, polipy, nowotwory, zatrzymaną ropę, strupy, dalej: przymiot, żoły.

Przestrzykiwania jak powyżej.

Kali chloricum 5—10·00 : 500·00,
Resorcin 10·00 : 500·00,
Kali hypermang. 0·30 : 300·00.

Zołzowatym pędzlować roztworem Lugola:

753. *Jodi puri* 0·15,
Kali jodati 0·50,
Aqu. dest. 300·00.

Blizsze wewnętrzne ściany nosa, pędzlować balsamem peruwiańskim, w głąb zakładać tampony z waty, napojone balsamem — raz dziennie. Usuwa to cuchnienie z nosa.

754. Jodol cryst.*Acid. tannic.**Borac aa. 5'00.*

Mfp. Zażywać 3—5 razy po szczypcie.

Wdmuchiwanie Aristolu. Ozae-na syphil: przestrzykiwanie sublimatem (0'01:100'0) z dodatkiem gliceryny.

755. Praecip. rubri 0'15,*Vaselin**Lanolin aa. 15'00.*

Mf. ungu. S. Zapuszczać pędzlem do nosa.

Oxaluria.

Dyeta przeważnie mięsna, mleczna, unikanie mącznych pokarmów, jarzyn, octu, cytryn, wina.

Ze środków leczniczych: picie wód: Vichy, Karlsbad, Elster, Salzbrunn, Wildungen.

Na wewnątrz: lith. carb., lith. salicylicum, Natr. carbon po 0'50—1'0 dziennie w wodzie selterskiej.

756. Natri bicarb. 10'00,*Lith. carb. efervescentis 50'00.**Mfpulv. Div. in dos. N. XX.*

S. r. i. w. proszek w szklance wody.

757. Natri bicarb. 2'00,*Lith. carbon.**Kali carbon. aa. 0'50,**Aq. flor. naph.**Syr. simpl. aa. 20'00,**Aqu. dest. 300'00.*

DS. Przez dzień wypić (rozczyn Ewicha).

Oxyuris vermicularis.Lewatywy z wody, czosnku roztartego w wodzie (garść na 1 litr) z $\frac{1}{2}\%$ roztworu sublimatu, lub też lewatywa z czystego tranu.**758. Butyri Cacao 3'00,***Calomelanos 0'05,**Mf. supposit. Dtur. tal. dos. N. V.*

S. Na noc jeden czopek.

*Naphthalin 1'00,**Ol. olivar 40'00.*

MDS. Do lewatywy.

Dorosłym 5—6'00:80'00 oliwy.

Panaritium.

Należy jak najrychlej głęboko aż po kość przeciąć i w ranę wprowadzić pasek gazy jodoformowej, celem zapewnienia odpływu wydzieliny i zapobieżenia przedwczesnemu zlepianiu się brzegów rany. Kawałki kości obumarłe należy wyjąć.

Pannus.

Nie będąc samoistną chorobą, nie wymaga odrębnego leczenia; należy leczyć jedynie chorobę wywołującą tenże jak: trachoma, Conjunct. scrophulosa et blennorrh. chron. (Zob. odpowiednie rozdziały). Łuszcza zaś sama powoli ustąpi.

Zbytecznem więc jest mówić, iż łuszcza jaglicowa innego, a powstająca na tle skrofulicznego również innego leczenia wymaga.

Paralysis.

Wykrycie przyczyny porażenia, czy obwodowe czy ośrodkowe. Leczenie przedewszystkiem głównej choroby.

Najczęstszą przyczyną lues, a wtedy wciarki z unguent. cinereum i kali jodatam.

W razie przyczyny reumatycznej — polecić ciepłe kąpiele siarczane. Cieplice czeskie lub węgierskie, Piszczany, — masowanie, elektryzowanie prądem stałym lub przerywanym stosownie do rozpoznania.

Na wewnątrz pilocarpin 0'01 na dawkę lub podskórnie, lub strychnin. sulf. 0'10 na 10'0 z tego $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ strzykawki co 2-gi dzień.

Paralysis agitans.

Choroba nieuleczalna. Można jednak zmniejszyć trzęsienie za pomocą środków, podskórnie wstrzykiwanych jak: Curare, Morphin. i Sol. Fovleri.

759. Sol. arsen. Fovleri 2'00,
Aqu. dest. 4'00.

DS. $\frac{1}{2}$ strzyk. Na wewnątrz
też sol. arsen. Fovleri po 4
—6—10 kropli na dzień.

Wody arsenikalne: Gubera, Levico itd.

Ciepłe kąpiele, kąpiele borowinowe, (Mattoniego sól borowinowa), elektryzowanie, kali jodatum lub bromat. i inne nervina.

Polecają też wstrzykiwania z:

760. Hyosciamin mur. 0'01,
Aq. dest. 10'00.

DS. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ strzykawki; lub na wewnątrz:

761. Hyosciamin 0'02,
Pulv. et extr. liquir. q. s. ut
f. pil. N. XX.

S. 1—2 pigułki dziennie.

Paralysis nervi facialis.

Wykrycie przyczyny czy jest obwodowe czy centralne i leczenie tejże, a więc: lues, ropnie lub gruczoly, tumory, (exostozy) uciskające nerw, zmiany w uchu (otitis interna).

Jeżeli przyczyną porażenia zaziębienie, to środki napotne, ciepłe okłady, ciepłe kąpiele, unikanie przeciągów, na wewnątrz pilocarpin. mur. 0'01 lub podskórnie.

Elektryzowanie n. facialis, przeważnie prądem stałym, później i faradycznym, massage.

Podskórne wstrzykiwanie strychniny:

762. Strychnin. sulfur. 0'10,
Aqu. dest. 10'00.

DS. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ strzykawki co 2-gi
—3-ci dzień.

Paralysis progressiva.

Przy pierwszych objawach usunąć chorego od zajęć, dać mu umysłowy i fizyczny wypoczynek. Dyeta pożywna ale nie podniecająca, życie pod każdym względem higieniczne.

Jeżeli była dawniej lues, to energiczna kuracja rtęciowa przez wciěrki 2—3 grm. na raz, obok tego kali jodatum.

Jeżeliby nawet i nie było lues, to przecież należy spróbować wcierek, bo czasem bywają polepszenia, a nadto chorzy nie chcą się do lues przyznawać.

Zresztą kąpiele letnie, zimne wycierania, prąd stały na głowę, na wewnątrz kali jodatum lub Ergotin po 0'1—0'50, 2—3 razy dziennie. Rzadko kiedy bywa skutek z leczenia.

Paralysis accomodationis.

Cierpienie bardzo uporczywe, często nie ustępujące.

Przyczyny obwodowe jak trauma, rheuma, sztuczne (atropin) lub też centralne jak: cierpienia mózgu i rdzenia pacierzowego.

Przedewszystkiem leczenie przyczynowe; lokalnie zapuszczanie raz dziennie 1 kropli 0'50/10 roztworu pilokarpiny i elektryzowanie słabym prądem stałym. Zakazanie pracy.

Porażenie accomodacyi atropinowe, samo ustępuje.

763. Pilocarp. mur. 0'05,
Aq. dest. 10'00.

DS. Krople do oka.
Zakraplacz.

Paraphimosis.

Odprowadzenie natychmiastowe załupka. W razie trudności, okłady z zimnej wody, z wody Goularda, a w razie znacznego obrzęku nacięcie.

By usunąć obrzęk żołędzi, okręca się ją na kilka minut kil-

kakrotnie w kierunku poprzecznym kateterem Nelatona, po zdjęciu tegoż szybko odprowadza się napletek.

Paresis vesicae.

Należy choremu polecić, by oddawał mocz w regularnych, nie zbyt wielkich odstępach. Jeżeli oddawanie moczu jest zupełnie niemożliwem lub jeżeli po samowolnem oddaniu jeszcze pewna ilość moczu w pęcherzu pozostaje, należy założyć 2—3 razy na dobę cewnik.

Przeciwno osłabieniu pęcherza, o ile ono nie jest objawem choroby ośrodków nerwowych, zaleca się leczenie hydropatyczne, kąpiele nasiadowe chłodne, zmywania, zimne lewatywy, stosowanie prądu stałego i przerywanego, masowanie, a na wewnątrz przetwory strychninowe.

764. *Strychnin. nitric.* 0·01,
Sacch. albi 4·00,
Mfpulv. div. in dos. 10.
S. 1—3 proszków dziennie.

765. *Strychnin. sulph.* 0·10,
Aqu. dest. 10·00.
S. Do iniekcji.

Parotitis.

Okłady wysychające z wody ciepłej lub octanu glinowego, na wewnątrz środki lekko przeczyszczające. W przypadkach ropnych wczesne nacięcia.

Pavor nocturnus.

Dyeta niedrażniąca, nie dawać kawy, herbaty, napojów wysokowych. Zimne zmywania, kąpiele, gimnastyka. Nie pobudzać wyobraźni opowiadaniem. Na noc nie dawać wiele jeść, sypialnię miernie oświetlić. W razie niedokrewności chinina, żelazo, a w potrzebie na noc cokolwiek soli bromowej, chlorału,

urethanu. Opium przeciwskazane.

766. *Chloralhydrat*
Natri brom. āā. 1·00,
Mucilag. g. ar.
Syrup rubid. āā. 15·00,
Aqu. dest. 80·00.
DS. Na noc łyżkę.

767. *Urethani* 2·00,
Aqu. dest. 80·00,
Syrupi 20·00.
DS. Na noc łyżkę.

Pediculi capitis.

Po obcięciu włosów, wymyć głowę roztworem sody, następnie wysmarować albo naftą czystą lub z dodatkiem balsamu peruwiańskiego.

768. *Ol. petrae* 50·00,
Bals. peruv. 20·00.
MDS. Do smarowania głowy.

Po dokładnem nasmarowaniu zawiązać głowę na 12 godzin, po czem należy kilka razy przemyć i wyczesać gęstym grzebieniem.

Pediculi pubis, Morpiones.

Na wieczór posmarować albo czystą maścią szarą, lub też

769. *Ol. petrae*
Unguent. cinerei āā. 10·00,
Bals. peruv. 5·00.
Mf. ung. S. Do smarowania.

Na drugi dzień kąpiel i oczyszczenie mydłem. Po 8 dniach leczenie powtórzyć, aby zniszczyć z gnid powstałe młode.

Pediculi corporis seu vestimenti.

Wymagają kąpiele i leczenia powstałych podrażnień skóry. Ubrania należy wyparzyć lub też napuścić 1—2% roztworem sublimatu.

Pemphigus.

Dobre odżywienie, na wewnątrz żelazo, chinina, Sol. ars. Fowleri a unikać leków osłabiających organizm (pigułki Morisona) leczenie rtęciowe.

W pemphigus pruriginosus kąpiele dziegiowe, t. j. naciera się skórę dziegiem, a w $\frac{1}{2}$ godz. po tem daje się kąpiel letnią przynajmniej godzinę trwającą. W przypadkach Pemphigus vegetans, daje się kąpiele sublimatowe (5—8 gr. na kąpiel). Przy zmianach w jamie ust, płukanie c. acido borico 2%. Ekzorytacje pokrywa się płatkami z maścią cynkową lub ochładzające maści.

P. neonatorum: smarować 1% olejem salicylowym i pudrow. c. *Zinc. oxyd. et talco ven.*

770. *Lanolin anhydrici* 10·00,

Adip. benzoïn. 20·00,

Liqu. plumb. subacet 30·00.

Mf. Ungu. S. Do smarowań.

Pericarditis.

Przedewszystkiem spokój, chory powinien leżeć w łóżku, mało się ruszać, na okolicę serca worek lodowy. W razie silnych bólów parę pijawek, suche bańki, pędzlowanie c. Tra. jodi. Na wewnątrz Inf. digitalis e. 1·00 ad 200·000, co godz. łyżkę, lub inne jakie cardiacum. W razie silnej gorączki podawać antipyrinę, phenacetinę lub antifebrynę w połączeniu z coffeiną dla uniknięcia zapadu. Jeżeli bóle trwają, dać morfinę, chloralhydrat, lub sulfonal na noc. Dyeta przy tem płynna, niepodniecająca, uważać na regularne stolce. — Jeżeli okres zapalny minął, stosować resorbentia: okłady ciepłe, pędzlowanie jodyną, diuretica, jak: coffeina, diuretyna, digitalis, Tra strophanti itp. a dyeta wówczas posilna, lekko podniecająca.

W uporeczywych przypadkach można zrobić punkcję i aspirację przyrządami Potain'a lub Dieulafoy, lecz rzadko kiedy chory się na to zgodzi.

771. *Infus. fol. digit.*

e 1·00 ad 180·00,

Syrup simpl. 20·00.

MDS. Co 2 godz. 2 łyżki.

772. *Tinct. Strophanti* 10·00.

DS. 3 razy dz. po 10 kropli.

Po ustaniu gorączki, gdy eksudat zostaje:

773. *Infus. juniperi* e 15·00

ad 200·00,

Liqu. Kali acet.

Oxymel Scillae aa. 15·00.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

774. *Infus. hb. digitalis*

e 1·00 ad 150·00,

Kali acet. 5·00,

Syrup simpl. 20·00.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

Dzieciom:

775. *Inf. digit.* e 0·20:100·00,

Coffein 0·05—0·10 pro dosi.

1—2 razy dziennie.

776. *Trae Convallar* 10·00.

DS. 3 razy dz. po 5—10 kropli.

Perimetritis.

W okresie ostrym:

Spokojne leżenie w łóżku, okłady lodowe na okolicę bolesną, w razie znacznej boleści i gwałtownych objawów, u osób silnych 5—6 pijawek nad okolicę pachwinową, dyeta ścisła, płynna, nadto wewnętrznie: Tra opii simpl. po 10 kropli kilka razy dziennie albo:

777. *Extr. opii aquos.* 0·10,

But. Cacao q. s. ut f. l. artis suppositoria ad anum

N. V.

DS. Co 3 godz. czopek użyć.

(Gdy nasilenie objawów się zmniejsza rzadziej.

Gdy ciepłota opadnie, środki łagodnie wypróżniające: lewatywy z wody z dodatkiem 2 łyżek ol. ricini albo z dodatkiem łyżki gliceryny. Czopki glicerynowe, oleum ricini wewnątrznie.

Gdy objawy ostrego zapalenia ustąpiły, okłady wysychające, po ustąpieniu bolesności: kąpiele nasiadowe ciepłe, z dodatkiem $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ kilo soli na kąpiel. Kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa).

778. *Trae jodi*

„ *gallarum aa.* 20'00.

DS. Do pędzlowania.

779. *Ammon. sulpho-ichthyol*
5'00—10'00,

Vasellini flavi 50'00.

Mf. ungu. DS. Zewnątrznie.

780. *Ammon. sulpho-ichthyol*
5'00—10'00,
Glycerini 200'00.

MDS. Do tampon. codziennie.

W przypadkach przewlekłych miesienie.

781. *Kali jodati* 10'00,
Gelatini q. s. f. l. art. globuli vaginales N. X.

DS. Raz dnia gałkę użyć lub:

782. *Jodoformii desodorati* 3'00,
But. Cacao q. s. ut f. l. art. globuli vaginales N. X.

DS. Raz dnia gałkę użyć.

783. *Ammon. sulpho-icht.* 1'00,
Butyr. Cacao q. s. f. l. art. suppos. ad anum N. X.

S. Jeden czopek dziennie użyć.

Periostitis.

Spokój, pędzlowanie nastojem jodowym, okłady wysychające z octanu glinowego. W przypadkach ropnych, szerokie przecięcie ropni. Jeżeli przyczyną zapalenia okostnej szczęki jest ząb schorzały, należy go wyjąć.

Tam, gdzie istnieje podejrzenie o sprawę kiłową, należy stosować plaster rtęciowy, a na e-

wentualnie towarzyszące owrzodzenia przykładąć maść rtęciową, na wewnątrz zaś podawać przetwory jodowe.

784. *Kal. jodat.* 5—10'00,
Aqu. dest. 200'00.

S. 3 łyżki dziennie.

785. *Natri jodati* 5'00—10'00,
Aqu. dest. 200'00.

S. 3 łyżki dziennie.

786. *Empl. hydrarg. extens.*
 $\frac{1}{4}$ m.

S. Pokrajać na paski i przykładać na miejsca zgrubiałe.

787. *Merc. praecip. rubri* 1'00
—3'00,

Ungu. simpl. 50'00.

Mf. ungu. S. Maść.

Peritonitis.

Przedewszystkiem chory powinien zachować bezwzględny spokój; dyeta ściśle płynna. Wewnątrznie należy podawać przetwory makowca w dużych dawkach, a w razie silnych wymiotów kawałki lodu do połykania i cocainę. Zewnątrznie środki przeciwzapalne, okład lodowy, pijawki. Gdy okres ostry minie okłady wysychające lub ciepłe. Kąpiele ciepłe całe lub nasiadowe.

W przypadkach surowiczego zapalenia z przebiegiem chronicznym, może być czasem wskazane wypuszczenie płynu z jamy brzusznej, a nawet t. z. tualeta jamy brzusznej.

Peritonitis chronica, zwłaszcza u dzieci, wymaga dobrego odżywiania, wcieranie szarego mydła na ściany brzucha, kąpiele solne (Iwonicz, Rabka), kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa), Punkeya.

Do wewnątrz: żelazo, jod z żelazem, Syrup ferri jodati.

P. tuberculosa: leczyć według tychsamych zasad; punkeye wykonywać tylko w ostateczności.

788. *Antipyrin* 10·00,
Aqu. dest. 150·00.
 DS. 2 łyżki do lewatywy co
 2 godziny, póki gorączka nie
 spadnie do 38.

789. *Antipyrin* 2·00,
Aqu. dest. 60·00,
Syr. rubid 20·00.
 MDS. Co 3 godz. 2 łyżeczki
 (dla dzieci).

790. *Laudani pur.* 0·02,
Sacch. albi 0·30,
Dtur. tal. dos. XII.
 S. 3 pr. dziennie.

791. *Cocaini mur.* 0·15,
Aqu. dest. 10·00.
 DS. W razie wymiotów 10—
 15 kropli zażyć.

792. *Emuls. commun.* 200·00,
Aqu. lauroc. 5·00,
Morphii mur. 0·05,
Syrup simpl. 10·00.
 MDS. Co godz. łyżkę.

W razie parcia na stolec:

793. *Morphii mur.* 0·01,
Extr. bellad. 0·02,
Butyri Cacao 1·00,
f. suppos. dtur. tal. dos. X.
 S. W razie parcia jeden czo-
 pek użyć.

794. *Jodoform* 5·00,
Lanolin
Vaselin āā. 25·00.
 Mfung. S. Rano i w. wieczerać.

Perniones. Odmrożenie.

Przemywanie alunem, bora-
 xem, pędzlowanie tinct. jodową,
 rozcieńczonym kwasem cytry-
 nowym lub octowym.

795. *Aluminis*
Boracis āā. 5·00,
Solve in
Aqu. rosarum 300·00,
Trae benzoës 15·00.
 DS. Do zmywań.

796. *Ung. rosat* 75·00,
Ol. lauri 15·00,
Camphorae 10·00.
 Mfung. S. Maść na odmrożenie.

797. *Boracis* 5·00,
Ung. spl. 25·00.
 Mfung. S. Maść na odmrożenie.

798. *Ol. camphorati* 2·00,
Lanolini 20·00.
 Mf. ungu. S. Do nacierań.

799. *Aristoli* 1·00,
Aether. sulph. 10·00,
Collodii 30·00.
 MDS. Do pędzlowań.

800. *Medullae ossium* 30·00,
Acid. mur. conc. 20·00,
Ungu. altheae 80·00,
Extr. opii aquos
Camphorae rasae āā. 1·00,
Terebinth. venet. 15·00.
 Mf. ungu. S. Do smarowań.

801. *Cocain hydrochl.* 0·20,
Lanolin 10·00.
 Mf. ungu. S. Wcieranie.

Rp. Mentholi 1·50,
Saloli 2·00,
Ol. oliv. 2·00,
Lanolin 50·00.
 S. 2 razy dz. wcierać w ręce.

Na owrzodzenia opatrunki jo-
 doformowe, maść z azotanu sre-
 bra itp.

Pertussis. Koklusz. Krztusiec.

Oddzielić dzieci zdrowe zwa-
 szcza małe. Dyeta pożywna, kar-
 mić zaraz po wymiotach. Pobyt
 na świeżem powietrzu, oddy-
 chanie zgęszczonem powietrzem,
 zmiana miejsca pobytu. Rozpy-
 lanie 5% kw. karbol. w miesz-
 kaniu. — Przy napadach doby-
 wać palcem w szmatkę zawinię-
 tym wydzielinę.

W razie wystąpienia zapale-
 nia płuc (napady czasem ustają)
 dawać leki wykrztuśne:

Inf. ipecac. c. Natro benzoico.

802. *Trae bellad. gtts.* 2—5,
Mixtur. gummos. 100·00,
Syrup simpl. 15·00.
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

803. *Chloral hydratis* 0·50,
Ammon. v. Natri bromati 2·00,
Aqu. dest. 100·00,
Mixtur. gumm.

Syrup rubid. āā. 15·00.
 MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

804. *Cocain mur.* 1·00,
Aqu. dest. 10·00.

MDS. Do pedzlowań, przetyku
 i krtani.

805. *Morphii mur.* 0·01—0·02,
Aqu. dest. 60·00,
Syrup altheae 15·00.

MDS. 3 razy dz. łyżeczkę.

806. *Chinini muriat.* 0·50,
Natr. bicarb.

Sacchari āā. 1·50,
Mfp. div. in dos. 10.

S. Co 3 godz. proszek.

807. *Trae alcohol. rad. aconit.*

Trae bellad. āā. gtts. 10,
Aqu. amygdal. amar. 1·00,
Aqu. dest. 100·00,

Syrup aurant. 20·00.

MDS. 3—4 r. dzien. łyżeczkę.

808. *Stibii sulphur. aur.* 0·50,

Mucilag. gum. ar. 20·00,
Aqu. dest. 50·00,

Syr. simpl. 20·00.

MDS. Skłóciwszy, co 2 godz.
 łyżeczkę.

809. *Coccionell pulv.* 1·00,

Kali carbon. 3·00,
Sacchari 10·00,

Aq. dest. 100·00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

810. *Antipyrin.* 1·00,

Terpinhydratis 1·00,
Aqu. tiliae

Syrup aurant āā. 50·00.

MDS. 4—5 r. dzien. łyżeczkę.

811. *Extr. hyosc.* 0·20,

Linctus gummosi 100·00,
Syrup rubid. 20·00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

812. *Codeini mur.* 0·05,

Linct. gumm. 60·00,
Syrup altheae 30·00.

MDS. 3—4 łyżek dziennie.

813. *Antipyrin* 0·50—1·00,

Aqu. de Vichy 80·00,

Syrup rubid. 20·00.

DS. Używać zaraz po napa-
 dzie łyżeczkę. — Wyżyć
 w ciągu 24 godzin.

814. *Dct. hbae Thymi*

10·00 ad 200·00,

Ammon. bromat. 2·00,

Syrup altheae 20·00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

815. *Bromoformii* 5·00.

DS. Dzieciom

do roku życia 2—3 kropli,

od 2—4 lat 3—4 „

do 8 lat 4—5 „

3 razy dziennie podać w ły-
 żeczce wody.

Ponieważ bromoform perełka-
 mi osiada, uważać, aby dzieci
 połknęły (Br. należy chronić
 przed światłem, a gdy zecer-
 wienieje, odrzucić).

816. *Acidi benzoici*

Bismut. salicyl. āā. 5·00,

Chinin sulph. 1·00.

Mfp. DS. 2 r. dziennie wdmu-
 chiwać do nosa.

817. *Acidi borici*

Coff. tost. āā. 5·00.

Mfp. DS. 2 r. dziennie wdmu-
 chiwać do nosa.

818. *Thymoli* 1·00,

Spir. vini rectific. 250·00,

Aqu. dest. 750·00.

DS. Do inhalacyi.

Jako środek, zmniejszający
 ilość napadów, znoszący wymio-
 ty, polecają kreozot. Podaje się
 albo w syropie (0·50:100·00) dzie-
 ciom od 1½—2 mies. 2 łyżeczki
 dzien., starszym 6—8 łyżeczek,
 lub też we winie z wodą aro-
 matyczną i syropem.

819. *Creosoti* 0·25,

Sulphonal 0·20,

Syrup tolutani 150·00.

MDS. Co 2 godziny łyżeczkę
 (przed użyciem wstrząsnąć).

- S20.** *Antispasmini* 1'00,
Aq. amygd. amar. 10'00.
 S. 1—2 r. dz. po 15 kropli.

Pharyngitis.

W nieżytach lekko przebiegających, wystarczają płukania słoną wodą, ślazem itp., zabronić palenia tytoniu i trunków.

W cięższych przypadkach używać wdychania z alunu, ac. tannic. Pędzlować roztworem lapisu (1:20) ac. tannicum (1:15).

- S21.** *Alum crudi* 10'00,
Aqu. dest. 500'00.
 DS. Płukanie.

- S22.** *Kali hypermang.* 0'10,
Aqu. dest. 500'00.
 DS. Płukanie.

- S23.** *Kali chlorici* 10'00,
Aqu. dest. 500'00.
 DS. Płukanie.

- S24.** *Jodi puri* 0'15,
Kali jodati 0'50,
Glycerini 50'00.
 MDS. Do Pędzlowania.

- S25.** *Trae myrrhae* 15'00,
 „ *pimpinell* 2'50,
Ol. menth. pip. gttss. V.
 MDS. 15—20 kropli na szklankę płukania. W razie znacznej bolesności, pędzlowanie 5% rozc. Cocaïny.

Phimosi.

Jeżeli phimosi jest skutkiem zapalenia, to w wielu przypadkach udaje się ją usunąć leczeniem przeciwzapalnym: spokój, ułożenie członka podwyższone, zimne okłady, przestrzykiwanie kwasem borowym 2% pod napletek, by wydzielić przy istnieniu balanitis, trypra, wrzodu miękkiego lub twardego usunąć. W razie, gdy phimosi jest wypływem kiły, utrzymuje się uporczywie, a niema objawów zgorzeli, przedsiębierze się energiczną kurację rtęciową, w takim razie

wraz z ustępowaniem zmian kiłowych napletka, i phimosi ustępuje. W razie grożącej zgorzeli, skutkiem wzajemnego ucisku obrzmiałej żołądzi na napletek, operacyjne zniesienie phimosy.

Metody operacyi:

1) Rozcięcie wewnętrznej blaszki napletka. Naciąga się ile możliwości zewnętrzną blaszkę napletka na żołądzi, napinając w ten sposób brzeg napletka, który się w linii środkowej na długość $\frac{1}{2}$ ctm. nacina, przy dalszem naciąganiu napletka na żołądzi, przecina się wciąż napinającą się blaszkę wewnętrzną dopóki napletek nie da się zupełnie odprowadzić.

2) Przeciawszy na grzbiecie członka obie blaszki napletka, zeszywa się blaszkę napletka wewnętrzną z zewnętrzną.

3) Circumcisio: Cięcie jak wyżej, aż do sulcus coronarius, wzdłuż tego ostatniego prowadzi się cięcie tak, by z blaszki wewnętrznej napletka jaknajwięcej, z zewnętrznej jaknajmniej wyciąć.

Pityriasis versicolor.

- S26.** *Trae Veratri viridis* 30'00.
 DS. Do pędzlowania na noc.
 Następnego dnia zmyć wodą mydlaną.

- S27.** *Acidi salic.* 3'00,
Sulphur. praecip. 10'00,
Lanolin
Vaselin āā. 50'00.
 DS. Wieczorem nasmarować, rano zmyć wodą z mydłem.

Pleuritis.

Chory ma leżeć w łóżku, pożywienie płynne, zwłaszcza jeżeli jest gorączka. Suche bańki na okolicę zajętą zapaleniem opłucnej, jeżeli bardzo silny ból, to nawet 4—6 pijawek. Po tem

okład lodowy, lub wysychający. Z resztą leczenie wyczekujące, co najwyżej jakiś kwasek do picia, małe dawki chininy. W razie męczącego kaszlu, morfina. Jeżeli się wypocina nie wytwarza, to pozostać przy tem leczeniu, co najwyżej pędzlowanie przez kilka dni cum Tra jodi i nie pozwalać choremu wychodzić, dopóki tarcie istnieje i stan podgorączkowy się utrzymuje. Z resztą trzeba leczyć chorobę zasadniczą, najczęściej nacieki szczytowe. Jeżeli zaś jest już znaczna wypocina, to obok okładów wysychających można zalecić ciepłe kataplazmy. W okresie, kiedy już wypociny nie przybywa, pędzlowanie jodyną, vesicantia, stosowane co 2—3 dni na inne miejsce. Na wewnątrz Natr. salicylicum po 3—4 grm. dziennie, diuretica jak: Inf. digitalis, Theobrom. natro salicyl. po 4—5 grm. dziennie, Coffeinum natro salic. 1—1.5 dziennie, Calomel, Adonis vernalis 6'00 na 200'00., Tra. stroph., Kali nitratum itp. Nadto można próbować środków przeczyszczających, jeżeli nie ma przeciwwskazania: Kali. jodat. 10'00:200'00 na wewnątrz 2—3 łyżek pro die.

Tam, gdzie wypocina ropna, należy zrobić resekcję żebra i ropę wypuścić, jeżeli zaś chory nie chce, to przynajmniej punkcję i aspirację płynu przyrządem Potaina lub Dieulafoy. Punkcja nadto jest wskazana, jeżeli znaczna bardzo duszność grozi życiu chorego.

Po przebyciu zapalenia opłucnej, wyjazd na świeże powietrze, w góry, odżywianie forso-
wne, gimnastyka odpowiednia i leczenie w gabinetach pneumatycznych.

Zresztą leczyć należy chorobę główną, która dała powód do

zapalenia opłucnej, a tą jest najczęściej gruźlica płuc.

828. *Dect. cort. chinae*

e 10'00 ad 150'00,

Natri salicyl 3'00,

Syrup aurant. 20'00.

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

Dzieciom Natr. salic. 0'10—0'30
pro dosi. Co 2—4 godz.

829. *Chloroformii 10'00,*

Ol. hyosc.

Ol. olivar. āā. 20'00.

S. Do nacierañ.

Przy pozostałym exsudacie:

830. *Decoct. ononidinis*

e 15'00 ad 200'00,

Oxymel Scillae 20'00.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

831. *Natr. chlorat. 5'00,*

Lithii chlorat. 1'00,

Aqu. petroselin 130'00,

Syrup menth. 200'00.

S. Co 2 godz. łyżkę.

832. *Syrup ferri jodati 10'00,*

Syr. simpl. 20'00.

MDS. 3 razy dz. po 20 kropli
(dla dziecka 5 let).

Pneumonia.

Leków swoistych przeciw pneumonii nie posiadamy. Leczenie więc przeważnie dyetetyczne. Chory powinien leżeć w dużym pokoju o jednostajnej temperaturze, dyeta tylko płynna: bulion, rosół, mleko, winna polewka, wino, rosół z jajem, do picia jakiś kwasek lub lemoniada.

W pierwszym okresie zapalenia płuc można postawić suche bańki, zwłaszcza, jeżeli jest kłócie w piersiach, przy bardzo silnem kłóciu nawet 2—3 pija-
wek lub cięte bańki i okład lodowy lub wstrzyknięcie morfiny. Przy silniejszym kaszlu, męczącym chorego, nieznaczne dawki narkotyków. Jeżeli gorączka bardzo wysoka lub trwa długo, na-

leży przeciwdziałać przez zmywanie ciała letnią wodą lub pół na pół wodą z octem, dalej środki przeciwgorączkowe jak: antipyrinę 1·00—2·00 lub phenacetinę, ale lepiej z dodatkiem coffeiny 0·15—0·20 na dawkę, lub też obok antipyretików dać jeszcze cognac lub mocne wino. Przy słabem tętnie, liczej akcji serca, podać digitalis, strophantus lub sparteinę.

W objawach zapadu na wewnętrznie camphora 0·1 w kieliszku wina lub podskórnie strzykawkę ol. camphorat.; wreszcie, podskórnie eter.

833. *Infus Valerianae*
e 5·00 ad 200·00,
Aether sulph. 2·00,
Syr. aurant. 20·00.
S. Co godzinę łyżkę.

Chorem, przyzwyczajonemu do nadużywania wysokości, należy nie szczędzić wina, cognacu, ażeby nie wybuchło delirium. W razie delirium: opium, morfiną lub chloralhydrat (2—3 grm.). W okresie rozdzielania się nacieku: środki wykrztuśne, rozdzielające jak: woda giesshübel'ska, selterska, szczawnicka.

834. *Infus ipecac.*
e 0·30 ad 180·00,
Aqu. lauroc. 2·00,
Syr. althaeae 20·00.
DS. Co 2 godziny łyżkę.

835. *Infus senegae*
e 10·00 ad 200·00,
Natri benzoici 2—3·00,
Liquor ammon. anis. 2·00,
Syrup simpl. 20·00.
S. Co 2 godziny łyżkę.

Pulv. Doveri 0·25, 2 lub 3 dawki, Stib. sulphur. aurant. 0·01—0·02 na dawkę, 2—3 razy na dzień itp. W razie trudnego rozdzielania się nacieku: okłady wysychające, okłady ciepłe, kataplazmy, dyeta pożywna, wino, cognac.

U dzieci: regularne żywienie, mleko, rosół, do napoju kwaski, Acid mur. 1⁰/₀. Ac. phosph. ¹/₂⁰/₀ zimne okłady na głowę. Środków przeciwgorączkowych silnych a zwłaszcza digitalis unikać.

Przeciwiw objawom ze strony mózgu lub żołądka: Calomel (0·05—0·10). W razie zapadu, osłabienia serca, czarna kawa, cognac, szampan, kamfora. Wezwać znacznego spadku ciepłoty, wino. Po przełomie choroby środki wykrztuśne.

Pneumonia catarrhalis zob. Bronchopneumonia.

Poliomyelitis anterior acuta.

Rzadko można widzieć pierwszy okres, w tym razie zimne okłady na głowę i kręgosłup, środki przeczyszczające (calom.). W drugim okresie t. j. (porażenia) pedzlowanie jodem, prąd stały (po 5 minut), Anoda szereka na kręgi szyjne, katoda guziczkowa na porażone mięśnie. Gimnastyka lecznicza, środki wzmacniające: żelazo, podskórne wstrzykiwania strychnin. mur. (0·001) pro dosi 2 razy na tydzień. Nacierania części porażonych wyskokowymi, aromatycznymi przetworami. W końcu leczenie ortopedyczne.

Pollutiones.

Uwzględnić: Phimosi, Balanitis, Urethritis, Obstipatio, Helminthiasis, Onanię, Anaemię. Dobre odżywianie, unikanie wyrobków in Baccho et Venere. Pościel niezbyt miękka i lekkie przykrycie. Kąpiele nasiadowe letnie na 20—25°. Elektroterapia. Hydroterapia. Kąpiele rzeczne. Pobyt na świeżem powietrzu, wcześnie wieczór, unikać spania na wznak.

Nerwowym: Natrum bromatum 2—3 grm. dziennie, osłabionym chinina, żelazo, arsen.

836. *Extr. secal. corn.* 5'00,
Sacchari 15'00,
Mfp. div. in dos. N. 20.

DS. Rano i wieczór proszek.

837. *Ferri bromati* 0'30,
Natri brom. 5'00,
Aqu. dest. 60'00,
Syrup cort. aur. 30'00.

DS. Rano łyżkę, wiecz. 2—3.

Processus puerperalis.

Zapobiegać przeniesieniu zakażenia z osób chorych na zdrowe. Ścisłe aseptyczne postępowanie podczas porodu t.j. utrzymanie w stanie aseptycznym rąk, narzędzi, bielizny czyli wszystkiego, co wchodzi w zetknięcie z rodzącą, unikanie niepotrzebnego częstego badania rodzącej.

Gdy występuje po porodzie gorączka lekka do 38° C. a tętno spokojne, odchody rozłożone: przestrzykiwanie pochwy 1—2 razy dnia rozczynami: kw. karbolowego, kw. borowego, Creoliny, Thymolu. Posypanie owrzodzeń w przedsionki i na międzykroczu jodoformem, opatrzenie gazą jodoformową. Antipyretica, zaciemniają obraz chorobowy i nie przynoszą korzyści.

Gdy ciepłota i tętno się podnosi po użyciu postępowaniu: przestrzykiwanie jamy macicy środkami przeciwnieciwgnilnymi. (Acid boricum 3%, Acid carbol. 2—5% itd. zapomocą cewników Bozemann, Fritscha, Olshausena, 2—3 razy dzien. Gdy po dwóch dniach ciepłota nie opada, postępowania tego zaniechać.

Gdy są objawy podrażnienia otrzewnej: lód na brzuch, opium, pro anum.

Środki rozwalniające (Ol. ricini, Calomel) podawać można,

tylko gdy nie ma zadrażnienia otrzewny.

Po rozwinięciu się gorączki połogowej, postępowanie Rungego: mocne wina 1—2 butelek dziennie, cognac. Gdy skłonność do wymiotów, wino szampańskie z lodu.

838. *Cocaini muriat.* 0'10,
Aqu. dest. 100'00.

DS. Co pół godz. łyżeczkę.

Gdy wstręt do wina, to cognac, rum.

839. *Spir. vini cognac. optimi*
Aqu. dest. āā. 60'00,
Vitell. ovi unius
Syr. simpl. 20'00.

DS. Co pół godz. 1—2 łyżek.

Mleko, herbata, czarna kawa, silne rosoły, Beeftea; do napoju: woda z dodatkiem białka kurzego jednego jaja na szklankę (przecedzić). Gdy tętno szybko: Coffeina interne. Jeżeli nie ma podrażnienia otrzewny, kapielne letne (22—24° R.) 5—10 minut 1—2 razy dziennie.

Postępowanie przeciwgorączkowe: Gdy ciepłota dochodzi do 39.5° C., zmywania całego ciała kilka razy dziennie, gdy dochodzi do 40° C. zawijanie w mokre, w letniej wodzie maczane prześcieradła; zawijanie takie można powtórzyć 2—3—4 razy, aż do opadnięcia ciepłoty, 1—2 razy dziennie. Zimny okład na głowę. Uważać na tętno i w razie zapadu, środki podniecające.

Proctitis.

Leczenie ogranicza się do stosowania lewatyw oczyszczających i zawierających środki ściągające i przeciwnieciwgnilne, zwłaszcza kw. borowy 2% lub Natr. Salicyl., obok tego z powodu towarzyszącego parcia na stolec czopki ze środkami odurzające-

mi i letnie kąpiele nasiadowe. Najważniejszym jest jednak leczenie przeczynowe.

840. *Zinci sulph.* 1·00,
Dent. tal. dos. X.

DS. Jeden proszek w pół litra wody letniej rozpuścić i użyć jako lewatywy.

841. *Acid. tannici* 0·05,
Butyri Cacao 1·00,
Mf. supposit. dent. tal. dos. N. X.

DS. 2—3 czopki dziennie.

842. *Morph. mur.* 0·01,
Extr. Bellad. 0·02,
Butyri Cacao 1·00,
f. supposit dent. tal. dos. X.
S. 2—3 czopki na dobę użyć.

Prosopalgia vide Neuralgia trigemini.

Prurigo.

Leczenie wewnętrzne:

843. *Acid. carbolici* 5·00,
Extr. et pulv. gent. q. s. ut f. pil. N. 50.
Consp. pulv. Lycopod.

DS. 3—5 pigulek 2 razy dnia.

Jeżeli choroba jest skutkiem anaemii, kaheksyi lub żołądów, to podawać na wewnątrz: tran, jod, żelazo. W lecie Rąbka, Iwoniez.

Leczenie zewnętrzne:

Kąpiele siarczane lub zwykłe z dodatkiem Sol. Flemmickx. Nacierania maścią Wilkinsona przez kilka lub kilkanaście dni. Nacierania dziegiem i zmywanie tegoż w kąpiel. W ostatnich czasach z bardzo dobrym skutkiem używa się maść Naftol-B u dorosłych 4—5% u dzieci 2%. Maść tę naciera się pędzlem szczeciniowym, zasypuje pudrem i zostawia na noc, z rana bierze chory kąpiel. W bardzo łagodnych przypadkach u dzieci, ką-

pie się co dzień dziecko w wodzie przepuszczonej przez otręby, po kąpielu naciera się skórę białem, a czasem tylko wobec silniejszej reakcyi przez 8—10 dni maścią naftolową 2%.

Z dobrym skutkiem używano:

844. *Tiopheni* 5—10·00,
Vaselini
Lanolini āā. 50·00.
Mfu. S. Maść.

Ihle poleca:

845. *Oesypi*
Ol. olivar. āā. 10·00,
Zinci oxydati
(Amyli tritici) q. s.
f. pasta mollis.

Colombini zaleca:

846. *Mentholi* $\frac{1}{2}$ —3%,
Zinci oxydati
Amyli tritici āā. 25·00,
Vaselini flavi 50·00.
Mf. Pasta.

Prurigo ferox.

Przez 8—14 dni zmywanie skóry mydłem szarem w kąpiel i następnie nacieranie maścią Wilkinsona. Później należy przez 6 tygodni nacierać skórę cienką warstwą maści naftol. (4—5%).

W dalszym ciągu, kiedy swędzenie znacznie ustąpi, 2 razy w tygodniu kąpiel lotnia i nacieranie skóry białem. Po kilku miesiącach wystarczy to raz na tydzień wykonać.

Pruritus ani.

847. *Hdrgr. bichlor.* 0·03,
Ammon. chlorati 0·12,
Acidi carbol. 4·00,
Glycerin 60·00,
Aq. rosar. 115·00.

MDS. Rano i wiecz. posmarować, gdy skóra zgrubiała, posmarować raz kreozotem.

Przy Pr. ani, unikać picia kawy.

Pruritus cutaneus.

Leczenie przyczyn wywołujących: choroby żołądka, wątroby.

Kąpiele zimne, siarczane ze sodą, alunem.

848. *Natr. salic.* 5·00,
Aqu. dest. 180·00,
Syrup rubid. 20·00.

MDS. 3 razy dz. po 2 łyżki.
Obmywanie 3% roztworem
spirytusowym mentholu.

849. *Cocaini* 1·00,
Mentholi 1·00,
Lanolin 50·00.

MDS. Do nacierania.

850. *Menthol.* 2·50,
Bals. peruv. 5·00,
Ung. Wilsonii
Lanolin āā. 50·00.
Mfu. S. Do nacierania.

Pruritus senilis.

Kąpiele z otrebami, zmywania wodą gorącą (40°), do której dodać roztworu:

851. *Acid. carbol.* 4·00,
Aceti arom. 200·00.
2 łyżki, po czem zapudrować.

852. *Bismut. salicyl.* 20·00,
Amyli 90·00.
MDS. Puder.

853. *Oesypi*
Ol. olivar. āā. 10·00,
Zinci oxyd.
Amyli tritici āā. q. s.
f. pasta moll.
S. Maść.

Pruritus vulvae.

Uwzględnić przyczyny: Vulvitis, vaginitis, obstipatio, diabetes. Unikać drapania, kąpiele nasiadowe (24—26°), okłady z wody karbol. 3%, Sublimat (0·50:1000·00). Laseczka mentolowa.

854. *Acidi carbol. crist.* 5—10·00,
Ol. olivar. 100·00.
DS. Do smarowania.

855. *Chloroformii* 5·00,
Ol. olivar. 50·00.

MDS. Do pędzlowania.

856. *Natri subsulphur.* 30·00,
Acid. carbol. 5·00,
Glycerini 20·00,
Aqu. pest. 500·00.

MDS. Do obmywania, rozgrzewszy poprzednio płyn.

857. *Cocain* 1·00,
Lanolin 20·00.

Mf. ungu. S. Do smarowania.

Pseudocroup-Laryngitis stridula.

Wziewanie pary wodnej lub słabych roztworów soli, *Natr. carbon.*, *Ammon. mur.* jużto z inhalatora, jużto trzymając dzieci nad parą. Ciepłe okłady na szyję, kataplażmy. Podawać dużo ciepłych napojów, herbaty, mleka, w ostateczności środki wymiotne.

858. *Inf. ipecac. e* 2·00 *ad* 40·00,
Tart. stib. 0·05,
Syrup 10·00.

MDS. Co 10 minut łyżeczkę.

859. *Cupri sulphur.* 0·20,
Aqu. dest. 40·00,
Syrup 15·00.

DS. Co 10 minut łyżeczkę.

Dzieci skłonne do P. w czasie niepogody trzymać w domu.

Psoriasis.

Leczenie musi być wewnętrzne i zewnętrzne.

Leczenie wewnętrzne:

860. *Solutio Fowleri*
Trae malatis ferri āā. 10·00.

Z roztworu powyższego daje się po obiedzie i po kolacyi z początku po 6 kropli, 4-go dnia zwiększa się dawkę o 2 krople pro die, zwiększając następnie co 3 dni dawkę o 2 krople, dochodzi się aż do 24 kropli pro die. Odtąd zwiększa się dawkę co 5 dni o 2 krople i do-

chodzi się do tej ilości, przy której, zmiany w sposób widoczny zaczynają ustępować (zwykle przy 40-tu kroplach pro die) i teraz w ten sam sposób zmniejsza się dawkę stopniowo, schodząc do początkowej ilości.

Polecają też wody arsenikalne: Gubera, Levico i t. d.

Można także podawać arszenik w postaci pigułek.

(*Pillulae asiaticae*).

861. *Acid. arsen. 0·65!!*

Pulv. piper. nigri 6·00,

Gummi arab. 1·50,

Rad. althaeae pulv. 2·00,

M. c. aq. dest. q. s. ut f. pil.
N. 100.

Pigułek używa się albo po obiedzie i kolacyi lub bezpośrednio przed niemi. Rozpoczyna się od 2 pigułek pro die, które się przed obiadem zażywa. Co 5-ty dzień podwyższa się dawkę o jedną pigułkę pro die, dochodzi się do 8—10 pigułek dziennie.

Skoro się dojdzie do 5-ciu pigułek, rozdziela się je na dwie dawki, t. j. 3 pigułki po obiedzie 2 po kolacyi i t. d.

Wrazie wystąpienia biegunki, bólu brzucha, nudności, zmniejsza się ilość pigułek.

Jeżeli chodzi o szybkie usunięcie zmian, robi się iniekcye z Sol. Fowleri.

862. *Sol. arsen. Fowleri 2·00,*

Aqu. dest. 10·00.

MDS. Do iniekcji, jedną strzykawkę Prawaza.

Z innych środków wewnętrznych mniej skutecznych są używane:

863. *Aq. picis*

Aq. fontis āā. 250·00.

MDS. 1/2 litra dziennie wypić.

864. *Acid. carbol. 10·00,*

Extr. et pulv. Liquir āā. q. s. ut f. pil. N. 100.

DS. 5—10 pigułek dziennie.

Leczenie zewnętrzne:

W okresie wybuchowym ostrym nie używać środków zewnętrznych (prócz pudru), gdyż można wywołać wyprysk ostry, i dolegliwości pacjenta znacznie zwiększyć, w okresie tym tylko środki wewnętrzne mogą być użyte.

Wskazania: 1) usunąć łuski, 2) znieść nacieki, 3) usunąć zaczerwienienie.

Co do 1-go: zmywania mydłem szarem 5—6 krotnie połączone z kąpielą.

Co do 2-go: — Środki liczne, najlepszy kwas pyrogalusowy.

865. *Acidi pyrogal. 10·00,*

Ung. simpl. 100·00.

Mf. ungu. S. maść.

Uważać na objawy zatrucia, charakteryzują się one moczem oliwkowym.

W celu usunięcia zaczerwienienia, przepisuje się dziegieć, (który się weiera pędzlem szczytinowym) pozostawia się przez godzinę na skórze, a następnie daje się kąpiel.

W celu uniknięcia zatrucia przy rozległych zmianach na skórze, pędzluje się tylko część miejsc schorzałych, później dopiero wszystkie.

Psoriasis skóry głowy:

Usuwa się łuski oliwą, następnie zmywa się 2 razy dnia spirytusem mydlanym i weiera się następnie pomadą:

866. *Hydrarg. praecip. albi*

1·00,

Ungu. emolient. 12·00.

Mfungu. S. Pomada.

Po 8—10 dniach robi się to tylko raz dziennie.

Resnier poleca maść:

867. *Sapon. kalini mollis*
Vaselini āā. 100·00,
Ichtyol 10·00,
Acidi Salicyl
Acidi pyrogallici āā. 5·00.
 Mfung. S. Maść.

W wyjątkowych razach, gdy leczenie to nie pomaga, wtedy używamy naftolu.

868. *Naphtol-B* 15·00,
Vaselini albi 100·00,
Sap. viridis 20·00.
 Mf. S. maść.

W okresie wybuchowym ostrym nie używać środków zewnętrznych, gdyż można wywołać wyprysk.

Pustula maligna (Anthrax).

W celu zniesienia napięcia i uwolnienia ropy, zrobić kilka głębokich cięć krzyżujących się, przepłukać kwasem karbolowym 4‰, między brzegi nacięć założyć paski gazy jodoformowej i posypać jodoformem, nadto robi się okład wysychający z płynu Burowa, zamoczywszy w nim watę Bruns'a, na wierzch daje się papier kauczukowy, lub ceratkę i przymocowuje bandażem.

Pyæmia.

Należy usunąć pierwotne ognisko lub przynajmniej zapewnić wydzielinie należyty odpływ.

Pożywienie winno być podawane w formie łatwo strawnej a posilnej; cognac, stare wino. Ogniska przerzutowe należy rychło otworzyć i ropę z nich wypuścić. Z lekarstw najlepiej ograniczyć się do przetworów chininy i coffeiny.

869. *Coffein citr.* 1·00,
Aqu. cinanom. 150·00.
 S. Co 2 godziny łyżkę zażyć.

Pyelitis.

Jeżeli jest okres ostry zapalny: Chory ma leżeć w łóżku, suche bańki w okolicę nerek, dyeta tylko płynna, przeważnie mleczna, najlepiej mleko pół na pół z wodą wapienną, picie wody: Bilińska. Giesshübler, wystrzegać się kawy, herbaty, korzennych zapraw i napitków wyskokowych.

Przy cierpieniu przewlekłym dyeta mniej ścisła, z unikaniem jednak wszelkich napojów wyskokowych i korzeni.

Ze środków wewnętrznych można polecić odwar; Fol. uva ursi 15·0 na 300·0 z tego co godzina łyżkę, luk fliżankami pić. Lub Arbutini 2—3 grm. pro die w proszkach (środek drogi mało skuteczny).

870. Ol. ligni santali 3 razy po 10—15 kropli w kawie lub mleku. Kali chloric. 4—6·0 na 200·0 z tego co godzinę łyżkę.

Dobrze też działa Tannina z opium:

871. *Tannini* 0·30,
Opii 0·02,
Mfp. d. tal. dos. N. X.
 S. 3—5 proszki dziennie.

Polecić też można do picia wodę sodową kwaśną (Rzāca i Chmurski). Kąpiele nasiadowe ciepłe, okłady wysychające, wrzazie bólów na wewnątrz lub podskórnie morfinę. Zresztą trzeba leczyć główną przyczynę choroby.

Rachitis. Krzywica.

Najwięcej pomaga baczność na pielęgnowanie i żywienie. Dzieci z krzywicą powinny być jak najwięcej na powietrzu, ubranie lekkie, zamiast pierza materace z włosia, przy Cranio-tabes: poduszeczka z włosia

z wyciętym otworem na główkę. Przy skrzywieniach kręgosłupa i załamaniu kończyn, niepozwalając dzieciom bez podpory siedzieć, a próby ze staniem i chodzeniem bardzo ostrożnie zaczynać. W razie obfitych potów zmywać ciało kilka razy gąbką zamaczaną w zimnej wodzie i dobrze wycisnąć, a zwłaszcza tyłogłowie. Matka słaba nie powinna karmić dziecka z krzywicą.

Dziecko z krzywicą powinno już w 4-tym miesiącu dostawać nieco solonego rosołu, o ile można, nie dawać pokarmów skrobiowych. Po odłączeniu głównym pokarmem (po ósmym miesiącu) mięso z wyjątkiem wieprzowego, jaja, nieco wina, mleko.

Starszym dzieciom nie dawać wiele legumin, a zwłaszcza cukrów.

Drugim ważnym czynnikiem są kąpiele, jeżeli nieżyt oskrzeli nie przeszkadza.

Daje się w połączeniu ze sódem ($\frac{1}{2}$ litra) i solą ($\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ do 1 funta na 20 litrów) z dodatkiem ziół aromatycznych, w razie anaemii sole żelaziste, kąpiele (26^o R.) z soli borowinowej (Mattoniego), na tydzień 2—3 razy, nigdy na noc.

Regulować objawy niestrawności, jużto dodatkiem kwasów lub alkali. Nieżyt oskrzeli leczyć naparem Ipecac, Senegae, Liquor ammonii anis.

Kurczowi głośni energicznie zapobiegać, (zob. Laryngospasmus). Skrzywienia kończyn wymagają leczenia gimnastycznego, ortopedycznego, szyn, gorsetów itp. — U małych dzieci najlepiej rozpocząć leczenie żelazem.

872. *Aqu. pyrophosphatis ferri et sodae.*

3 r. dziennie łyżeczkę, dalej:

873. *Trae ferri chlorati*

5—10·00.

3 razy dziennie po 5 kropli we wodzie.

874. *Ferri pyrophosphor.* 0·05,
—0·10,

Sacchari lactis 0·20,

Mfp. dtur. tal. dos. N. 15.

S. 2 pr. dziennie.

875. *Calcii phosphor. pulv.*

30·00.

Parę razy dziennie na koniec noża do pokarmów.

876. *Calcar. phosphor.* 30·00,

Ferri lactici 2·00,

Sacch. lactis 30·00.

Mfp. S. 3 razy dz. na koniec noża.

877. *Bismut subnitrici*

Carbonat calcar. āā. 1·50,

Mfp. div. in dos. N. 10.

S. Co 4 godziny proszek (w razie uporczywego nieżytu przewodu pokarmowego).

878. *Ol. jecor aselli* 2·00—4·00,

Mucilag. gum. arab.

Aqu. dest. q. s. f. l. a.

Mixt. oleosa col. 80·00,

Syrup simpl. 10·00.

DS. 3 razy dz. łyżkę.

879. *Ol. jecor aselli* 150·00,

Limaturae ferri 20·00,

stent in macerat per 24 horas, deinde decant.

DS. Rano łyżeczkę.

880. *Phosphori* 0·01,

Ol. amygdal. dulc. 30·00,

Gum. arab.

Sacchari āā. 15·00,

Aqu. dest. 40·00.

DS. Jedną łyżeczkę na dzień.

881. *Phosphori* 0·01,

ol. jecor aselli 100·00.

DS. 1—2 łyżeczek dziennie.

882. *Phosphori* 0·01,

Lipani 30·00,

Pulv. gi. ar.

Sacchar. āā. 15·00,

Aqu. dest. 40·00.

DS. 1—2 łyżeczek dziennie.

883. *Phosphori* 0·06,
Alcohol. 20·00,
Spir. menth. 0·50,
Glycerin. 60·00.

DS. 3 razy dziennie po 6 kropli. — (Co tydzień o kroplę więcej aż do 10).

Dzieciom z nieżytem kiszek stanowczo fosforu nie podawać.

884. *Butyri recent.* 200·00,
Kali jodati 0·15,
Kali bromati 0·50,
Natri chlorati 5·00,
Phosphori 0·01.

Tę ilość użyć w ciągu 3 dni, kilka razy dziennie podając na chlebie.

Ranula.

Przeprowadzić nitkę jedwabną przez torebkę. Wycięcie przedniej ściany torbiela i przyżeganie lapisem. (Drugiej metody unikać u małych dzieci — gdyż przez to nie mogą ssać).

Rheumatismus articulorum acutus.

Chory bezwarunkowo ma tak długo pozostać w łóżku, dopóki gorączka nie minie, obrzęki się nie zmniejszą i bóle nie ustąpią.

Ze środków najprędzej działających polecają: Antipyrinę, z Natr. salicylicum po 0·50, dziennie takich proszków 4—6. Jeżeli obawiamy się zapadu po silnych dawkach antipyriny, to lepiej dodać do każdego proszka 0·15 Coffeini natrosalicylici.

Dalej stosować można samo Natr. salicyl. 5·0—6·0 pro die, Acid. salicyl. 4·0—5·0 pro die, Phenacetin po 0·50, 4—5 proszków dziennie — Antifebrin do 0·25—0·50, 3—4 proszki na dzień, Salol 1·0, 5—6 proszków na dzień, Betol 0·3—0·5, 3—4 razy na dzień.

885. *Salipyrin* 0·50.
 Kilka razy dziennie proszek.

886. *Asaproli* 4·00,
Aq. foenicul.
Syr. simpl. āā. 30·00.
 DS. Co 2—3 godz. łyżeczkę.

887. *Salopheni* 1·00,
Dt. tal. dos. X.
 S. 3—4 pr. dziennie.

Euphorin po 0·40.
 Kilka razy dziennie.

Phenocollum hydrochl. 1—
 1·50 pro die.

Methacetin 0·10—0·30 pro dosi.
 Kilka razy dziennie.

Nadto okłady lodowe na bolesne stawy, lub ciepłe okłady. Pędzlowanie jodyną i zawijania w watę. Smarowanie stawów mieszaną chloroformową lub ichtyolem.

Nadto leczenie wszelkich powikłań w odpowiedni sposób, zwłaszcza zapaleń wsierdzia, płucnej i t. p.

Jeżeli jest okres przewlekły, to obok środków wyżej wymienionych i kali jodatum 2—3·0 pro die, polecić ciepłe kąpiele, kąpiele ze soli borowinowej (Mattoniego), pędzlowanie jodyną, massage stawów maścią jodową, ruchy bierne lub wystać chorego do czeskich Cieplic, Trenczyna, Piszczan, Swoszowic, Krzeszowic, Truskawca, Buska i t. d.

888. *Ichtyoli* 10·00,
Ungu. parafin. 90·00.
 Mf. ungu. DS. Maść.

889. *Ichtyoli* 5·00,
Ungu. emolient. 50·00.
 Mfungu. S. Weieranie.

890. *Ammon. sulfoichtyol*
Spir. aether. āā. 10·00,
Collodii 20·00.
 DS. Do pędzlowania stawów.

- 891.** *Trae Colchici* 10·00,
 „ *Aconit.* 3·00,
 „ *Opii* 2·00.
 DS. 3—4 r. po 15—20 kropli.

- 892.** *Exalgin* 2·50,
Alcohol menth. 15·00,
Aqu. dest. 190·00,
Syrup simpl. 30·00.
 S. Co godzinę łyżkę.
 (Jedna łyżka 0·20 *Exalg.* 0·80
 pro die).

- 893.** *Diaphtherini* 0·50,
Spir. vini
Cognaci
Aq. naphae
Syrup simpl. āā. 20·00.
 MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.
 (Dla dzieci).

- 894.** *Natri jodat.* 6·00,
Sol. Fowleri 5·00,
Natri bicarb. 15·00,
Kali bicarb. 30·00,
Det. Sarsaparill comp. 600·00.
 S. Po obiedzie łyżkę użyć.
 (Według Whibla w formach
 chronicznych).

Rheumatismus musculorum.

Na wewnątrz można podać
 mierne dawki *Natr. salicylicum*,
Antipyriny, *Phenacetyny* a obok
 tego działać miejscowo przez
 wcieranie maści kojących, mię-
 szanki chloroformowej. Kąpiele
 ciepłe, zawijania w koce, łaźnia
 parowa, massage, prąd elektry-
 czny, kąpiele siarczane, Cieplice
 w Czechach, na Węgrzech
 i t. p. miejscowościach.

- 895.** *Chloroformii*
Glycerini āā. 50·00.
 DS. Wcieranie.
- 896.** *Trae Bellad.* 1·50,
Bals. vitae Hoffman. 80·00,
Chloroformii 20·00.
 DS. Do wcierania.
- 897.** *Veratrin* 0·30,
Chloroform 15·00,
Mixt. oleos. balsam. 80·00.
 DS. Do wcierania.

- 898.** *Spir. sapon* 30·00,
Trae opii 2·00.
 DS. Do wcierania.

Sarcomphalus.

Przyżęgać codziennie lapisem
 i zasypywać pudrem salicylowym
 (0·25:50·0). Większe narośle pod-
 wiązać jedwabiem lub Catgu-
 tem.

Scabies.

Po kąpieli i wymyciu szarem
 mydłem, wcierać przez parę wie-
 czorów jedną z podanych maści.
 Głównie nasmarować grzbiet rąk
 i nóg i miejsca, gdzie najczęściej
 lubią się gnieździć świerzby, na
 3-ci dzień kąpiel.

- 899.** *Flor. sulphur.*
Ol. Fagi āā. 20·00,
Sapon. virid.
Axungiae āā. 40·00,
Cretae albae pulv. 5·00.
 Mf. ungu. S. Do nacierania.

- 900.** *Naphtoli* 15·00,
Ungu. simpl. 100·00,
Sapon. virid. 50·00,
Cretae albae 5·00.
 Mf. ungu. S. Do nacierania.

- 901.** *Styrac. liquid.* 5·00,
Petrolei 20·00,
Bals. peruv.
Flor. sulphur. āā. 2·50,
Spir. Sapo. Kalini 10·00.
 Mf. ungu. S. Do nacierania.

- 902.** *Ol. Lavandulae*
Ol. Caryophyllor āā. 1·50,
Kali carbon. 35·00,
Lactis sulphur. 100·00,
Axungiae v. Lanolin q. s. ut
f. unguentum.

- 903.** *Losophani* 10·00,
solve in
Ol. olivar 20·00,
adde
Lanolin (Adipis) q. s. 100·00.
 MDS. Do wcierania.

Dla dzieci:

904. *Bals. peruv.*
Sulphur depur. āā. 5'00,
Vaselinæ 50'00.
 Mf. ungu. S. Do nacierań.

905. *Styrac. liquid.*
Ol. olivarium āā. 50'00.
 MDS. Do nacierań.

906. *Naphtholi* 4'00,
Sapo Kalin 25'00,
Axungiae 50'00,
Cretæ albae 5'00.
 Mfu. S. Do nacierań.

907. *Creolini* 2'50,
Vaselin 50'00.
 Mfung. S. Maść.

Również skuteczne natarcie czystym balsamem peruwiańskim. Suknie i bielizna muszą być wyparzone.

W praktyce nbogich używa się *Solutio Vlemineckx*, natarcie dwukrotne.

Scarlatina.

Ścisłe odłączenie chorych, aż do zupełnego złuszczenia t. j. 5—6 tygodni, poczem należy mieszkanie odwieźć, okna, podłogi wymyć 5% kw. karbowym. Dzieci szkolne w mieszkaniu będące, do szkoły nie poyślać.

Pokój troskliwie przewietrzać, ciepłota 13—14° R. wystarcza, bieliznę można często zmieniać.

Za pożywienie: mleko, rosół, po ustąpieniu gorączki dyeta pożywniejsza, lecz nie zaraz mięsna. Za napój podawać można czysta wodę, kwaski.

Plukanie gardła częste 2% kw. borowym, 2% kali chloricum. W razie silnej gorączki zimne okłady na głowę, chinina, antypyrina (ostrożnie), *Natr. salicyl.*

Na obrzęki gruczołów okłady z *liquor afumini acet.*, wcierniania szarej maści. Skoro tylko wystąpi chęłbotanie, przecinać.

W razie znacznego świadu:

908. *Lanolin anhydric.* 50'00,
Vaselin. americ. 20'00,
Aqu. dest. 25'00.
M. terendo f. ung.
 S. Do nacierań.

Drgawki, majaczenia uspakać okładami z lodu; lewatywami z chloralu (0'50:50'0).

Wśród objawów zapadu, osłabienia serca, Cognac, mocne wino, czarna kawa, kamfora.

Powikłania z błonicą (dyfte-rya), wysiękiem w opłucnej, błony brzusznej, zapaleniem stawów, chorobami ucha, rakiem wodnym, zapaleniem nerek — zob. odpowiednie rozdziały.

909. *Chinini muriat.* 0'30,
Dtur. tal. dos. 10.
 S. Rano i wieczór proszek.

910. *Antipyrin* 0'25,
Dtur. tal. dos. N. X.
 S. Co 4 godz. proszek.

911. *Natr. salicyl.* 0'30,
Dtur. tal. dos. N. X.
 S. Co 3 godz. proszek.

912. *Natr. salicyl.* 5'00,
Aqu. dest. 100'00,
Syrup rubid. 20'00.
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

913. *Liquor ammon. anis.*
Aether. sulphur. āā. 5'00.
 MDS. Co 2 godz. po 10 kropli w czarnej kawie.

914. *Camphoræ* 0'50,
Spir. vini
Aqu. dest. āā. 5'00.
 MDS. Do podskórnych wstrzykiwań.

915. *Acidi benzoici* 0'20,
Sacchari 2'00.
Mfp. div. in dos. N. X.
 S. Co 2 godz. proszek.

Od początku szkarlatyny należy mocz codziennie badać. Od pierwszej chwili zapalenia nerek podawać dużo mleka.

Przy zaparciu stolca 2—3 dawek Calomelu; w razie bólu w okolicy nerek, postawić 6—10 suchych baniek. Dopóki w osadzie z moczu znajduje się wiele ciałek krwi i wałeczków, nie dawać leków moczopędnych, lecz ściągające.

916. *Acidi tannici* 0·50,
Chinin. sulphur. 1·00,
Sacchari 2·00,
Mfp. div. in dos. N. 6.
S. 3 proszki dziennie.

917. *Chinini tannici* 4·00,
Div. in dos. N. X.
S. 3 razy dziennie proszek.

918. *Solut. acid. tannici*
2·00 ad 100·00,
Solut. natri bicarb. q. s. ad
react. alcal.
Syrup rubid. 20·00.
MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

W razie silnego krwawienia:

919. *Liquor ferri sesquichl.*
gtts. X.
Aq. cinamom.
Syrup simpl. āā. 50·00.
S. Co godz. łyżeczkę.

Jeżeli się pojawia znaczna puchlina, lub ucisk na płuca, podawać wcześniej leki moczopędne a przy towarzyszącej anemii żelazo n. p. Tra. ferri pot. 3 r. dzien. po 15 kropli.

920. *Infus. fol. digital.*
e 0·20 ad 100·00,
Liquor Kali acet. gtts. XX.
Syrup simpl. 15·00.
MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.

921. *Deti equiset. e* 3·00 ad
100·00,
Liquor Kali acet. gtts. XX.
Syrup simpl. 15·00.
MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.

Można też używać w razie dłużej trwającej puchliny, kąpiele na 29° R., 5—10 minut i zawiązania w koce na 2—3 godziny; przeciwskazanie stanowi tylko

stan zapalny płuc lub osłabienie serca, w kąpiele dawać zimne okłady na głowę.

Uraemia: zob. pod tytuł. Nephritis i Uraemia.

Sclerosis (wrzód twardy p. Syphilis).

Scorbutus.

Dobre powietrze i dobre pożywienie, podawać dużo zielonej jarzyny (sałata, szpinak itp.) owoce, lemoniada z cytryn. Mleko w dużych ilościach. Wino, piwo. Letnie kąpiele. Płukanie ust roztworami lekko ściągającymi (kali chloricum, acidum boricum). Pędzlowanie: Tra. Myrrhae, Tra. ratanh. Nacieki krwawe smarować oliwą z chloroformem. W ciężkich przypadkach leki pobudzające, kamfora, eter, wino często podawać.

922. *Det. cort. chinæ e* 10·00
ad 150·00,
Acidi sulphur. dil. 2·00,
Syrup rubid. 20·00.
MDS. Co godz. łyżkę.

W razie krwotoków:

923. *Liquor ferri sesquichl.* 2·00,
Aq. cinamom. 200·00,
Syrup Sacchari 20·00.
MDS. Co 2 godziny łyżkę.

Dzieciom:

924. *Liquor ferri sesquichl.*
gtts. X.

Trae opii gtts 1—5,
Aqu. dest. 100·00,
Syrup simpl. 20·00.
MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.

Leczenie następowe wymaga dłuższego podawania: żelaza, przetworów chinowych, dobrego żywienia i kąpiele.

Scrophulosis.

Dzieciom małym przy piersi, jeżeli się pokażą gruczoły po-

większone, zacząć dodawać osolone rosoly. Starsze dzieci żywić mięsem, mlekiem, kawą żółtą, dać nieco wina czerwonego, owoce, jarzyny łżejsze. Suche mieszkanie przewietrzane. Kąpiele, zmywania wodą są koniecznemi.

Dzieci tłuste powinny dostawać pożywienie chude, łatwo strawne, mleko, mięso, ekstrakt mięsny, używać dużo ruchu.

Dzieci blade, chude, mogą używać więcej tłuszczów, tutaj więc podać tran, najlepiej w porze jesiennej i zimowej. Lepiej odżywionym tran z dodatkiem Trae. jodi. Zaprzestać jednak tranu przy braku apetytu, biegunce, gorączce. Tran dawać w godzinę po jedzeniu $\frac{1}{2}$ —1 łyżki, małym dzieciom w emulsyi, po 3 tygodniach zrobić przestanek kilkudniowy.

Jeżeli dzieci nie znoszą tranu lub są przeciwwskazania, podawać przetwory jodu z żelazem, herbatę z liści orzecha, masło jodo-bromowe (zob. rachitis), ekstrakt słodowy (1—2 łyżeczek 2 razy dziennie).

W lecie pobyt na świeżem powietrzu, wody mineralne jodo-bromowe lub słone — (Iwonicz, Rabka, Rymanów) tak do kąpiele, jak i do picia.

Kąpiele ze soli z dodatkiem soli iwoniczkiej, rabezańskiej, soli borowinowej Mattoniego (po $\frac{1}{2}$ —1—2 funtów), kąpiel na 27° R. przez 15—20 minut.

W obrzmiałe gruczoły wetrzeć na wieczór łyżeczkę mydła szarego (Sapo kalin) i zmyć rano i tak przez szereg dni dopóki nie będzie większej bolesności.

Choroby towarzyszące jak: Conjunctivitis, Keratitis, Otitis, i t. p. obok ogólnego leczenia leczyć miejscowo (zob. pod odpowiedniami rozdziałami).

925. *Ol. jecor. aselli* 10'00,

Mucil. gum. ar. q. s.

Aqu. dest. 60'00,

Syrup Melissae 10'00.

MDS. 3 razy dzien. łyżeczkę.

926. *Syrup ferri jodati* 20'00,

Syrup sacchari 40'00.

MDS. 3 razy dzien. łyżeczkę.

927. *Kali arsenicos solut.*

Aqu. cinamom. āā. 10'00.

MDS. 3 razy dziennie po 3—6 kropli.

928. *Ferri jodati sacchar.* 0'50,

Sacchari 5'00,

Mfp. div. in dos. N. XX.

S. 3 proszki dziennie.

929. *Trae jodi gtts.* X.

Kali jodati 1'00,

Aq. menth. pip.

Glycerin. āā. 50'00.

MDS. 3 razy dzien. łyżeczkę.

930. *Ol. jecor. aselli*

Aq. Calcar. āā. 100'00,

Mf. linim. adde

Trae chinae comp. 20'00,

„ *Rhei vin.* 15'00,

„ *Calami* 5'00.

MDS. 2—3 razy dziennie łyżeczkę do 1 łyżki.

Prof. Sommerbrodt radzi dawać wytrwale kreozot od paru kropli dziennie do 1 grama w winie lub kapsułkach, zaraz po jedzeniu.

931. *Creosoti* 1'00,

Ol. jecor. aselli 150'00.

DS. łyżeczkę na godzinę przed jedzeniem.

932. *Creosoti* 1'00,

Tinct. gentian 2'00,

Spiritus 25'00,

Vini Xerens. q. s. ad 100'00.

DS. 2—3 łyżeczek dziennie do $\frac{1}{2}$ szklanki wody.

Seborrhoea.

Rozmniekzenie strupów oliwą, tranem i następnie zmywania mydłem szarem.

Seborrhoea capilitii zob. Alopecia e seborrhoea.

Seborrhoea glandis penis.

Zmywanie wodą borową 2%
i zakładanie waty z maszczami
ściągającymi.

933. *Zinci oxydati* 0·25,
Ungu. simpl. 20·00.

Mf. ungu. DS. Maść.

Obok leczenia miejscowego,
leczenie środkami wewnętrznymi
istniejącej anaemii, dyspep-
syi, żółtów, a więc tran, wody
żelaziste, Roncegno 2—4 łyżek
dziennie) rheum, wody alkali-
czne.

Singultus.

Uwzględnić powody:

Anaemia, hysterya, choroby
przewodu pokarmowego. Zimne
lub gorące okłady, synapizmy
na okolicę żołądka, elektryzo-
wanie nerv. phrenici. Jako po-
jedyńczy środek może służyć:
Wetknąć palce do uszów i sil-
nie przyciskać, równocześnie po-
dawana wodę powoli przełykać.

Również z dobrym skutkiem
polecają: wstrzymać oddech po
głębokim wdechu, uciskanie n. n.
phrenicus i vagus, sonda żołąd-
kowa, nadto bromowe przetwory
w dużych dawkach.

934. *Trae Valerian. aether.*
Trae nuc. vomicae āā. 5·00.
MDS. Po 10 kropli na cukrze.

935. *Chloral hydratis* 2·00,
Aqu. dest. 50·00,
Mucilag. gum. arab.
Syrup aurant. āā. 20·00.
MDS. Co godzinę łyżkę.

936. *Pilocarpin mur.* 0·10,
Aq. dest. 10·00.
MDS. 2—4 r. dz. po 10 kropli.
(Przy hysteryi i w chronicz-
nych przypadkach, w ostrych,
nie używać).

937. *Codeini phosphorici* 0·03,
Aq. lauroc. 20·00.
MDS. Co godzinę po 10 kropli
(dla dziecka od 2—5 lat).

938. *Strychn. sulph.* 0·03,
Syrup menth. 30·00,
Aq. foenicul. 150·00.
DS. Co 2 godz. łyżkę.

Soor.

Czyste utrzymanie ust, prze-
mywać po pokarmach, dobre po-
kojowe powietrze.

Po usunięciu mechanicznem
grzybków (miękkim płótnem
zwilżonem w zimnej wodzie)
pędzlować:

939. *Kali hypermang.* 0·12,
Aqu. dest. 15·00.
MDS. Do pędzlowania.

940. *Saccharini* 1·00,
Spir. vini 50·00.
DS. Łyzeczkę rozpuścić w 1/2
szklanki wody i 5 r. dzien-
nie pędzlować.

941. *Resorcin.* 0·50,
Aqu. dest. 90·00,
Syrup 10·00.
MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.
(Dla dziecka od 1—2 lat).

Do przemywania ust: Borax
(1·50:100·0 Aq. destil.) kali chlo-
ricum, Bicarb. sodae (0·50:150·0).

Spasmus glottidis.

U dorosłych tylko jako objaw
hysteryi, wówczas skrapianie
twarzy zimną wodą.

942. *Chloral hydratis* 4·00,
Natr. bromati 2·00,
Aqu. dest. 100·00,
Syrup rubid.
Mucilag. gum. arab. āā. 20·00.
MDS. Co 2 godziny łyżkę.

U dzieci:

W chwilach napadu włożywszy
palec do ust dziecka, dotknąć
nagłośni, przez co wzbudza się
wymioty, poczem następuje gę-

boki wdech. Kurt radzi chorą-giewkę pióra zmaczaną w mięs-zaninie chininy z cukrem wpro-wadzić do nosa.

Tryskać zimną wodą na twarz. Dziecko trzymać na rękach, zrzu-ciwszy wszystkie ubrania. Po napadzie unikać podrażnienia dziecka, chronić przed silnem światłem i łoskotem. Jeżeli się napady powtarzają co parę go-dzin, lewatywę z rumianku sa-mego, lub z dodatkiem Asa foe-tida (0'50, jako emulsia z żółt-kiem).

Uwzględnić powody: zaburze-nia w trawieniu, nieżyt krtani, początek chorób zakaźnych, gło-wnie zaś krzywicę (zob.).

943. *Chloral hydratis* 1'00,

Natr. bromati 2'00,

Aqu. dest. 60'00,

Syrup rubid.

Mucil. gum. ar. āā. 15'00.

MDS. Co 3 godziny łyżeczkę.

944. *Ammon. bromati* 1'00,

Urethani 1'00,

Aqu. dest. 80'00,

Syrup simpl. 20'00.

MDS. Co godzinę łyżeczkę.

945. *Infus. Valerianae*

e 10'00 *ad* 100'00,

Trae asae foetid. 2'00,

Vitell. ovi unius.

MDS. Na 2 lewatywy.

946. *Antipyrin* 0'12,

Dtur. tal. dos. N. 6.

S. Co godzinę proszek.

Spermatorrhoea.

Leczenie przyczynowe przy istnieniu kamieni pęcherzowych lub chorób kiszek oddechowej. Leczenie rzerzączki, unikanie wzruszeń płciowych, nadmiernej pracy umysłowej i fizycznej. Ka-piele morskie lub rzeczne, le-czenie hydropatyczne.

Pożywienie strawne, nie uży-wać napojów wysokowych, ka-wy, herbaty. Wieczera powin-

na być wcześniej spożywana i nie obfita. Poślanie łóżka twar-de, przykrycie lekkie, leżenie nie na wznak, lecz na bok.

W anaemii żelazo, chinina.

Przy neurasthenii — *Natrum bromatum* 3—40 pro die czasem dobrze działa.

947. *Extr. secalis corn.* 1'00,

Sacchari albi 3'00,

Mfp. Div. in dos. N. X.

DS. 3 proszki dziennie.

Miejscowo: Wprowadzenie gru-bych sond metalowych lub uży-wanie psychroforu.

Spina bifida. Tarń dwudzielną.

Chronić od urazów, założywszy opatrunek ochronny, zdarza się bowiem dobrowolne wyleczenie.

Nakłócie worka i wstrzyknię-cie jodu lub wyłuszczenie worka.

Stenocardia.

Leczenie samego napadu po-lega na wygodnem ułożeniu cho-rego w jasnym niedusznym po-koju, usunięcie uciskającego u-brania — podać choremu trochę czarnej kawy, łyżkę wina lub cognacu.

Podskórnice wstrzyknąć morfi-nę lub wziewać trochę chloro-formu.

Na okolicę serca synapizma, okład gorący, rozcierać kończy-ny, dać lewatywę z soli. Można też wziewać kilka kropli Amyl-nitritu lub Pyridin.

Polecają też na wewnątrz wśród napadu: Nitroglicerynę z roztworu 0'01 na 10'0 z tego 10—20 kropli na raz, lub pastyl-ki nitroglicerynowe po 0'001 wy-robu Mutniańskiego i innych.

Następnie leczyć chorobę przy-czynową, najczęściej więc: wady serca, choroby nerwowe i za-trucia przewlekłe tytoniem, ka-wą i herbatą.

- 948.** *Exalgin* 2·50,
Alcohol menth. 15·00,
Aqu. dest. 190·00,
Syrup 30·00.
 DS. Co 2 godz. łyżkę.

Stomatitis aphthosa vide Aphthae.

Stomatitis catarrhalis.

Czyste utrzymywanie jamy ustnej, wymywanie ust chłodną wodą. Pędzlowanie: 2% kwasem borowym, 1% roztworem kali chloric. Dzieciom starszym zimne pokarmy, mleko z lodu. Wyrwać psujące się zęby, które są częstym powodem St.

- 949.** *Boracis* 5·00,
Mel. rosat. 20·00,
Aq. rosar. 10·00.
 MDS. Do pędzlowania.

Stomatitis ulcerosa. Stomacace.

Pędzlowanie pojedynczych owrzodzeń roztworem kali hypermang (0·12: 25·0) 5—6 razy dzień.

- 950.** *Acidi borici* 1·00,
Kali chlorici 0·75,
Succi citri 15·00,
Glycerini 10·00.
 DS. Do pędzlowań.
 Wewnętrznie: kali chloricum (1·0—3·0 na 120·0 Aquae, pr. die).

- 951.** *Decoct. cort. chinæ*
 e 5·00 ad 100·00,
Kali chlorici 2·00,
Syrup simpl. 20·00.
 MDS. Co godzinę łyżeczkę.
 W razie krwawienia:

- 952.** *Liquor ferri sesquichl.*
Aq. dest. āā. 15·00.
 MDS. Do pędzlowań.

Stomatitis mercurialis.

Zaprzestać używania przetworów rtęci. Płukanie 2% roztworem kali chloric., 3% kwasem

borowym, 2% kw. salicylowym, Sublimat 1:4000 do płukania.

Pędzlowanie owrzodzeń roztworem Tra jodi aa. cum Tra gallarum.

Struma.

Na wewnątrz podajemy mierne dawki jodu i wód jodowych lub gąbki morskiej zawierającej jod; na zewnątrz zaś stosujemy masę jodową.

Jeżeli leczenie to nie odnosi skutku, usuwamy cierpienie drogą operacyjną i to albo przez wstrzykiwania miąższowe (jodu i jodoformu) lub przez podwiązanie tętnic, wyłuszczenie, resekcję i t. p.

- 953.** *Kal. jodat.* 5·00—10·00,
Aqu. dest. 200·00.
 S. 3 łyżki dziennie.

- 954.** *Natr. jodat.* 5·00—10·00,
Aqu. dest. 200·00.
 S. 3 łyżki dziennie.

- 955.** *Kal. jodat.* 5·00,
Jodi puri 0·50,
Ungu. simpl. 50·00.
 Ml. ungu. S. Maść.

- 956.** *Kali jodati* 5·00,
Glycerin q. s. ad solut.
Sapon virid. 50·00.
 Mf. ungu. S. Maść.

- 957.** *Spongiae tostae* 5·00,
Div. in dos. N. X.
 S. Rano i wieczór proszek.

- 958.** *Trae jodi* 30·00.
 S. Do wstrzykiwań.

- 959.** *Jodoformii* 1·00,
Aether sulph. 5·00,
Ol. olivar. 9·00.
 S. Do wstrzykiwań.

- 960.** *Jodoformii* 1·00,
Aeth. sulph.
Ol. olivar. āā. 7·00.
 S. Do wstrzykiwań.

Sudamina, Miliaria. Potówka.

Unikać zbyt ciepłego ubierania dzieci w lecie. Posypywać pudrem lub:

961. *Amyl. oriz.*

Zinci oxydati āā. 10'00.

DS. Puder.

Sycosis.

Profilaktyka: Brzytwa i ręce golącego powinny być kw. karbolowym wymyte, którejto ostrożności golarze nie zachowują.

Gdy skóra naciekła, pokryta strupami, krostami i guzkami, należy włosy jaknajkrócej obciąć i na rozmięczenie strupów przykładać oliwę lub masę Hebry. Po zmyciu strupów zarost ogolić, włosy szczypczykami powyrywać nie tylko chore, lecz i przyległe zdrowe, skórę następnie 2 razy dnia mydłem szarą zmywać, a po zmyciu nacierać sublimatem 1—2:1000. Kromayer radzi w celu zapobieżenia ciągłej autoinfekcji odbywającej się przez przyskórek zmywanie 2 razy dziennie:

962. *Sublimati corr.* 1'00,

Spir. vini rectif. 90'00.

DS. Do zmywania.

W $\frac{1}{2}$ godziny po tem przykłada się znowu masę Hebry.

963. *Acidi tannici* 2'00,

Sulph. praecip. 4'00,

Zinci oxydati

Amyli tritici āā. 2'00,

Vaselin. flav. 20'00.

Mf. pasta. S. Masę.

Ropnie istniejące otworzyć. Leczenie to trwa tak długo, dopóki nacieki nie ustąpi i nowe krosty nie występują.

W niższych stopniach Sycosis, zarostu się nie goli, lecz wyrywa się włosy, wciera się sublimat, a potem masę z praecipit. album 1:20.

Syphilis universalis.

I. Kiła nabyta.

A. Kiła pierwotna.

Wycięcie zmiany pierwotnej, jeżeli usadowienie jej na to pozwala, z zabraniem jaknajobfitszym zdrowej tkanki (metoda ta ma zaletę szybkiego gojenia, a z nią nie tak łatwego przeniesienia choroby) lub wypalenie cum Kali caustico.

Gdy wycięcie zmiany pierwotnej nie nastąpiło:

a) Ekorkoryacja czysta polyskująca, obmywanie takowej roztworem sublimatu 1:1000 i następnie przykładanie raz dziennie emplastr. hydrargyri americanum supra linteum extens.

b) Wrzód lub ekorkoryacja z zagłębianiem w centrum szarą wypociną pokryte:

Zmywanie roztworem sublimatu 1:1000 i zasypywanie jodoformem lub jodolem, aristolem (bezwonny, lecz mniej skuteczny od jodoformu). Obecnie zalecają posypywanie c. hdrog. sozodjodolico. Gdy powierzchwnia wrzodu pod wpływem tych środków się oczyści, przykładają się empl. hydrargyri americanum.

c) Wrzód fagedeniczny lub dyfterytyczny: Obmywanie kwasem karbolowym 2% i zasypywanie jodoformem, na wewnątrz środki wzmacniające, unikać środków merkuryalnych.

Leczenie ogólne środkami merkurialnymi w okresie kiły pierwszorzędnej można rozpocząć:

1) Gdy pacjent jest zresztą zupełnie zdrow.

2) Gdy dyagnoza kiły pierwotnej jest zupełnie pewną.

3) Gdy zmiany pierwotnej nie wycięto.

4) Gdy zmiana pierwotna nie komplikuje się z fagedenizmem lub dyfterją.

Ilość rtęci wprowadzona do organizmu nie może być znaczną, najlepszym w tej mierze przetworem jest:

964. *Hydrargyri oxydulati tannici* 5'00,
Glycerini puri 1'50,
Extr. et pulv. Liquir aa. 4'00,
Mfpil. N. 100.
 DS. 3—6 pigulek dziennie.

965. *Hydrargyri oxydulati tannici* 0'10,
Acidi tannici 0'05,
Extr. opii aquosi 0'005,
Sacchari albi 0'20,
Mfp. Dtur. tal. dos. N. XX.
 DS. 2 proszki dziennie.

Preparat ten używa się tak długo, dopóki stwardnienie zmiany pierwotnej nie ustąpi. Inne przetwory w tym celu używane na wewnątrz są: Sublimat 0'01 pro die, protojoduretum hydrargiri 0'20 pro die.

Dytetyka przy używaniu rtęci czy to na wewnątrz, czy przez wcierania lub iniekcye:

Chory nie powinien się narażać na zaziębienie, nie przeciążać się pracą ani fizyczną ani umysłową, nie palić tytoniu, prowadzić życie spokojne, dobrze się odżywiać i wysypiać. Mieszkanie powinno być nawet w zimie wietrzone. Pokarmów kwaśnych i trudnostrawnych należy unikać. Stolec powinien być raz dziennie. Jama ust i zęby powinny być jaknajczyszej utrzymywane.

Do płukania daje się:

966. *Kali chlorici* 10'00,
Aqu. dest. 500'00.
 MDS. W ciągu doby wypłukać.

967. *Kali chlorici* 40'00,
Aluminis crudi 20'00,
Acid. borici 6'00.
 DS. Łyżeczkę od kawy, do szklanki wody do płukania.

Kalendarz lekarski. 1894.

Jako proszek do zębów zapisuje się:

968. *Calcariae carbon.* 30'00,
Camphorae rasae subtilissime pulver. 3'00.
 MS. Proszek do zębów.

969. *Calcar carbon. praecip. dep. Lapid. pumici sbt. pulver. Kali chlorici Cort. chinae rubr. pulver. aa.* 16'00,
Pulv. rad. Ratanh. 10'00,
Sapon. medic. 23'00,
Ol. menth. pip. 3'00.
M. s. p. subl. terendo.
 S. Pasta do zębów.

Do pędzlowania dziąseł po wymyciu jamy ust używa się:

970. *Trae Ratanhae Trae Myrrhae aa.* 25'00.
 DS. Pędzlowanie.

Intoksykacja rtęcią objawia się jako: 1) *Enteritis*. W tym razie należy natychmiast przestać używać podawanego dotąd preparatu rtęciowego, podać łyżkę olejku rycynowego a następnego dnia laudanum 3 razy dzień. po 0'02, dopóki biegunka nie ustąpi.

2) *Stomatitis mercurialis* 1-szy stopień (dziąsła obrzękłe, rozpulchnione, odstają nieco od zębów, broczą przy dotknięciu, sprawiają ból przy żuciu). W tym stopniu nie potrzeba usuwać preparatów rtęciowych i przestrzegać tylko pilnego płukania ust).

2-gi stopień (obok powyższych objawów: obrzęk języka, ślinotok, smak metalowy w ustach, cuchnienie z ust, chwieianie się zębów). Usunąć preparat rtęciowy, dokładne wietrzenie mieszkania, płukanie ust.

971. *Tannini puri* 5'00,
Aqu. dest. 400'00,
Spir. vini gallici 100'00.
 MDS. Płukanie.

Pędzlowanie działseł cum:

972. *Tra Ratanhae*
Gallarum āā. 25·00.
 MDS. 3 razy dz. pędzlować.

Celem usunięcia przykrej woni z ust.

973. *Chlorinae liquidae 10·00,*
Aqu. dest. 500·00,
Mellis rosati 50·00.
 MDS. Płukanie.

3-ci stopień (naciek na działsełach, policzku, języku, przechodzący w nekrozę i wrzody). Usunięcie natychmiastowe używanego dotąd preparatu rtęciowego, świeże powietrze, dobre odżywianie.

Do płukania:

974. *Camphorae rasae subtil.*
pulv. 3·00,
Emuls. amygdal 300·00.
 MDS. Płukanie.

Jakoteż płukanie działseł powyższym roztworem taniiny. Największą ulgę jednak sprawia obok płukania przyżeganie owrzodzeń azotanem srebrnym w roztworze (1:2) lub in substantia.

3) *Roseola* lub *erythema* czasem z wysoką gorączką (40°) połączone. Zaniechać leczenia rtęciowego, środki przeczyszczające, puder.

4) *Białkomocz* z wałeczkami po wstrzymaniu leczenia zazwyczaj szybko ustępuje.

Jeżeli się rtęci w kile pierwoszorzędnej nie podaje, należy przed wystąpieniem kiły wtórorszorzędnej przygotować pacjenta do następnego leczenia, usunąć anaemię: podając żelazo z arsenikiem, przygotować jamę ust do leczenia przyszłego rtęciowego, a więc zęby karyetyczne wyrwać lub zapłombować, odwyzczać od palenia tytoniu.

Przetworów jodu używa się w kile pierwotnej tylko wtedy,

gdy gruczoły limfatyczne są zbyt powiększone, jak się to zdarza u ludzi skrofalicznych.

B. Kiła drugorzędna.

Leczenie rtęcią wskazane w przypadkach kiły plamistej, guzkowej i łuskowej. W wysypkach chrostkowych tylko wtedy stosuje się leczenie rtęcią, gdy takowa jest wynikiem złośliwego jad, a nie słabej konstytucji, w tym ostatnim przypadku należy najprzód ogólne odżywienie poprawić.

Metody leczenia:

1) Środki wewnętrzne p. kiły pierwotna.

2) Iniekcye podskórne, do których wskazania następujące: łagodna forma kiły wtórorszorzędnej, lub gdy pacjent ze względów towarzyskich, wciezań robić nie może, lub w porze zimowej, w czasie wciezań, w domu pozostawać nie może.

Najpewniejszym środkiem jest Sublimat.

975. *Sublimati corrosiv 0·10,*
Natr. chlorati 1·00,
Aqu. dest. 10·00.
 MDS. Iniekcye.

Z roztworu powyższego wstrzykuje się codziennie jedną strzykawkę Pravaza, zwykłą i najmniejszą ilość iniekcji w liczbie dwudziestu.

3) Wcierania szarej maści.

Wskazania:

a) W przypadkach, w których podawanie przetworów rtęci na wewnątrz dla słabego przewodu pokarmowego są przeciwwskazane, a iniekcye sublimatowe dla neurastenii nie mogą być robione.

b) W przypadkach ciężkiego przebiegu kiły niebędącego następstwem słabej konstytucji.

c) W przypadkach odnawiającej się kiły drugorzędnej, jeżeli takowa występuje w formie cięższej od 1-go wybuchu.

d) U ciężarnych i dotkniętych gruźlicą płuc.

e) Gdy wystąpią zmiany w organach ważnych dla życia lub grożące oszpecceniem.

Do jednego wcierania używa się u dorosłych 3:00—4:00 szaruchy, u dzieci 1:00.

Sposób robienia wcierań:

Przed rozpoczęciem wcierań bierze chory kilkakrotnie kąpiel, zmywając ciało mydłem, w celu otworzenia ujść gruczołów potnych i łojowych. Przed wcieraniem korzystnym jest spocenie się chorego pod przykryciem, co nie powinno nastąpić po uskuteczniomem wcieraniu. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wcierania, osusza się z potu część ciała, w którą ma być wcieranie robione.

Przy wcieraniu nie należy całą ilość szaruchy mającej być wtartą na raz wetrzeć, lecz ubierać z niej po troszce (wielkości soczewicy) i zajmować jaknajwiększą powierzchnię skóry.

Wcieranie odbywa się tak długo, dopóki palec przeprowadzony po miejscu wcierania pozostawia smugę jaśniejszą (20—30 minut w jedną połowę ciała).

Miejsce wcierań:

Weierać po $\frac{3}{2}$ grm. szaruchy w jedną połowę:

- I. dzień obie łydki,
- II. „ oba uda,
- III. „ prawy bok klatki piersiowej i prawa połowa brzucha,
- IV. „ lewy bok klatki piersiowej etc.
- V. „ plecy (jeżeli nie sam pacjent robi wcierania).

Watraszewski podaje do wcierań mydło kalomelowe: Calomelanos vapore parati 1 część na 2 cz. mydła potasowego czystego, jako sapo calomelanos fortior, a w stosunku 1:3 jako Sapo calom. mitior. Do jednorazowego wcierania używa 2 grm. mydła kalomelowego. Wcieranie robi się ręką zwilżoną wodą, dopóki się całej ilości powstałej piany nie wetrze. Czas wcierań krótszy, bielizna się nie brudzi, skutek według W. bardzo dobry.

Bovero robi 5—7 wcierań co 5—8 dni mieszanią Calomelanos vapore parati 0:50—1:00, Lanolin 3:00, Butyri Cacao 1:00.

Wcierań używa się najmniej 20, najwięcej 50.

Prof. Rosner jest zdania, że najrzadziej występują zmiany 3-rzędne, jeżeli się mimo braku recydyw zastosuje po 6 miesiącach powtórne leczenie wcieraniami w lezbie 20, a po roku trzeci raz robi się 20 wcierań.

Jod używa się w kile 2-rzędnej:

1) Przy równoczesnem zakażeniu żółzowem.

2) Gdy po wyleczeniu zmian kiłowych 2-rzędnych na skórze, występują na błonach śluzowych, kłykciny sączące.

3) Gdy oprócz zmian na skórze i bł. śluzowych występują zmiany chorobowe w układzie kostnym. Najlepszym przetworem jodu jest:

976. *Natri jodati* 10:00,
Aqu. dest. 200:00.

MDS. 2 łyżki stołowe dziennie (w mleku) zażyć.

Przyjemny do użycia:

977. *Kali jodati* 25:00,
Anisette 150:00,
Syr. simpl. 350:00.

S. 2 łyżki dziennie. Łyżka zawiera 1:00 K. J.

978. *Natri iodati* 10·00,
Glycerini 1·00,
Extr. et pulv. Quassiae āā.
q. s. ut f. pil. N. centum.
 DS. Rano i wiecz. po 5 piguł.

979. *Jodoformii subt. pulver.*
 2·00,
Extr. Quassiae q. s. ut f.
pil. N. 20.
 DS. Rano i wiecz. jedną pig.

Uwagi ogólne leczenia kiły
 2-rzędnej:

Ilość wciekań, iniekcij, czas
 podawania rtęci lub jodu na we-
 wnątrz, określony jest ustąpie-
 niem wszelkich zmian chorobo-
 wych poszczególnego wybuchu,
 doświadczenie jednak uczy, że
 nader korzystnem jest dla grun-
 townego usunięcia zmian kiło-
 wych, leczenie o połowę prze-
 dłużyc n. p., jeżeli zmiany ma-
 kroskopowe ustąpiły przy 30
 wciekaniach szaruchy, zrobić ta-
 kowych jeszcze 15.

Kiła, jako choroba zakaźna
 chroniczna wymaga leczenia nie
 jednorazowego, lecz dłuższego,
 choćby nawet recydyw nie było.
 Jest rzeczą stwierdzoną, że lek-
 kie przypadki kiły nie leczone
 dokładnie sprowadzają ciężkie
 objawy kiły 3-ciorzędnej. Prof.
 Rosner jest zdania, że najrza-
 dziej występują zmiany 3-rzędne,
 jeżeli mimo braku recydyw za-
 stosuje się po 6 miesiącach w o-
 kresie 2-rzędnym kiły, powtórne
 leczenie wciekaniami szaruchy
 w liczbie 20, a po roku 3ci raz
 w tej samej liczbie.

Po przebytej każdorazowej ku-
 racyi rtęciowej należy podać na
 wewnątrz przetwory jodu (natr.
 jodat 5%) przez 3—4 tygodnie.

Leczenie zmian miejscowych
 w kile 2-rzędnej.

Kłykciny sączące stanowiące
 znaczne nacieki wystające, w
 stolcu i na częściach ródnych,

pędzluje się sublimatem 1:100,
 w jamie ust sublimatem 1:600
 lub kwasem chromowym 20%.
 Kłykciny z mniejszym nacie-
 kiem, płaskie, pozbawione przy-
 skórka, pędzluje się rozczy-
 nem azotanu srebrowego 1:30; skro-
 się pokryją przyskórką, usu-
 wa się resztę nacieku plastrem
 merkuryalnym, który się codzien-
 zmienia.

980. *Empl. hydrargyri*
Empl. saponati āā. 15·00,
Extende supra lintum.

Iritis syphilitica.

Obok leczenia ogólnego wy-
 maga także wczesnego zapusz-
 czania atropiny, by się synechie
 nie wytworzyły.

Psoriasis palmaris et plantaris:

Okłady wysychające w celu
 rozmiękczenia i usunięcia przy-
 skórka pokrywającego naciek—
 ten zaś ostani ustępuje pod pla-
 strem rtęciowym.

Chrostkowe nacieki skóry gło-
 wy i brody, po usunięciu stru-
 pów oliwą, naciera się maścią:

981. *Mercur. praecipit. albi*
 2·00,
Sublimati corrosivi 0·10,
Vasellini 20·00,
Olei rosarum gtt. tres.
 S. Pomada.

C. Kiła 3-rzędna.

Wskazania:

W formach lżejszych daje się
 jod, w cięższych rtęć, a nawet
 rtęć i jod. (Zmiany mózgowe,
 narządu wzrokowego, lub gro-
 żące zeszpeceniem np. choroby
 kości nosowych).

Leczenie miejscowe w kile
 3-ciorzędnej:

Ozaena syphilitica:

Przeplukiwanie nosa 2% kwa-
 sem borowym, słabym rozczy-

nem kali hypermanganicum (0·20: 500) i pędzlować rozczyznem:

982. *Jodi puri* 0·20,

Kali jodati 2·00,

Glycerini 20·00.

MDS. Zewnętrznie.

Sarcocoele syphilitica.

Plaster rtęciowy.

Periostitis.

Sprowadzająca silny ból wymaga pędzlowania jodem.

983. *Trae jodi*

„ *Belladonae*

„ *Gallarum* āā. 10·00.

MDS. Zewnętrznie.

Gdyby ten rozczyzn drażnił skórę, daje się wtedy do pędzlowania rozczyzn:

984. *Jodi puri* 0·20,

Kali jodati 5·00,

Glycerini puri 20·00.

MDS. Zewnętrznie.

Kilaki skórne.

Tak wrzodziejące jak nie wrzodziejące, ustępują pod plastrem rtęciowym. Przy kilakach nie wrzodziejących, często nawet wobec już istniejącej fluktuacji może nastąpić resorbeyca, wrzodziejące goją się także pod plastrem rtęciowym lub jodoformem.

Zdarzają się przypadki kiły, w których ani jod ani rtęć skutków nie wywierają, a to są wypadki ciężkiej złośliwej kiły u indywidualów kachektycznych, często przedtem energicznie rtęcią leczonych.

W tych razach w pierwszym rzędzie starać się musimy o poprawienie stanu ogólnego. Działanie to wzmacniające posiada Decoetum Zittmanni. Pod wpływem tego środka poprawia się apetyt, wygląd chorego i waga ciała się zwiększa.

Sposób podawania tego środka jest następujący:

Na czezo w łóżku wypija choroby 300 gramów Decoet. Zittmanni fortior., ciepłego, a tę samą ilość Decoet. Zittmanni mitior chłodnego, po południu.

Przy używaniu tego środka należy unikać wszelkich pokarmów mogących wywołać biegunkę.

U niektórych ludzi po wyleczeniu kiły środkami rtęciowymi rozwija się anaemia i uporczywie się utrzymuje. W przypadkach tych przepisuje się kąpiele parowe z tuszami, 2 razy na tydzień, lub wysyła się takich chorych do kąpiel siarczanych lub zakładu hydropatycznego (nigdy wobec jeszcze istniejących zmian kiłowych).

II. Kiła dziedziczna.

W pierwszych czterech tygodniach występującą kiłę, leczą się kąpielami sublimatowymi:

985. *Sublimati corross.*

Ammon. muriat. āā. 2·00,

Aqu. dest. 100·00.

MDS. Do jednej kąpeli.

Jeżeli dziecko ma 8 tygodni lub więcej, robi się weierania z szaruchy.

U dzieci 6-tygod. 0·30 pro dosi

„ „ 8 „ 0·40 „ „

„ „ 10 „ 0·50 „ „

„ „ 12 „ 1·0 „ „

Usta należy wymywać kwasem borowym 1‰.

Mniej pewnie działa według prof. Rosnera: Calomel na wewnętrzny podany.

986. *Calomel. laevigati* 0·15,

Sacchari lactis 4·00,

Mfp. Div. in dos. N. XII.

DS. Rano i wieczór jeden proszek w mleku podać.

Po 6 dniach robi się pauzę, i znów przez 6 dni podaje się Calomel, aż do ustąpienia zmian chorobowych.

Środek ten wywołuje często bardzo katar przewodu pokarmowego, czego wcięcia nie czynią.

W ostatnim czasie polecają:

987. *Hydrarg. thymol. acet.* 1.00,
Glycerin 10.00,
Cocain mur. 0.10.

S. Raz na tydzień wstrzyknięcie wśródmięśniowe, w ilości 10—12 strzykawk.

988. *Hydrarg. oxydulati nigr. pur.* 1.00,
Ol. olivarum 10.00.

S. Co 2-gi dzień strzykawkę (30—40 wstrzyknięć).

989. *Hydrarg. salicyl.* 1.00,
Paraffin. liquid. 10.00.

DS. Co 5 dni wstrzyknąć w pośladek.

990. *Hydrarg. salicyl.* 1.00,
Vasellini 30.00.

Mfu. S. Na wrzody syf.

991. *Hydrarg. salicyl.* 1.00,
Magnes carb. 20.00.

S. Puder.

Empl. hydrarg. oleinic.

Plastrem tym pokrywa się ko-
lejno: przedudzia, ramiona itp.
większe części na 8 dni, poczem
kąpiel i nowy plaster.

Syphilis congenita p. Syphilis.

Tabes dorsualis.

Jeżeli tabes na tle kiłowym,
to wciarki i kali jodat.

W innych przypadkach kąpie-
le letnie lub ciepłe, procedury
hydropatyczne, elektryzowanie
stosu pacierzowego prądem gal-
wanicznym, mniej polecane prą-
dem faradycznym. Pędzlowanie
stosu pacierzowego c. Tra jodi.

Na wewnątrz Arg. nitricum
0.01—0.02 w pigułkach, kali jo-
datum 10:200, Arsen po 0.001,
Ergotyna po 0.1—0.5 2—3 razy
dziennie, Fosfor po $\frac{1}{10}$ miligr.

do 1 miligr., w rozcżynach olei-
stych, mały dają rezultat dodatni.

Wieszanie chorego sposobem
Mocutkowskiego i Charcota ma-
łe korzyści przynosi, jednak cza-
sem ulgę sprawia.

Zresztą leczenie symptomaty-
czne, zwłaszcza kojenie bólu
środkami narkotycznymi, phe-
nacetina po 0.50 2—3 razy dzien.,
exalgina po 0.25 2—3 proszków
na dzień, antipyrina 1.0, 3—4 na
dzień, wstrzykiwania morfiny.

Chorych zamożniejszych wy-
słać do Nauheim, Teplitz, Wild-
bad, Ragaz, Pyrmont, Elster,
Gastein, Piszczany, Trenczyn.

992. *Liniment volatil* 30.00,
Chloroform 20.00.

MS. Do nacierań.

Taenia.

Leczenie poprzedzić środkiem
czyszczącym, zachować dyetę.
Polecają dnia poprzedniego po-
karmy słone: śledzie, szynkę,
sałatę, poziomki. Rano na czczo
można nieco osłodzonej czarnej
kawy. Po użyciu lekarstwa po-
winien chory spokojnie leżeć,
aby uniknąć wymiotów.

993. *Extr. filic. mar.*

Pulv. rad. filic. mar. āā. 10.00,
f. l. a. boli N. 10.

Consp. cynamom.

S. W przeciagu 2 godzin użyć.

994. *Ol. Crotonis gttam unam*
Chloroform 4.00,
Glycerin 30.00.

DS. Użyć na czczo.

995. *Extr. filic. mar. aether.*
8.00,

Calomelanos 0.80,

Div. in capsul. N. XVI.

S. Na czczo co 5 minut ka-
psułkę w łyżce wody osło-
dzonej.

Jeżeli po 2 godzinach po uży-
ciu ostatniej kapsułki tasiemiec
nie odchodzi, dać 8.00 Syrup

aetheris, a gdyby jeszcze po 2 godzinach dalszych nie odszedł podać 40'00 Ol. ricini w czarnej kawie.

996. *Flor. Koso* 30'00,

Kamala 15'00,

Extr. fil. mar. aeth. 4'00,

Mel. depur. q. s. f. boli

N. 60.

DS. Na wieczór 30, rano 10—20 sztuk użyć.

997. *Pelletierin tannic.* 1'00,

solve in

Infus. sennae 100'00.

DS. W małych dozach użyć w przeciagu $\frac{1}{2}$ godziny.

Najlepsza pora do leczenia tasiemca jest wówczas, gdy odchodzą większe kawałki. W czasie osłabienia, ciąży, karmienia, miesiączki, nie należy rozpoczynać leczenia.

Dzieciom przed ukończeniem 1 roku życia nie wolno spędzać tasiemca; również w czasie ząbkowania.

998. *Extr. filic. mar.* 2—5'00,

Mucilag. gum. ar. 10'00,

Syrup simpl. 15'00.

MDS. Na 2 razy użyć.

999. *Koussini* 0'50—1'00,

Extr. filic. mar. aet. 2—5'00,

Pulv. altheae q. s. f. pasta
div. in dos. N. 3.

DS. Co $\frac{1}{2}$ godziny doza.

1000. *Kamal.* 3'00,

Pulpae tamarind. 20'00,

Mf. elect.

DS. Rano w przeciagu $\frac{1}{2}$ godziny na 2 razy użyć.

1001. *Pelletierin tannici* 0'30,

Aqu. dest. 40'00,

Syrup rhei 10'00.

MDS. W przeciagu $\frac{1}{2}$ godziny na 2 razy użyć.

Po użyciu środków wymienionych należy dać w godzinę 20—30 gramów olejku rycyn. najlepiej w mocno osolonym rosolu.

Skuteczne też bywają nasiona dyni (*Semina cucurbitae maximae*) utarte z cukrem na emulsią (100 gramów), użyć w ciągu dnia, na 2 razy, po 3 godzinach po 2 dawce nieco ol. ric.

1002. *Naphthalin* 0'30,

Ol. ricini 15'00,

Ol. Bergamot gtts duas.

MDS. Na raz na czczo podać.

1003. *Strontium lactic.* 20'00,

Aq. dest. 120'00,

Glycerin q. s.

DS. W pięciu dniach biorąc co rano 2 łyżki, wyżyć.

Tetanus.

Usunięcie powodów: oczyszczenia ran i wrzodów, wydobycie ciał obcych, odszczepów kostnych.

Wstrzykiwania podskórne w pobliżu rany co 2 godz. 0'02 acid. carbol. Wstrzykiwać morfina w małych dawkach, chloroformowanie. Chloral w lewatywach lub wewnętrznie z Cognakiem.

1004. *Sulphonali* 1'00,

Dtur. tal. dos. N. 5.

S. 3 do 4 pr. dziennie (rozpuściwszy w 200 gramach herbaty lub rosolu).

1005. *Urethani* 1'00,

tal. dos. N. 6.

2 do 3 razy dziennie proszek we wodzie.

1006. *Pilocarpin hydrochlor.*

0'10,

Aqu. dest. 10'00.

MDS. Do wstrzykiwań (2—3 strzykawek dziennie).

Acid. salicyl. w dużych dawkach, kali bromatum 5—10 grm. dziennie.

W razie osłabienia serca, podskórne wstrzykiwanie eteru, kamfory.

1007. *Antipyrin 0·50,*

Dtur. tal. dos. N. X.

DS. Co 3 godziny proszek.

Tic douloureux zob. **Neuralgia trigemini.**

Tonsillitis.

Podeczas gorączki leżenie w łóżku, okłady wysychające na szyję, letnie napoje, płukanki c. kali chlorico. Wczesne naciecia, gdy się chęłbotanie okaże. W cięższych formach połykanie kawałków lodu, mniej płukać.

1008. *Saloli 0·50,*

Tal. dos. 15.

DS. Co 3 godz. proszek.

Trichinosis.

Środki przeczyszczające: infus Sennae, Calomel, Glycerina co godzina łyżkę. Benzyna w kapsułkach żelatynowych po 0·50 do 5 gramów dziennie.

Bóle mięśniowe łagodzić zastrzyknięciem morfiny, kąpiele ciepłe, wcierania chloroformu.

1009. *Benzin 6·00,*

Mucilag. gum. arab.

Solut. Succ. liquir. conc.

āā. 25·00,

Aqu. menth. crisp. 100·00.

MDS. Co 2 godziny łyżkę.

1010. *Benzoli 0·50,*

ad capsul. gelat. N. 50.

Rano na czczo i po południu po 5 kapsułek, w godzinę po każdym zażyciu łyżeczkę pulv. rad. rhei et pulvis liquir comp. aa. p. aequ. kuracya ma trwać kilka dni.

Trismus et Tetanus neonatorum.

Główną uwagę zwrócić na pępek, opatrunek przeciwnilny.

Chloral po 0·05 pro dosi, kilka razy dziennie, w mleku, wlać do nosa lub w lewatywie (w po-

dwójnej dawce), Sulfonal 0·20 p. dosi w lewatywie po każdym napadzie. Sole bromowe po 0·50 na dzień. Coniinum hydrobromicum (aż do 0·05 pro die). Ciepłe kąpiele 28° R. kilka razy dziennie. Karmić mlekiem, również przez nos. Lewatywy odżywcze z mleka po 50 ctm. sześć. co 2 godziny.

Tuberculosis laryngis.

Dobre żywienie, szanowanie głosu, unikać pyłu i t. p. szkodziłości. Zaraz z początku cierpienia kreozot do wewnątrz, prócz tego żelazo, arsen; zamrażnych wysłać na zimę na południe na Riviérę, do Wenecyi, Kairu, w lecie Görbersdorf, Davos.

1011. *Resorcin 5·00,*

Aqu. dest. 500·00.

S. Do inhalacyi.

1012. *Jodoformii 2·00,*

Acid. borici 1—8·00.

S. Do wdmuchiwań.

1013. *Morphii muriat. 1·00,*

Pulv. gum. ar.

Sacch. lactis 3—5·00.

S. Do wdmuchiwań.

1014. *Cocain muriat. 1·00,*

Sacch. lactis 2·00.

S. Do wdmuchiwań.

1015. *Cocain mur. 0·50—1·00,*

Aqu. dest. 10·00.

S. Do pędzlowań.

1016. *Acidi lactici 20·00,*

Aqu. dest. 20—40—80·00.

S. Do pędzlowań.

Tuberculosis pulmonum.

W przypadkach gruźlicy dziecięcej, należy zwrócić całą uwagę na higieniczne wychowanie, przebywanie jak najwięcej na świeżem powietrzu, gimnastyka, wysypianie się, dobre odżywianie, nie obciążanie pracą umysłową lub fizyczną,

unikanie zaziębień, hartowanie skóry przez zimne nacierania słoną wodą, zwłaszcza: szyi i klatki piersiowej.

W pierwszych początkach suchot przedewszystkiem uważać na podniesienie odżywienia chorego, forsownie go żywić. Polecieć picie mleka w lecie, tranu w zimie, tłuszców jak największej, o ile tylko żołądek znośi. Pobyt kilkomiesięczny w górskim powietrzu podczas lata, na zimę zaś polecieć wyjazd do jednej ze stacyj klimatycznych.

Ze środków leczniczych stosować kreozot, guajakol, creozot. carbonic. 6:00 p. die, arsen, zresztą leczenie symptomatyczne jak przy bronchitis.

W późniejszych okresach obok powyższych poleceń pilnie uważać na pojawiające się krwiotłucia i stosownie je wstrzymywać. Zmniejszać wydzielanie płwocin przez środki balsamiczne, usuwać gorączkę przez podawanie miernych dawek antypiretyków, jak antypiryny po 0'50, 2—3 proszki na dzień, w razie potrzeby. Toż samo phenacetyny lub antifebriny po 0'25.

1017. Salipyrin 1'00,

Dtur. tal. dos. 15.

S. Co 2 godz. pr. (do 7 dzien.).

Usuwanie mocnych potów przez zmywanie ciała winnym octem, cognakiem, wodą kolońską lub na wewnątrz cognac z mlekiem, lub atropina po 0'001 na noc, Agaricin bardzo słabo działa, z nowszych środków polecają: Kalium telluricum po 0'01 na noc, dochodząc do 0'05.

1018. Acidi agaricin 0'01—0'05,

Sacchari 0'30,

Mfp. dtur. tal. dos. X.

S. 2 proszki dziennie.

1019. Extr. fluid. hydr. Canad. 10'00.

S. Na wieczór 30 kropli.

W razie krwotoków bezwzględny spokój, okład lodowy na piersi, połykanie lodu, pokarmy tylko chłodne, wstrzyknięcie Ergotini Bombelon 0'50 do 1'0 na raz, podanie większych dawek morfiny dla zapobieżenia kaszlowi.

Przy tętnie przyspieszonym dać: Fol. Digitalis 0'05 z morfiną 0'01 co 2—3 godz. proszek.

W ciężkich przypadkach krwotoku, wstrzyknąć atropinę 0'10: 10'0 z tego pół strzykawki na raz, lub Acid. sclerotinici 1:10: wody, z tego co godzinę strzykawkę.

Przeciw bieguncie leki osłabiające z dodatkiem opiatów:

1021. Plumb. acet.

Laudani aa. 0'03.

Mfp. dtur tal. dos. 10.

S. 2—3 razy dziennie.

Pigułki kreozotowe używać bez balsamu tolutańskiego. Dziennie można dojść do 5—6 grm.

Z wyrobów krajowych, pigułki Zahradnika i Mańkowskiego, z zagranicznych dobre są Jaspersa (Berlin). W rozczy nie dobrze jest zapisywać kreozot z Tra amara lub Tra gent.

1022. Kreozoti e bit. fagi 3'00, Trae gent. 30'00.

DS. Po jedzeniu 20—30 kr. w kieliszku wody lub wina.

1023. Kreozoti e bit. fagi 1'00, Trae gent. 2'50,

Spir. vini rectific. 25'00,

Vini Xerens 100'00.

DS. 3 razy dziennie po łyżeczce w szklance wody.

1024. Benzozol 0'25,

Tal. dos. N. 20.

S. 4—6 proszków dziennie (u osób, które kreozotu nie znoszą).

1025. *Guajacoli* 2·00,
Spir. vini 20·00,
Tinct. gentian 10·00,
Extr. Coffe. conc. 20·00,
Aqu. dest. 200·00.
 MDS. 2—4 łyżek dziennie.

Pigułki guajakolowe po 0·05 wyrobu Zahradnika, w tych samych dawkach co kreozot.

U dzieci: Niedozwalać suchoćnicom karmić dzieci, zmywania chłodne, na lato pobyt w górzystej lesistej okolicy. Przeciww gorączce Chinin (0·25—0·30) *Acid. salicyl.* 0·25 pro dosi.

1026. *Acid. salicyl.* 2·00,
Aqu. dest. 100·00,
Cognaci 5·00,
Syrup 20·00.

DS. Co godzinę łyżeczkę.

1027. *Kreosoti gtt.* 5,
Aqu. dest. 70·00,
Syrup 15·00.

DS. Co 3 godziny łyżeczkę.

1028. *Kreosoti* 1·50,
Solv. in Ol. amygd. 30·00,
Gum. ar. 20·00,
Aqu. dest. 80·00,
Syr. amygd. 20·00.
Mf. emuls.

DS. 2 razy dzień łyżeczkę.

1029. *Guajacol* 1·00,
Trae chinæ 2·00,
Vini Malac. 100·00.

MDS. 3 razy dziennie łyżeczkę po jedzeniu.

1030. *Guajacol* 2·00,
Spir. vini rectf.
Aq. menth. pip. āā. 50·00,
Ol. jecor. 50·00.

MDS. Skłóciwszy, 4 razy dziennie podać łyżeczkę.

W razie krwioplucia: spokój, lodowe okłady na klatkę piersiową.

Plumb. acet. (0·03 pr. dos.) kilka razy dziennie.

Extr. secal. cornuti, przy kaszlu *Codeina*, morfina. W razie biegunki *Aq. Calcis* z mlekiem.

Tumor albus.

W pierwszym okresie zaleca się absolutny spokój kończyny zajętej, staw należy ustalić w położeniu prawidłowem, (opatrunek gipsowy lub organtynowy).

Kąpiele słone lub słono-jodowe ułatwiają osiągnięcie wyniku korzystnego. W przypadkach dalej posuniętych, ograniczamy się u dzieci, do operacyj mniejszych atypowych (wyskrobanie tkanek schorzałych *Arthrotomia*). w wieku zaś późniejszym zmuszeni zwykle jesteśmy decydować się na resekcyę stawu, a często i amputacyę.

Główny nacisk w tego rodzaju chorobach należy położyć na poprawę ogólnego stanu odżywienia.

Tyloma. Modzel. Clavus. Od-cisk.

Zeskrobać zgrubiałą warstwę, wypuścić ropę, opatrunek, później maść lub plastry.

1031. *Acid. salicyl.* 5·00,
Collodii 50·00,
Extr. canab. ind. 1·00.

MDS. Przez kilka dni pędzlować.

1032. *Praecipit. albi*
Zinci oxyd. āā. 2·00,
Ungu. simpl. 20·00.
 S. Maść na modzele.

1033. *Empl. Diachyl.* 15·00,
Aeruginis
Camphorae āā. 1·00.
 Mf. emplastrum.

Plaster turystów (*Touristen-pflaster*).

Typhlitis et Perityphlitis.

Leczenie zewnętrzne polega na stosowaniu środków przeciwpalanych i odwodzących, okład lodowy, pijawki, smarowanie jodyną. W przypadkach, gdy cho-

ry nie znosi okładów lodowych — okład wysychający. Nie zwlekać z zabiegiem operacyjnym.

Wewnętrznie przetwory makowca w dużych dawkach, a w razie gwałtownych bólów, podskórne wstrzyknięcie morfiny. Dyeta wyłącznie płynna, bezwzględny spokój.

Gdy okres zapalenia minie, środki przyspieszające wessanie wypociny są wskazane, więc: okłady ciepłe, wcieranie maści jodowych. Jeżeli stolce w tym okresie dobrowolnie nie nastąpią, należy je ułatwić za pomocą lewatyw. Zresztą leczenie czysto przypadowe, w razie silnych wymiotów, kawałki lodu do polykania, Cocaina.

W razie zapadu napoje wysokie, eter podskórnie.

1034. *Trae opii simpl.* 10·00.

DS. 3 razy dziennie po 5—10 kropli.

1035. *Extr. opii* 0·02,

Sacchari albi 0·30,

Dent. t. dos. XII.

DS. 3 proszki dziennie.

W razie silnych wymiotów:

1036. *Cocain muriat.* 0·20,

Aqu. dest. 10·00.

MDS. W razie wymiotów 10 kropli zażyć.

1037. *Morphii mur.* 1·00,

Spir. vini 5·00,

Glycerin 10·00,

Aq. dest. ad 30·00.

DS. Do podskór. wstrzykiwań (Rozezyn bardzo trwały).

Jako przyspieszające wessanie:

1038. *Ung. Kali jodati* 25·00.

DS. Do wcierania.

1039. *Kali jodati* 2·00,

Extr. bellad. 0·50,

Ung. simpl. 30·00.

MDS. Do wcierania.

W razie parcia na stolce lub moczyć:

1040. *Morph. mur.* 0·20,

Butyri Cacao 10·00,

Mf. l. a. supposit. N. X.

S. 2—3 na dobę użyć.

Typhus.

Leczenie przypadowe, polegające na zwalczaniu zagrażających objawów. Przy pierwszym podejrzeniu na T. abd. purgans. najlepiej Calomel po 0·50 z dodatkiem pulv. Ialapp. 0·30 2—3 dawki aż do skutku.

Gorączkę należy obniżać za pomocą chłodnych zmywań całego ciała, woda czysta lub z dodatkiem octu, letniemi kąpielami i środkami przeciwgorączkowymi, ale ostrożnie, aby nie wywołać zapadu.

Skrzepiac akcyę serca napojami wysokowymi, a gdy te nie są dostateczne, środkami nasercowymi.

W razie silnej biegunki, przetwory makowca i środki ściągające; w razie zaparcia stolca w pierwszym okresie choroby, środki czyszczące, w późniejszych okresach lepiej lewatywy stosować.

W razie krwotoków jelitowych okład lodowy na brzuch i środki przeciwkrwiotokowe.

Przytem należy pamiętać o należytem przewietrzaniu mieszkania, desinfekecyi stolców i bielizny. Dyeta powinna być wyłącznie płynna, zwłaszcza mleko, rosoly, wino czerwone.

W razie łyżytu oskrzeli, bańki suche.

1041. *Chinin. mur.* 0·40,

Dtur. tal. dos. XII.

S. 2—5 pr. dziennie.

1042. *Natr. salicyl* 5·00,

Aqu. dest. 200·00,

Syr. simpl. 15·00.

DS. Co 2 godziny łyżkę.

Gdy chodzi o znaczne obniżenie ciepłoty ciała:

1043. *Antipyrin* 0·50,
Dtur. tal. dos. X.

DS. Co godzinę proszek aż do obniżenia ciepłoty.

1044. *Phenacetin* 0·50,
Dent. tal. dos. X.

DS. Co godzinę proszek aż do obniżenia ciepłoty.

Dzieciom niepodawać antipyriny ani Antifebriny, lecz w razie gorączki znacznej:

1045. *Chinin mur.* 0·15,
Sacchari 0·50,
Mfp. dtur tal. dos. 10.
S. 3 proszki dziennie.

lub:

1046. *Thallini sulphur.* 1·00,
Aq. dest. 80·00,
Syr. flor. aur. 10·00.

MDS. Co godzinę łyżeczkę (dla dziecka 3-letniego).

W razie silnej biegunki:

1047. *Decoct. salep* 0·50 *ad* 200·00,
Trae opii simpl. gtts. 10,
Syr. rub. Idei 15·00.

DS. Co godzinę łyżkę zażyć.

1048. *Chinin mur.* 2·00,
Pulv. Doweri 3·00.
Mfp. div. in dos. XII.

DS. 3 proszki dziennie.

1049. *Mixt. gum.* 200·00,
Extr. Laudani aquos 0·10.
MDS. Co godzinę łyżkę.

1050. *Naphthalini* 0·20,
Mag. Bism. 0·15,
Chinin sulph. 0·25,
Mfp. tal. dos. 15.
S. 3 proszki dziennie.

W razie zapadu:

1051. *Camphor. trit. opt. alcohol.* 0·05,
Coffeini natrosalicyl. 0·10,
Chinini mur. 0·20,
Mfp. Dent. tal. dos. XII.
DS. 4—5 proszków dziennie.

1052. *Naphtol-B*
Bismuth. salicyl aa. 0·20.

Mfp. S. 10 proszków na 24 godziny w razie biegunki.

1053. *Naphtol-B*
Magnes. salicyl aa. 0·20.

S. ut supra.
(w razie zaparcia stolca).

Nareszcie w razie silnego podrażnienia mózgu:

1054. *Natri bromati* 0·50,
Sacchari 10·00.

Rozpuściwszy we wodzie, wypić w ciągu dnia.

1055. *Camphor.* 0·50,
Chloralhydrat. 1·00,
Aqu. dest. 60·00,
Vitell. ovi unius.

S. Co 2 godziny łyżeczkę.

Typhus exanthematicus.

według tych samych prawideł.

Dzieci małe karmić wyłącznie piersią, lub odpowiednio rozcieńczonem mlekiem, starsze dostają herbatę z mlekiem, rosół z jajem.

Gdy gorączka ustaje Cacao, rosół z tapioką.

Pagnienie gasić kwaskami Ac. mur., Ac. phosphoricum 1:200 — z syropem, co godzinę łyżeczkę, przemywać usta 5% boraxem.

Na początku choroby Calomellem przeczyszczyć (0·02—0·05 pro dosi).

Ze środków przeciwgorączk.: Chinin 0·25—0·50 do wewnątrz lub w lewatywie, Antipyrin (1:120 z dodatkiem Cognacu 10·00) co 2 godziny łyżeczkę.

W razie czyszczenia:

Chinin. tannic. 0·15 p. dosi.

Przeciw krwotokom: okład lodowy na brzuch, liquor ferri sesquichl. ergotin.

Przeciw bezsenności, rzucaniu się — lewatywy z chloralu (1—2·0 na dawkę).

W razie osłabienia serca, stygnięcia kończyn: czarna kawa z Cognitionem, eter podskórnym, szampan.

Ulcera.

Przy wrzodach cuchnących i zgorzelinowych najlepiej nadaje się posypka jodoformowa i zmywania kreoliną. Z maści zalecają się jodoformowa, arystolowa, a gdy się wrzód zupełnie oczyści, maść lapisowa, borowa, cynkowa. Na wrzody kiłowe należy stosować maść rteciovą, przeciw wrzodom skrófulicznym najlepiej i najpewniej użyć ostrej łyżki, a następnie ranę leczyć jodoformem. Płaskie wrzody rakowe można usunąć przez wyskrobanie i następować przypalenie ługiem potasowym (po poprzednim zatamowaniu krwotoku).

Rozległe wrzody wymagają dość często zabiegu operacyjnego (okrojenie, transplantacja przyskórka, operacje plastyczne lub wreszcie amputacja). Przeciw wrzodom żyłakowym należy radzić noszenie opaski gumowej Martina.

1056. *Creolin* 20·0.

S. Kilka kropli do szklanki wody.

1057. *Jodoform*

Sacch. lact. āā. 5·00.

S. Zewnętrznie.

1058. *Jodoformi* 2·00,

Ungu. simpl. 20·00.

Mf. ungu. S. Maść.

1059. *Aristol* 1—2·00,

Ungu. simpl. 20·00.

1060. *Dermatol* 10·00,

Vaselin 90·00.

Mfung. S. Maść.

1061. *Dermatol* 10·00,

Talci 50·00,

Amyli 10·00.

Mfp. S. Do posypywania.

1062. *Argent. nitr.* 1·00,

Bals. peruv. 100·00,

Ungu. simpl. 100·00.

Mf. ungu. S. Maść.

1063. *Ac. boric.*

Ol. olivar.

Cerae alb. āā. 15·00,

Ungu. simpl. 100·00.

Mf. ungu. S. Maść.

1064. *Zinc. oxyd.* 10·00,

Ungu. simpl. 80·00.

Mf. ungu. S. Maść.

1065. *Kali caust. in bac. fus.*

5·00,

D. in vitro epistom. vitro clauso.

Ulcus contagiosum. (Wrzód miękki).

Zasada jest, by wrzód miękki zamienić na ranę czystą; środków żrących nie należy używać: jeśli gruczoły limfatyczne sąsiadnie są bolesne lub gdy do wrzodu przystąpiła dyfterya lub fagedenizm. By wrzód zamienić na ranę czystą, używa się środków żrących, z których najlepszym jest sulfas cupri 1:3 lub jednorazowe przyłożenie na 24 godzin:

1066. *Zinci chlorati* 5·00,

Zinci oxydati

Aqu. dest. āā. 5·00.

Mf. Pasta.

Wypalanie tym rozezysem powtórzyć należy w odstępach 3 godzinnych 3 do 4 razy. Po odpadnięciu strupa w przeciągu 24—48 godzin pokazuje się dno czyste, wtedy opatruje się wrzód jodoformem i watą Brunsā. Jodoform, euophen, aristol, mają przed jodoformem zaletę bezwonności, gojenie jednak przy tych środkach leniwiej postępuje. (Niederlandzka farmakop. przepisuje bezwonny jodoform):

1067. Jodoformii 197·00,
Acidi carbol. 1·00,
Ol. menth. pip. 2·00.

J. Koch zaleca Hdr. Sozjodolicum w maści 1 $\frac{0}{10}$. Gdy po pewnym czasie dno czyste, brodawkowate, ropy nie wydziela, przykładą się maść z azotanu srebrowego.

1068. Nitratis argenti 0·10,
Balsam. peruv. 1·00,
Vaselin. flav. 10·00.
 Mf. ungu. S. Maść.
 Fagedenizm i dyfterya.

Środków żrących się nie używa, lecz oczyszcza się dokładnie wrzód wodą borową 2 $\frac{0}{10}$ lub sublimatem 1:1000 2—3 razy dziennie i zasypuje jodoformem. Jeżeli przyczyną tych komplikacyj jest kacheksya lub anaemia, należy używać odpowiednich środków wewnętrznych obok leczenia miejscowego.

Ulcera corneae, (zob. Keratitis).

Ulcera intestini tuberculosa

Leczenie czysto przypadkowe, polega na podawaniu środków odurzających wewnętrznie lub w postaci wstrzykiwań podskórnych. W razie silniejszych bólów na podawaniu przetworów makowca wraz ze środkami ściągającymi i przeciwgnilnymi z powodu zwykle towarzyszącej biegunki. Przytem należy starać się podnieść odżywienie chorego zapomocą odpowiedniej diety (do mleka dodawać Aq. Calcis).

1069. Tinct. opii simpl. 10·00.
 DS. 2—3 r. dnia po 5—10 kropli.

1070. Laudani puri 0·02,
Tannini 0·10,
Naphtalini 0·25,
Sacch. alb. 0·30,
Mfp. dent. tal. dos. XII.
 DS. 2—3 proszki dziennie.

1071. Benzonaphtholi
Bismut. salicyl
Resorcin aa. 0·20.
Mfp. dtur tal. dos. N. 15.
 S. 3—5 proszków dziennie.

1072. Tinct. Colombo
 — *Cascarillae aa. 15·00.*
 DS. Co godzinę 10—30 kropli w kleiku.

1073. Extr. opii 0·02,
Resorcini 0·20,
Sacch. alb. 0·30,
Mfp. dent. tal. dos. XII.
 DS. 2—3 proszki dziennie.

Ulcera laryngis syphilitica.

Leczenie ogólne przeciwkłowe. W dysphonii przy kile druzgorzędnej:

1074. Kali jodati 10·00,
Kali brom. 20·00,
Aqu. dest. 200·00,
Syrup cort. aur. 100·00.
 S. 2 łyżki dziennie.

1075. Calomelanos 1·00,
Pulv. gummosi 5—10·00.
 S. Do wdmuchiwania.

1076. Sublimati 0·20,
Aqu. dest.
Spir. vini aa. 20—50·00.
 Do pędzlowań.

1077. Jodi puri 0·50,
Kali jod. 1·00,
Glycerini 50·00.
 S. Do pędzlowań.

Ulcus ventriculi. Wrzód żołądka okrągły.

Przy świeżym wrzodzie zalecić ścisłą dietę, okłady lodowe na żołądek, spokój bezwzględny, opium. Dalsze leczenie polega na podawaniu środków alkalicznych, czy to w postaci wód mineralnych, czy też soli alkalicznych.

Korzystne wyniki leczenia daje przepłukiwanie wodą karlsbadzką lub rozezynami soli karls-

badzkiej prawdziwej lub sztucznej, które mają i tę zaletę, że je stosować można i w razach, gdzie picie wody karlsbadzkiej z innych powodów jest przeciwwskazaniem.

1078. *Natri bicarbon* 40·00,

Natri sulphur. 40·00,

Natri chlorati 20·00.

Mfp. S. Łyżeczkę na litr wody do przepłukania żołądka.

W razie silnych bólów lub wymiotów są wskazane środki odurzające, w razie kwotoków żołądkowych postępowanie lecznicze jak przy Haematemesis. Obok tego postępowania leczniczego dyeta powinna być pożywna a lekko strawna z wykluczeniem wszelkich napoi wysokokowych lub CO₂ zawierających, kwasów, tłuszczów i pokarmów korzennych. Gdy chorego z powodu silnych bólów, gwałtownych wymiotów lub żołądkowych krwotoków nie można stosownie żywić, wskazane są lewatywy odżywcze.

Często towarzyszące zaparcie stolca usuwać należy lewatywami.

1079. *Sal. therm. Carolin.* 100·00.

DS. Co dzień na czczo łyżeczkę w $\frac{1}{2}$ szklanki letniej wody zażyć.

1080. *Natr. bibarb.*

Magn. ustae aa. 15·00.

MDS. 3—4 razy dziennie na koniec noża zażyć.

1081. *Natr. bicarb.* 5·00,

Morph. mur. 0·10,

Mfp. div. in dos. XII.

DS. 3 proszki dziennie.

1082. *Morph. muriat.* 0·10,

Aqu. laurocer. 10·00.

DS. W razie bólów 10 kr. zażyć.

1083. *Codeini* 0·02,

Natr. bicarb. 0·50,

f. p. dent. t. dos. XII.

S. 2—3 proszki dzien. zażyć.

1084. *Magister. bismuth.* 5·00,

Codeini 0·20,

Mfp. div. in dos. X.

S. 3 proszki dziennie.

1085. *Morph. mur.* 0·10,

Aqu. dest.

Glycerini aa. 5·00.

MDS. Do podskórnych wstrzykiwań. W jednej strzykawce 0·01 morfiny.

Uraemia.

Starszym, dobrze odżywionym, mierny upust krwi, dzieciom kilka pijawek za uszami. Zimne okłady na głowę, środki silnie czyszczące. Lewatywy z octu i wody. W razie silnych i długotrwałych drgawek, lekkie zachloroformowanie, lewatywy z chloralu. Jeżeli są objawy zapadu. tętno szybkie, nieregularne, kończyny chłodne, wino, camphora podskórnice, kąpiel ciepła (30° R.) i zawijanie w koc. Pilocarpin (0·005—0·01) 2 razy dziennie, jednak ostrożnie, bo czasem wywołuje zapad.

1086. *Chloral hydrat.* 3·00,

Aqu. dest. 150·00.

S. Do lewatywy (starszym).

Dzieciom 0·50—1·0:50·0.

Urticaria.

Usuwać przyczyny wywołujące; z zewnętrznych: ukąszenie owadów, plaskwy, uwzględnić nieżyty żołądka, zaburzenia płciowe i t. d.

Zmywania zimną wodą, poudrowanie, kąpiele z dodatkiem sody, alunu, sublimatu, wątroby siarczanej. W celu usunięcia świądu: zmywanie octem, eterem, 1—2% kw. karbolowym.

1087. *Spir. lavand.* 100·00,

Spir. vini gall. 150·00,

Aether. sulphur. 2·50,

Aconitini 1·00.

MDS. Do nacierai.

1088. *Chloralhydrat* 5'00,
Aqu. laurocer. 50'00,
Aqu. dest. 200'00.
 DS. Do nacierań.

1089. *Chlorali hydrat.* 8'00,
Acidi borici 12'00,
Aqu. dest. 400'00.
 S. Do nacierań skóry.

1090. *Acidi Salicyl* 5'00,
Zinci oxyd. 15'00,
Amyli pulv. 30'00.
 Mfp. S. Do pudrowań.

1091. *Chinin. muriat.*
Ergotin. āā. 0'05,
Extr. bellad. 0'002,
Glycer. q. s. f. pil. 1. tal.
 Nr. 10.

DS. Co 3 godziny pigułkę.

1092. *Tinct. strophanti* 10'00.
 S. Dwa razy dziennie po 10 kropli.

Vaginismus.

Usunięcie zmian chorobowych miejscowych jak owrzodzeń, zapalenia i t. p. jeżeli się znachodzą. Poprawa stanu ogólnego i podawanie środków uspakajających ustrój nerwowy. Gdy objawy niezbyt jeszcze gwałtowne a przyczyną choroby jest niedokładny stosunek płciowy, wpływ moralny, środki znieczulające miejscowo, aby umożliwić coitum.

1093. *Cocaini muriat.* 1'00,
Aqu. dest. 3'00,
Spir. vini rect. 2'00.
 DS. Do pędzlowania

albo:

1094. *Extr. bellad.* 1'00,
Vaselini 15'00.
 Mf. ungu. DS. Na wacie między wargi na noc zakładać. Zasypywanie jodoformu. — Rozszerzanie powolne wnijścia pochwowego rozszerzaczami.

Jeżeli przypadki gwałtowne: wycięcie błony dziewiczej i nagłe rozciągnięcie wnijścia pochwowego sposobem tępych po poprzednim zachloroformowaniu chorej.

Variola.

W okresie zwiastunów, przeczyszczenie. Przewietrzać pomieszkowanie, ciepłota pokoju 14—15° R., lekkie przykrycie chorego, dyeta pożywna płynna, mleko, mocny rosół z żółtkiem. Dużo wody, orszada, woda z winem. Przeciw bólom głowy lodowe okłady. Napięcie skóry łagodzić smarowaniem tłuszczów (oliwa, vaselina, 5% maść borowa). Kąpiele ciepłe, a gdy to niemożliwe, zmywania ciepłą wodą, zwłaszcza twarz i powieki. Płukanie: 2% Kali chloricum, 3% kw. borowy.

1095. *Kali chloric.* 5'00, *solve in*
Infus. flor. tiliae 300'00,
Trae laudan. 1'00,
Mell. rosati 10'00.
 DS. Płukanie.

1096. *Tannin. puri* 1'00,
Alumin. 0'50,
Kali bromat. 5'00,
Mucilag. gum. ar. 25'00,
Aqu. dest. 200'00.
 DS. Płukanie.

Przeciw wymiotom pigułki lodowe lub wstrzyknięcie morfiny w okolicę dołka podsercowego.

W razie bezsenności:

1097. *Chloralhydrat* 5'00,
Aqu. dest. 60'00,
Syrup rubid.
Mucilag. gum. ar. āā. 20'00.
 DS. Połowę na raz użyć.

1098. *Sulfonali* 1'00,
Dtur. tal. dos. N. 5.
 S. Na noc proszek w herbacie lub rosole.

Zaraz po wybuchu wysypki dać na głowę, twarz i szyję maskę z płótna, pozostawiając otwory na nos, oczy i usta, posmarowaną pastą:

1099. *Acid. carbol* 3'00,
Amyli
Ol. amygdal. dulc. āā. 50'00.

Resztę ciała smarować często:

1100. *Acid. salicyl* 3'00,
Amyli 30'00,
Glycerin. neutr. 70'00.
Mf. Pasta.

A oprócz tych środków:

1101. *Ol. amygd. dulc.* 15'00,
Syrup flor. aurant. 30'00,
Aqu. lauroc. 10'00,
Chinin. hydrochlor. 0'50,
Solve in acid. hydrochlor. q.
s. f. *emulsio*.

S. Co kwadrans do $\frac{1}{2}$ godz.
po kilka kropli (Leventaner
z Konstantynopola).

Wstrzymuje też rozwój wysypki Cocaina, jużto 3—4 wstrzyknięć podskórnych roztworem 2%, już też (0'20:125 mixt. gum.) w przeciagu 24 godzin podana. Ciepłota ma spadać szybko i rozwój wysypki ustaje.

W osłabieniu serca: kamfora, wino, cognac na pół z wodą z żółtkiem i cukrem, co godz. łyżkę. Ropnie wcześniej otwierać.

Verucca.

Najlepiej wyciąć nożyczkami lub wypalić c. *acido nitrico fumanti*, *ferro sesquichlor.*, *solutione Plenckii* (Rp. *Sublimati corrosivi*, *aluminis*, *cerussae*, *camphorae*, *spiritus vini* āā. 5'00) lub kw. octowym. Do wewnątrz podawać arsen 3 razy dziennie po 2 krople.

1102. *Acid. salicyl.* 5'00,
Acid. boric. 10'00,
Calom. 30'00.

DS. 3 razy dziennie wetrzeć w brodawkę.

Vitia cordis.

Stosowne żywienie, mleko, mięso bez korzeni, osobom chudym więcej tłuszczów, otyłym tychże zabronić.

Wzbronione również napoje wysokokowe, prócz lekkich win. Ruch, a mianowicie po równi, lub po miernych wzniesieniach gór, z wyjątkiem, gdy chorzy dostają duszności, zawrotów głowy, lub nieregularności tętna, gimnastyka lecznicza, kąpiele solne letnie. Unikać wzruszeń. Uregulować stolec.

Wobec braku kompensaty:

1103. *Infus. digitalis* e 1'00
ad 150'00,
Syrup simpl. 20'00.
MDS. Co 2 godz. łyżkę.

1104. *Trae digital.* 2'50,
Aqu. lauroc. 8'00.
MDS. 3 razy dziennie po 15 kropli.

1105. *Pulv. fol. digitalis*
0'50—1'00,
Sacchari 3'00,
Mfp. div. in dos. N. 10.
S. Co 2 godziny proszek.

Jeżeli po użyciu Digital. tetno mocniejsze, regularniejsze, ilość moczu większa, to przestać na parę dni podawać.

1106. *Trae strophanti*
Aqu. lauroc. āā. 10'00.
S. 3 razy dzien. po 10 kropli.
(Dzieciom od 5—10 lat do 5 kropli dziennie).

1107. *Coffeini natrobenz.* 2'00,
Sacchari 5'00,
Mfp. div. in dos. 20.
S. 5—8 pr. dziennie.

1108. *Theobromin natro-benz.*
0'10,
Sacchari albi 0'20,
Mfp. d. tal. dos. 20.
S. Co 2 godziny proszek.

1109. Trochisci Nitroglycerin
à 0·001,

Tal. dos. 10.

S. W razie napadu duszności
osłabienia akcji serca $\frac{1}{2}$ —1
pastylki.**1110. Kali jodati 10·00,**
Aqu. dest. 200·00.DS. Rano i wiecz. $\frac{1}{2}$ —1 łyżki.**1111. Infus. adonis. vern. e 5·00,**
ad 180·00,
Syrup rubid. 200·00.

S. Co 2 godz. łyżkę.

1112. Spartein. sulphur. 0·10,
Aqu. dest. 180·00,
Syrup sacchar. 20·00.
MDS. Co 2 godziny łyżkę.**1113. Tinct. fruct. immat.**
Nerii Oleandri 10·00.

DS. 2—3 r. dzień. po 20 kropli.

Przeciwpuchlinie (zob. ascites)
nacięcia obrzękłej skóry, jużto
lancetem lub małym trójkątnym,
po czym opatrunek aseptyczny.
W razie duszności, gorczycezniki
na okolicę serca, moczenie nóg
w gorącej wodzie, wstrzykiwanie
morfiny, w razie silnego bicia
serca blaszanka z zimną wodą
na okolicę serca.**1114. Tinct. lobeliae 5·00,**
Aqu. lauroc. 10·00.

DS. Co godzinę 10 kropli.

Przy objawach obrzęku płuc:

1115. Inf. flor. arnicae e 7·50
ad 150·00,Liquor ammonii anis. 2·00,
Syrup aurant. 15·00.

MDS. Co godzinę łyżkę.

1116. Flor. benzoës 2·00,
Camphor. 0·50,
Sacchar. 3·00,
Mfp. div. in dos. N. 10.

S. Co 3 godziny proszek.

Na pobudzenie apetytu, środki
gorzkie (Tra amar. Tincti. chin.
comp.) acid. mur. Przy omdle-
niach, zawrotach głowy skut-
kiem anaemii mózgu, wino, eter.**Vulnus.**Ranę należy wymyć jednym
z podanych niżej rozczyńców
przeciwgnilnych i to tem ener-
giczniej, im większe podejrzenie
na zanieczyszczenie. Części obum-
marłe najlepiej od razu usunąć.
Naczynia krwawiące należy pod-
wiązać, okłóć i t.p. a ranę o ile
to jest możliwem i w danym
przypadku dozwołonem, zespoić
zapomocą szwów po ewentual-
nem założeniu sączków. Na-
wierzch należy położyć opatru-
nek przeciwgnilny a całą część
chorobą dotkniętą, wedle mo-
żliwości ustalić.Wobec ran postrzałowych na-
leży się w zasadzie ograniczyć
do desinfekcyi okolicy rany i
pokrycia jej opatrunkiem prze-
ciwgnilnym.**1117. Ac. carbol. 10—50·00,**
Aqu. dest. 1000·00.

S. Woda karbolowa 1—5‰.

1118. Sublim. corros. 1·00,
Aqu. dest. 1000·00.

S. Sublimat 1‰.

1119. Sublim. corros. 1·00,
Acid. tartar. 5·00,
Aqu. dest. 1000·00.

S. Rozczyn kwaśny subl. 1‰.

1120. Aseptol 30—50·00,
Aqu. dest. 1000·00.

S. 3—5‰ rozczyzn aseptolu.

1121. Zinc. chlorat. 80·00,
Aqu. dest. 1000·00.

S. 8‰ rozczyzn chlorku cynku.

1122. Thymol. 1·00,
Aqu. dest. 1000·00.

S. Rozczyn tymolu 1‰.

1123. Ac. salicyl. 3·00,
Aqu. dest. 1000·00.

S. Przed użyciem ogrzać.

1124. Acid. boric. 30—40·00,
Aqu. dest. 1000·00.S. 3—4‰ rozczyzn kwasu bo-
rowego.

1125. Creolin 20·00.

S. Kilka kropli do szklanki wody.

1126. Jodoform 5·00.

S. Do posypywania ran.

1127. Jodoform

Sacchar. lact. āā. 5·00.

S. Do posypywania ran.

1128. Jodoform 2·00,

Collod. 20·00.

S. Collodium jodoformowe.

1129. Jodol 1·00,

Aeth. sulph. 5·00,

Collod. 10·00.

S. Collodium jodolowe.

1130. Jodoform 2·00,

Aeth. sulph. 20·00.

S. Eter jodoformowy.

1131. Jodoform 2·00,

Glycerin 20·00.

S. Zawiesina jodoformowa.

1132. Jodol 2·00,

Aeth. sulph. 20·00.

S. Eter jodolowy.

Na rany pokryte czystą ziarniną, stosujemy maść lapisową:

1133. Argent. nitr. 1·00,

Bals. peruv. 10·00,

Ungu. simpl. 100·00.

Mf. ungu. S. Maść.


Opatrunek przeciwnilny składa się z gazy antyseptycznej (jodoformowej, jodolowej, sublimatowej lub t. p.) z warstwy wysysającej (wata Bruns'a, wełna drzewna, worki napełnione trocinami itp. i z opaski ustalającej i przytrzymującej.

Vulvo Vaginitis.

Troskliwe oczyszczenie części płciowych, ciepłe kąpiele nasienne. Przestrzykiwania pochwy sublimatem (0·10%), kw. karbol. 1—2%, *Zinc. sulph.* (0·50%), ałunem (5%) 3 razy dziennie. Zasyпки jodoformem lub przeciki jodoformowe. Nadżerki na wargach sromowych opatrzyć maścią salicylową lub pudrem salicylowym zasypać. Ropnie przecinać.

Przyczyny, jak anaemię, zołży leczyć środkami żelazistymi, jodowymi, tranem itp.





NOWE LEKI.

Aethylenum bromatum.

Środek mocno trujący, odróżnić należy od Aethylum bromatum. Dr Donath w Peszcie poleca go przeciw epilepsyi.

*Rp. Aethyleni bromati 5·00,
ad emuls. oleos 100·00,
Ol. menth. pip. gtts. 2.*

z tej emulsyi 2—3 r. dz. po 30 kropli w $\frac{1}{2}$ szklanki wody z cukrem. Co drugi dzień postępować po 10 kropli więcej, aż do 70. Dzieci od 8—10 lat rozpoczynają od 10 kropli. W razie podrażnienia żołądka (odbijania), zmniejszyć dawkę lub dodać 0·10 Extr. opii, do emulsyi. Można też podać w kapsułkach.

*Rp. Aethyleni bromati gtts. 3.
Ol. amygdal. dulc. gtts. 6.
Dtur. tal. dos. in capsul gelatinosis N. 100.*
S. 2 r. dz. po 2—4 kapsułek.

Agathinum (Salicyl- α -Methylphenyl hydrazon).

Łuski drobne, białe-zielonawe bez smaku i zapachu, w wodzie nierozpuszczalne, natomiast łatwo w eterze i wyskoku. Podawano z dobrym skutkiem w cierpieniach reumatycznych, nerwobólach, Ischias i t. p. Często po zażyciu proszka występuje ból głowy. Zazwyczaj po użyciu 4—6

grm. następuje skutek. Nowsze doświadczenia mniej zachęcające.

Dawka 3 razy dzien. po 0·50 w opłatku.

(10 grm. 2 zlr. 25 ct.)*)

Alumnol.

Proszek biały w czerwono wpadający zawiera 5% aluminium i 15% siarki. Rozpuszcza się w gorącej wodzie (do 40%), w wyskoku trudniej rozpuszczalny przybiera barwę niebieską. Jako środek ściągający i antyseptyczny stosuje się w praktyce chirurg. w 0·5—2%, w roztworze do obmywań na wrzody otrętwiałe, w maści 3—6%. Do przepłukiwania w jamie brzusznej w 0·5—0·10%. Czystego A. używano na owrzodzenia żołądki i pracia (wrzód miękki). Posypka A. z talc. ven. i amylum 10% w wypryskach i oparzeniach. Roztwory 1—5% w eczema pustulosum, acne, furunculosis, gonorrhoea i t. p.

*Rp. Alumnoli 10·00,
Lanolin anhydr. 50·00,
Paraffin liquid. 35·00,
Ceresini 5·00.*

Mfung. (w chorobach skórnych).

Co do działania alumnolu w wiewiórze to ostatnie ogłoszenia opiewają, że A. nie przewyższa wcale innych dotąd uży-

*) Ceny przy niektórych lekach podane, wyjęte są z cennika miesięcznego: Pezolda et Süssa we Wiedniu.

wanych środków. Jedynie ulcus molle goi się szybko pod działaniem A.

(H : 2 zhr. 30 ct.)

Ammonium boracicum.

Jeden ze środków przeciwgruźliczych, ma zmniejszać kaszel i obniżać ciepłotę. Używa się w dawkach 0.25, 3 razy dziennie w połączeniu z opium, Hyosciaminą i t. p.

Amylenhydrat. Amylenum hydratum.

Płyn przeźroczysty, oleisty, zapachu kamfory i mięty. Rozpuszcza się w 8 cz. wody. Przeciw bezsenności w dawce 3—5 grm. w wodzie ocukrzonej, piwie, kapsułkach lub lewatywie. Działa słabiej, niż chloral, silniej od Paraldehydu. W przypadkach, gdzie chcemy koić ból, podać go można z dodatkiem morfiny. Sen następuje w $\frac{1}{2}$ godziny po użyciu i trwa 7—9 godz. Pro dosi: 4.00, pro die 8.00.

(100 grm. 2 zhr.).

Rp. Amylen hydrat. 7.00,

Aqu. dest. 60.00,

Extr. liquor. 10.00.

MDS. Przed spaniem połowę.

Analgenum.

Środek polecany przeciw nerwobólom i reumatyzmowi w 1 gram. dawkach. Nie przedstawia żadnych szczególnych zalet.

Antitherminum.

Środek przeciwgorączkowy, działający silnie na nerwy naczyń ruchowe. Drobner ze Lwowa próbował w chorobach gorączkowych i m. Bright z nieszczęśliwym skutkiem. Wobec niepewnych skutków a niebezpiecznych objawów występujących przy używaniu, należałoby

jeszcze czekać na dalsze doświadczenia.

Dawka 0.50 pro dosi.

Antiseptol. (Cinchoninum jodosulfuricum)

zawiera 50% jodu, proszek bez zapachu, rozpuszczalny tylko w wysoku i chloroformie. Służy jako środek antyseptyczny i zastępuje jodoform.

Anthrabinum.

Działa podobnie jak Chrysarobina, lecz słabiej i powolniej, za to zaś o wiele mniej szkodziwa i znacznie tańsza. Kwalifikuje się przeto do użycia na twarz i części płciowe. Z dobrym skutkiem stosowano przeciw:

Herpes tonsurans, *Pityriasis*, *Erythema*, *Eczema marg.* i t. d.

Rp. Anthrabin 10.00,

Ol. olivar. 30.00,

Lanolin 60.00.

W roztworze wyskok. 10:80, lub 10% roztworze gliceryny, wreszcie z Collodium 1:10.

Apocodeinum hydrochloric.

Działanie podobne do Apomorfiny. Środek wykrztuśny używa się w nieżytach oskrzeli zwłaszcza przewłocnych. Można dłuższy czas podawać, jużto w kroplach, (n. p. 1% roztworu po 10—20—30), w pigułkach lub podskórnie 10—20 kropli 2% roztworu.

Aristol.

Różowo-żółty, prawie bezwonny proszek. Nie rozpuszcza się ani we wodzie, ani wysoku, natomiast w eterze i chloroformie. Zawiera 45% jodu. Używa się w chorobach skóry, owrzodzeniach i wszędzie może zastąpić Jodoform. Zapisuje się w postaci zasypki, maści, pre-cików, czopków.

Rp. Aristol 0·30,
Sapo Kalin. 30·00,
Aether 5·00,
Alcohol 5·00.

Mf. ungu. S. Maść na wóle.

Wetrzeć na wieczór i okład wysychający.

Rp. Aristoli 3·00,
Ol. oliv. 20·00,
Lanolin 80·00.

Mf. ungu. S. Na oparzeliny.

(100 grm. 12 złr.).

Asaprol.

Proszek białawy rozpuszczalny we wodzie i wyskoku. W dawce 1—4 grm. przeciwgorączkowy i kojący, zwłaszcza w ostrym reumatyzmie. Bompert podaje w 1-szym dniu 2 grm., w drugim 3·00 w następnych 4·00, dopóki ból i gorączka nie ustąpi, po czym dla zabezpieczenia od nawrotu choroby zmniejsza dawkę do 1 grm.

Rp. Asaprol 2—4·00,

Syrup

Aqu. dest. āā. 30·00.

MDS. Użyć w przeciągu dnia, biorąc po łyżeczce w kawie lub piwie.

W proszkach po 0·50, lub lewatywie:

Asaprol 2—7·00.

Laud. Sydenh. gtts. IV.

Vitelli ovi N. I.

Det. Salep 100·00.

MDS. Na jedną lewatywę.

Benzanilid.

Proszek biały krystaliczny, w wodzie uierozpuszczalny. Środek przeciwgorączkowy, polecany w praktyce dziecięcej. Ciężkość spada, jak przy antifebrynie, a jej podwyższenie się, powolniejsze. Dla dzieci w proszkach z cukrem pro dosi 0·10 do 0·40, dorosłym 0·60 do 1·00.

Benzolguajacol czyli Benzozol. (Acidum benzoic. i Guajacol).

Proszek bezbarwny, używany w miejsce kreozotu przy gruczlicy płuc. Zapisuje się w proszkach z eleosacch. menth. po 0·25—0·80 trzy razy dziennie po jedzeniu.

Rp. Benzozol 5·00,

Ol. menth. pip. 0·10,

f. trochisci Nr. 20.

S. 3 razy dz. pastylkę po jedzeniu, przez 2-gi, 3-ci i 4-ty tydzień po 2, w 5-tym tygodniu po jednej, 6-ty tydzień wypocząć i na nowo tak samo.

(100 grm. 7 złr.)

Benzonaphtholum. (Acid. benzoic. i Naphthol).

Proszek biały bez smaku i zapachu, trudno we wodzie rozpuszczalny. Środek antyseptyczny podobnie jak Betol. Polecają głównie w chorobach przewodu pokarmowego. Dawka 0·50 pro dosi, 5·00 pro die. Dzieciom 2 grm. pro die (podaje się jako proszek w opłatku).

(100 grm. 1 złr. 75 ct.).

Betolum. Betol. Naphthosol.

(Połączenie kwasu Salicylow. z Naphtholem). Proszek bez smaku i zapachu. Środek antyseptyczny i przeciwgorączkowy. Kobert poleca B. przeciw reumatyzmowi stawów i nieżyłowi pęcherza. Dawka: 0·30—0·40 cztery razy dziennie w pigułkach lub opłatku. Zewnętrznie przeciw rzeżączce w postaci przecieków 1 cz. Betolu. 4 części Butyr. Cacao.

(100 grm. 2 złr. 40 ct.).

Bismut subbenzoic. v. benzoicum.

Biały delikatny proszek, używany zamiast jodoformu, zwłaszcza jako zasypka na wrzód miękki. Finger poleca zasypywanie wrzodu 2 razy dziennie przez 3—6 dni. Pierwsze posypanie sprawia nieco pieczenia.

Bromamidum

zawiera 70% bromu, proszek krystaliczny nierozpuszczalny we wodzie. Analgeticum i Antihermicum. Podaje się w proszku lub zawieszynie w ilości po 0.6—1.00 dorosłym, i od 0.06—0.03 dzieciom, kilka razy dziennie.

Bromol = Tribromphenol.

Jeszcze przez Rademackera używany środek, obecnie polecany przeciw dyfteryi do pędzlowań 1:25 gliceryny. Jako maść na owrzodzenia 1:10 maści. Przy cholera infantum 0.005—0.015.

Butylchloralum.

(Falszywie Crotonchloral hydratem zwany). Krystaliczne blaszki, aromatycznego smaku i zapachu. Rozpuszcza się we wodzie dość trudno (1:20), łatwo w wysoku.

Środek nasenny i kojący, zwłaszcza w newralgiach n. trigemini (co 2 godz. po 0.20—0.40). Jako nasenny (0.50—2.00). Zewnętrznie: przeciw bółom zębów wraz z równą ilością kw. karbolowego.

Bryonia alba.

Polecona w ostatnich czasach przeciw krwotokom. Extractum w pigułkach po 1—2—3.00 pro die. Tinctura 2—3.00 pro die.

Cactus grandiflorus.

W ostatnim roku czyniono wiele doświadczeń, z których

wynika, iż C.g. (w homeopatyi już dawniej używany) skutecznym się okazał przy wadach serca, angina pectoris, nerwicach serca, po nadużyciu kawy, herbaty, tytoniu, przy osłabieniu serca po durzycy, w chorobie Basedowa i wogóle tam, gdzie digitalis przeciwwskazane. Używano Tinctury, jednak skład tejże bywa niejednaki. Najpewniejszy preparat jest firmy Parke, Davis et Co. Fluidextract Cacti gran. diffiori.

Dawka tegoż 10—30 kropli 3—4 razy dziennie.

Cantharidinum.

Istota składowa kantaryd, powodująca powstawanie pęcherzy. Dawniej używano jej jako środka przyszczałego zamiast kantaryd. Obecnie sole kantarydyny zaczęto stosować przeciw gruźlicy — zamiast Tuberculiny. — Środek ten wymaga ostrożności, zdarzały się bowiem już po paru iniekcjach zapalenia pęcherza i nerek. Hennig produkuje *Cocain-Cantharidin*, mieszaninę Kantarydyny z Cocainą (1%). Jestto bezwonny biały proszek ściągającego i szczypiącego smaku, łatwo w gorącej wodzie rozpuszczalny. Używa się w formie wstrzykiwań podsk. przy gruźlicy krtani. Iniekcye niesprawiają zupełnie bólu. Polecają następujące formuły:

I. 0.075 *Cocain cantharid.*

50.00 *Aq. chloroform.*

II. 0.15 *Cocain cantharid.*

50.00 *Aq. chloroform.*

Roztworu I wstrzykuje się 2 przedziałki strzykawki Overlach, II-go 1 przedz. (= 0.0001 *Cantharid.*), dawkę można zwiększyć do 0.0004.

(Wyrób Henniga w fabryce Riedla w Berlinie).

(Dokładne sprawozdanie Demego Therapeut. Monatshefte H. 3. S. 112, oraz tamże Liebreicha S. 294 z r. 1892).

Cardinum

czyli wyciąg ze sere wołowych, którego przyrządzenie ma trwać około jednego roku, ma wzmacniać serce; w dawce 4 grm. wstrzyknięty wyciąg wzmacnia tętno, zwiększa ilość czerwonych ciałek krwi, i zwiększa ilość moczu. Lek przyszłości — zarówno ze Sperminą, nucleiną i t. p.

Carpainum hydrochloricum.

Alkaloid z grupy Sparteiny, delikatny proszek, łatwo w wodzie rozpuszczalny, używa się głównie przy Angina pectoris i przy wadach serca. W pierwszych minutach po zastrzyknięciu przyspieszenie ruchów serca, jednak po 5 minutach sprawia zwolnienie i wzmocnienie tychże, przyczem objawy duszności szybko ustępują. W razie częstszych napadów A. p. zwiększa się dawkę tak, że od 6 mlgrm. dojść można do 3 ctgrm. Działanie podobne do soli Coffeiny.

Chloramid zob. Chloralformamid.

Chloralformamid = Chloralamid = Chloralum formamidatum.

Bezbarwne kryształy smaku nieco gorzkiego, we wodzie łatwo rozpuszczalne. Łagodny lek nasenny. Używa się w bezsenności przy neurastenii, gruźlicy itp. chorobach, którym nie towarzyszą bólesci. 4:00 pro dosi 8:00 pro die. Sen następuje w 1/2 godziny, trwa 7—9 godzin.

Rp. Chlor. amid. 10:00,

Aqu. dest. 120:00,

Syrup rub. 30:00.

DS. Przed spaniem 2—4 łyżek.

Przy dłuższem używaniu dużych dawek pojawia się wysypka z towarzyszącą gorączką.

100 grm. 1 zhr. 80 ct.

Chloralurethanum = Uralium.

Powstaje przez rozpuszczanie urethanu w roztworze chloralu. Środek nasenny, dobry, zwłaszcza dla suchotników, nerwowych i umysłowo chorych.

Dawka 2—3:00 pro dosi (w opł.).

Cornutin.

Według Koberta, najskuteczniejszy alkaloid sporyszu. Silnie trujący. Używa się przy krwotokach po poronieniu i wogóle z narzędzi moczopłciowych.

Dawka: 4 r. dzień. w proszku lub pigułkach po 1/4 ctgr.

1 gramm = 19 zhr. 50 ct.).

Creosotal v. Creosotum carbonicum.

Gąszcz, podobny do miodu, przeźroczysty, w wodzie nierozpuszczalny. Za dodaniem wyskoku więcej płynny. Bez zapachu, ma smak nie tak szczypiący jak kreozot. Podaje się w dawkach do 6 grm. pro die.

Creosotal H. 3 zhr. 80 ct.

Cytysinum.

Alkaloid z Cytisus Laburnum, silna trucizna, działa podobnie jak Curare i Strychnina. Środek dotąd niewypróbowany.

Dermatol.

Proszek barwy szafranowej, bezwonny, nierozpuszczalny. Jestto połączenie bismutu z kwasem gallusowym. Użyć go można w miejsce jodoformu, a mianowicie: na oparzeliny, owrzodzenia, na rany, w otoku usznym itp., jakoteż zdaniem Liebknechta zamiast bismutu w uporeczywych biegunkach i owrzodze-

niach kiszek. Dr Gläser wyraża takie zdanie o Dermatolu: 1. zupełnie nietrujący, 2. niedrażniący, 3. dobry antyseptyk, posiada własności osuszające i do brze się daje zachować.

Dawka do wewnątrz po 2 grm. pro die.

*Rp. Dermatol 20·00,
Talcu veneti 70·00,
Amyli 10·00.*

S. Do posypek (przeciw potowi nóg).

*Rp. Dermatol 10·00,
Lanolin 80·00,
Vaselin 10·00.*

Mf. ungu. Maść na wrzody.
(100 grm. 2 złr. 40 ct.).

Diaphtherinum (Oxychinasetol).

Proszek żółty we wodzie rozpuszczalny, posiada własności antyseptyczne. Próby w praktyce chirurg. dały dobre wyniki, zwłaszcza że mniej trujący od karbolu i sublimatu, jednak do desinfekcyi narzędzi niestosowany, gdyż je czerni. Używa się w roztworach $\frac{1}{2}$ —2% do opatrunku.

(100 grm. = 2 złr.).

Diuretin.

Środek moczopędny. Jestto połączenie Theobrom. (48% z Natr. Salicyl. Proszek biały w wodzie rozpuszczalny. Działa moczopędnie, nie wpływa ani na serce, ani narząd oddechowy i nie drażni nerek. Stosuje się w przewłocznych chorobach nerek, mianowicie przeciw puchlinie.

Dawka 1—2 grm. pro dosi do 6 lub 7 grm. pro die.

*Rp. Diuretin 5·00,
Aq. dest. 90·00,
Aq. menth. pip. 100·00,
Syrup simpl. 10·00.*

DS. Co 2 godziny łyżkę.
(100 grm. kosztuje 7 złr.).

Duboisinum sulphuricum.

Środek nasenny. Lewald zastrzykiwał z roztworu 0·04:20 wody jedną strzykawkę = 0·002. Pierwszym objawem: mydriasis, niepokój, po 10—30 min. sen trwający 2—7 godzin, czasami jednak przed zaśnięciem zawrót głowy, zmęczenie, zasychanie w gardle, pragnienie.

Dawki 0·002 nie wolno przekraczać. Wewnętrznie użyty nie sprawia skutku.

Euphorinum = Phenylurethannum.

Proszek rozpuszczalny w mieszaninie wody z wyskokiem (np. winie). Środek przeciwgorączkowy. Działanie trwa 5—7 godzin. Rozpoczynać dawkę od 0·10 i można postąpić od 1—1·50 pro die. W reumatyzmie dawki 1—2·0 usuwają ból, gorączkę i obrzmienie.

E. używa się również jako antisepticum w maściach, roztworach i wykazano działanie lepsze aniżeli jodoformu, zwłaszcza, że działa ściągająco, nie wywołuje granulacyi i ma zapach przyjemny.

Dawka 0·50 do 1·00 pro dosi, 1—2·00 pro die.

(100 grm 5 złr.).

Europhen. (Isobutylortocresoljodid).

Delikatny żółty proszek rozpuszczalny w wyskoku chloroformie, eterze i oliwie. Środek antyseptyczny, posiada zupełnie te same własności, co jodoform, przewyższa go jednak tem, że jest bezwonny.

*Rp. Europhen 2·00,
Vaselin
Lanolin āā. 50·00.*

Mfunguent. S. Maść.

(*ulcus cruris*).

Exalginum = Methylacetanilid.

Krystaliczne białe igielki, bez smaku i zapachu, w zimnej wodzie trudno rozpuszczalne, łatwiej w ciepłej. Obniża ciepłotę ciała, działa jednak głównie kojąco. Nie wpływa na krążenie i oddychanie (jedynie powyżej 0.75 bywa lekka sinica). Używa się w nerwobólach, zwłaszcza twarzy, u osób anaemicznych i dotkniętych kiłą. Przy migrenie bez skutku. Działa też dobrze w reumatyzmach, kolce nerkowej. Chorea itp.

Dawka 0.10—0.25 dwa lub więcej razy dziennie, do 1.50 pro die. Podaje się jako proszek w opłatku lub np.

Rp. Exalgin 2.50,
Alcohol menth. 15.00,
Aqu. dest. 190.00,
Syrup 30.00.

DS. Co 2 godz. łyżkę (1 łyżka zawiera 0.20 exalg.).
(10 grm. 70 ct.).

Exodyna.

Ogłoszona jako silny środek przeciwgorączkowy, w cierpieniach reumatycznych i nerwobólach składa się z 90% Antifebryny, 5% Natr. Salicyl. i 5% Natr. bicarb.

Gallanol

jest anilidem kwasu pyrogallusowego (a nie Gallolu). Proszek biały krystaliczny, smaku gorzkiego rozpuszcza się łatwo w gorącej wodzie, wysoku. Używa się w maściach 1:30, 1:10, 1:4 z Vaseliną głównie przy psoriasis, wilgotnych eczemach. Przy psoriasis pędzluje się miejsca zajęte, wymywszy poprzednio czarnem mydłem, i pokrywa warstwą traumatycyną.

Rp. Gallanol 10.00,
Spiritus 50.00,
Liq. ammon. caust. 1.00.
MDS. Pędzlować.

Guajacol.

Płyn barwy żółtawej, ostrego aromatycznego zapachu. Zmniejsza podrażnienie do kaszlu, ułatwia wykrztuszanie. Używany zamiast kreozotu w gruźlicy płuc.

Rp. Guajacoli 7.50,
Tinct. Chinae 20.00,
Vini malacens 1000.00.

DS. Łyżkę lub 2 przy każdym jedzeniu do 1 gram pro die.

Rp. Guajacoli 3.00,
Ol. jecor. aselli 200.00.

S. 3 razy dz. łyżkę po jedzeniu, lub też w kapsułkach gelatynowych, albo, gdy po pewnym czasie chorzy znosić nie mogą w lewatywie:

Rp. Guajacoli 2.00,
Ol. amygdal. 20.00,
Gum. ar. 10.00,
F. emul. adde
Aqu. dest. 950.00.

S. Na 4 lewatywy.

Guajacolum benzoicum et G. carbonicum.

Można użyć w większej od poprzedniego dawce. Identyczne z Benzozozolem.

(100 grm. 4 złr.).

Haemol i haemogallol.

Nowe, organo-metaliczne związki, żelaza, ulegające w ustroju szybkiej resorbcji, a nie obciążające trawienia. Oba te związki powstają pod wpływem ciał odtleniających na haemoglobinę, a mianowicie Haemol działaniem pyłku cynkowego, Haemogallol przez redukcję pyrogallolem. Haemol jest proszkiem szarym, Haemogallol czerwono-brunatnym.

Dawka po 0'10—0'50 trzy razy dziennie, w opłatku, lub pastylkach. Haemol zawiera ślad cynku, obliczony na gojenie owrzodzeń żołądka i kiszek.

Hematogen.

Organiczny związek żelaza. Powstaje z rozpuszczenia białka w ługu potasowym, do przesączonego płynu dodaje się winianu żelaza i roztwór osadza, dodając kw. octowego. Osad składa się z organicznego związku żelaza i po wysuszeniu tworzy żółtawy proszek łatwo rozpuszczający się w alkaliach i zawiera 0'70% żelaza.

Hydracetinum = Pyrodinum.

Białe, bez smaku kryształki, w wodzie trudno, w wysoku łatwo rozpuszczalne, używa się przeciw reumatyzmowi i w chorobach gorączkowych, Ischias, po 0'02—0'05 dwa razy dzień. Również przeciw Psoriasis w maści 10%. Środek trujący, wywołuje czasem Haemoglobinurię, żółtaczkę, zapad.

Hydrargyrum benzoicum.

Proszek biały, krystaliczny, bez smaku i woni w wodzie nierozpuszczalny; łatwo natomiast w wysoku i roztworze soli kauchennej. Używa się do okładów na wrzody syfilityczne w równej ilości ze solą (0'10:25'00—50'00).

Rp. Hydrarg. benz.

Vaselin āā. 1'00,

Ol. Paraffini 8'00.

S. Do inj. podskórnych.

(100 grm. 30 ct.).

Hydrargyrum carbolicum.

Środek przeciwkółowy podaje się w pigułkach po 0'02—0'03, 3 razy dziennie. Dzieciom po 0'004—0'005 dwa razy dziennie.

Rp. Hydrarg. carbolici 1'20,

Extr. liquir.

Pulv. liq. āā. 3'00,

Mfpil. 60. Obduc. Bals. tolut.

S. 2—4 pig. dziennie.

Hydrargyrum B. naphtholicum.

Poleczony na rany zadawnione, wysypki skórne itp. Bliższych opisów dotąd nie ma.

Hydrargyrum salicylicum.

Podaje się do wewnątrz po 0'01—0'025 w pigułkach 2—3 razy dz. przy czym poleca się popić ciepłym mlekiem.

Do iniekcji podskórnych, oraz do okładów, zasypek, maści na wrzody syfilityczne, Condylom. lata itd.

Rp. Hydrarg. Salicyl. 1'00,

Extr. et pulv. liquir. q. s.

f. pil. 60.

S. 3 razy dzień. po jedzeniu 1—2 pig. (Schadek).

Rp. Hydrarg. Salicyl. 0'20,

Mucilag. g. ar. 0'30,

Aqu. dest. 60'00.

S. Do wstrzykn. wśródmięsn.

Rp. Hydrarg. Salicyl.

Kali carbon. āā. 0'10,

Aqu. dest. 10'00.

S. Do podskórnej iniekcji.

Rp. Hydrarg. Salicyl. 1'00,

Vaselin 30'00.

Mf. ungu.

Rp. Hydrarg. Salicyl. 1'00,

Magnes carbon. 20'00.

S. Zasypka. (Plumert).

(100 grm. 2 złr. 80 ct.).

Hydrargyrum thymoloaceticum.

Środek przeciwkółowy w dawkach 0'005—0'01. W ostatnim czasie używał Tranjen (w Bułgarii) tego przetworu w celu leczenia gruźlicy. Brak dotąd doświadczeń.

*Rp. Hydrarg. thymol. acet. 1·00,
Glycerin 10·00,
Cocain. hydrochl. 0·10.*

S. Do wstrzykiwań wśródmiej-
śniowych, 1 strzykawka pro-
dos., raz na tydzień. (We-
dług Loewenthala potrzeba
do zupełnego wyleczenia Sy-
filis 8—10 zastrzyknięć).

Hydrastininum.

Białe krystaliczne igielki, roz-
puszcza się trudno w wodzie,
łatwo w wyskoku, eterze. Le-
piej używać hydrochloricum.
Falk używał z dobrym skutkiem
przy Endometritis, Dysmenor-
hoea, nieregularnej miesiączce
co dzień po $\frac{1}{2}$ strzykawki, 10%
rozczynu t. j. 0·05.

*Rp. Hydrastinin. hydrochl. 1·00,
Aqu. dest. 10·00.*

S. $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki dziennie
w razie krwotoku.

(1 grm. 1 złr. 20 ct.).

Hydroxylaminum. H. hydro- chloratum.

Używa się w chorobach skór-
nych w miejsce chrysarobiny i
kwasu pyrogallusowego, przeciw
psoriasis, lupus, w rozczywie 1%
wyskokowym. Środek trują-
cy wymaga wielkiej ostrożności.

*Rp. Hydroxylamin mur. 0·20—
0·50,*

Spir. vini 100·00,

Calcar. carb. q. s. ad neutr.

S. Do pędzlowań.

Hyoscin, H. muriaticum, H. hydrobromicum, H. hydro- jodic.

Rozszerza źrenicę również, jak
atropin, tylko prędzej, działanie
jednak trwa krócej. Używa się
do zakraplań 1:1000 do 1:400;
z pierwszego rozczywu wkrapla

się 10—15 kropli, z drugiego 4—
6 kropli. Gdzie chodzi o uspo-
kojenie podrażnienia umysłowo-
chorych, ma działać wybornie,
pisze Rabow. Chorym takim da-
wał zazwyczaj w wodnym roz-
czynie (a nie podskórnie).

*Rp. Hyoscin. hydrojod. 0·01,
Aqu. dest. 10·00.*

Pierwsza dawka 8 kropli ($=\frac{1}{3}$
miligr.) we wodzie, mleku lub
winie, później można dojść do
12 kropli, a nawet 16 pro die.
H. działa silniej, niż Hyosacya-
mina.

(1 grm. 4 złr.).

Hyoscyaminum.

Alkaloid z hyoscyamus niger,
w postaci błyszczących igielek,
bez woni, ostrego smaku. Zwy-
czajnie sprzedają go w proszku
zanieczyszczonym Hyoscina. U-
żywa się jako mydriaticum, za-
miast atropiny.

Jako środek nasenny w cho-
robach umysłowych od 1—3 mi-
ligramów, jako anodynum i anti-
spasmodicum, $\frac{1}{2}$ —1 miligr. w pi-
gułkach, przeciw astmie, koklu-
szowi, epilepsji.

(1 grm. 5 złr.).

Hypnolum.

Połączenie antypyryny z chlo-
ralem. Kryształy bez smaku i za-
pachu, rozpuszczające się w 5—
6 częściach wody. Środek na-
senny, nie posiada złego smaku
i żrących własności chloralu
(1 grm = 0·45 chloralu i 0·55
antypyryny). Dawka 0·50 do 1·00
działa silniej, niż równa ilość
chloralu. Szczególniej stósowny
dla dzieci.

(10 grm. 60 ct.).

Bonnet podaje następujący
przepis:

Rp. *Hypnali* 10·00,
Aqu. dest. 65·00,
Aq. flor. aurant. 5·00,
Spir. vini 40·00,
Tinct. cort. aur. 20·00,
Syrup simpl. 60·00,
Trae croci gtt. 2.

MDS. 1—2 łyżek użyć.

Rp. *Chartreuse* 4·00,
Aqu. dest. 15·00,
Hypnal 1·00.

S. Na raz użyć. Bardet.

Jambul.

Owoc drzewa *Syzygium Jambolanum*. W ostatnich latach gorąco polecany jako specyfik w moczoźwie cukrowej, zmniejszający znacznie ilość wydzielanego moczu i cukru. Podaje się najwygodniej w postaci proszków, w opłatku, jako fluidextract, lub Tinctura. Środek nietrujący, można podawać w dość wielkich dawkach. Zwyczajnie rozpoczyna się od 0·25—1·00—3 razy dziennie. (Lewaschew podawał 20—40·00 pro die).

(Fructus *Syzygii Jambolani*
 100 grm. = 40 ct.).

Jodolum.

Żółtawo biały proszek w wodzie trudno rozpuszczalny (1:5000) zawiera 89% jodu, bez smaku, ze zapachu podobny do tymolu. Jako antyseptyk do zasypek. Do wewnątrz, jako środek przeciwkiłowy 1·00 pro die. Ma tę wyższość nad jodoformem, że jest bez woni i mniej trujący. Nie tworzy takiej skorupy, jaka bywa przy jodoformie. W okulistyce używa się w formie maści 2:10, przeciw Conj. chron. et granulosa.

(100 grm 7 złr.).

Jodantipyrinum.

Działa raz jako antipyrina, to znowu jak sól jodowa. W durze

i gruźlicy działa jak antipyrina. Dotąd nie wyjaśniono, czy ma wyższość nad czystą antipyriną. Dawka 0·50—1·50.

Jodantifebrinum.

Środek zupełnie zbyteczny.

Jodophenin.

Witkowski przypisuje temu środkowi własności przeciwprąt-kowe, dotąd nie podano jednak, w jakim kierunku.

Lobelinum.

Z liści lub nasienia *Lobel. infl.* Płyn żółty, oleisty, ostrego smaku. Używa się częściej jako *Lobelinum sulphuricum* (proszek żółtawy) przeciw astmie i nieżyłtowi oskrzeli.

Dawka: 0·05—0·10 pro dosi 0·20 pro die, dzieciom 0·01—0·05.

Środek niepewny.

Losophan. (Trijodkresol, zawiera 80% jodu).

Białe krystaliczne igiełki, rozpuszczalne w chloroformie, eterze. Używano z dość dobrym skutkiem w chorobach skóry: Herpes tonsur., Pityriasis, Eczema chron. Prurigo, Pruritus, Acne, Sycosis. Przeciwwskazanie w ostrych zapaleniach skóry. Używano roztworu 1% do pedzłowań (1:75 Spir. i 25 Aq. dest.). W maści (1:30). zasypka 1%.

Lysol.

Płyn przeźroczysty, brunatny (oleisty), zapachu kreozotu, miesza się z wodą i nie sprawia zmętnienia. Posiada własności antyseptyczne kw. karbolowego, jest jednak mniej trujący. Zgęszczony nadżera skórę. Ujemna strona L. polega na tem, że skórę i narządza czyni ślizkimi, co przy operacjach może być niekorzystnem. Do opatrunku

używa się rozczyynu $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}\%$. W rozczyynie $3\frac{3}{4}\%$ posiada własności mydła (pieni się).

Methacetinum = Para = Acet-anisidin.

Proszek różowawy, bezwonny i bez smaku, w wodzie rozpuszczalny. Środek przeciwgorączkowy, kojący bóle nerwowe silniej, niż phenacetyna. Działa poniekąd antiseptycznie. Używano ze skutkiem przy gruźlicy, tyfusie, reumatyzmie stawów. Dawka: dzieciom 0.20—0.30, do rośnię 0.30—0.40.

Methylalum.

Płyn bezbarwny, lotny, łatwo w wodzie rozpuszczalny, smaku aromatycznego, piekącego, zapach jakby eteru octowego zmieszanego z chloroformem.

Zewnętrznie w linimentach i maściach 5:30 jako środek łagodzący ból. Do wewnątrz: w stosunku 1:150; jakoteż do wstrzykiwań podskórnych. Ma być doskonałym środkiem nasennym. Używa się przeciw nerwicom żołądka i kiszek, przy delirium tremens, i jako odtrutka przy otruciu strychniną.

Dawka: 1—5 gm. — podskórnie 0.10 bez dodatku) co 2 godz. (Wstrzykiwania są bolesne).

Methylacetanilid zob. Exalgin.

Morrholum.

Produkt tranu, zawierający znaczne ilości jodu, siarki i fosforu. Gorzki, aromatyczny. Działa jak tran.

Dawka 0.20 (=5.0 tranu) w kapsułkach, dla dzieci 4, dla dorosłych 6 sztuk dziennie.

(100 gm. 1 złr. 60 ct.).

Myrtholum.

Jest częścią składową olejku z liści myrtus communis. Ciecz jasna dość znośnej woni. Podaje się w zgorzeli płuc i cuchnącej wydzielinie z oskrzeli. Najlepiej używać w kapsułkach napełnionych po 0.15 myrtolem. Co 2 god. 2 kapsułki. Skutek ma być często zdumiewający.

(100 gm. 4 złr. 50 ct.).

Naphthalolum zob. Betol.

Natrium paracresotinicum.

Działanie podobne do kw. salicylowego. Demme podawał dzieciom przy gościu stawowym, pneum. catarrh, typhus abd. z dobrym skutkiem, stosując małe dawki (0.10 co 2 godz.):

Mianowicie zaś:

	pro dos.:	pro die:
od 2—4 lat	0.1—0.25	0.50—1.0
" 5—10 "	0.25—1.00	2.50—3.0
" 11—16 "	1.0—1.50	3.50—4.0

W razie zapadu: (wyjątkowo) Cognac z wodą.

Najlepszy skutek okazał się przy Catarrhus gastro intestinalis acut. u dzieci, podawano następującą mieszaninę:

Rp. Natri paracresotinici 0.10—0.20,

Tinct. Opii gtts. 2.

Cognac 1.00,

Syrup gummosi 5.00,

Aqu. dest. 25.00.

DS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Nucleinum.

Wyciąg ze śledzion cielecych, ma posiadać własność pomnażania białych ciałek krwi. Proszek bezbarwny rozpuszczalny tylko w alkaliach. Wstrzyknięty w dawce 2—3 gr. działa podobnie jak Tuberkulina, tylko nie tak gwałtownie.

Oesypus.

Nieczyszczony tłuszcz z wełny owczej (po oczyszczeniu otrzymuje się Lanolinę). Znany jeszcze za Herodota jako kosmetyk i środek do gojenia ran. Obecnie wraca do swoich praw i polecany szczególnie przy eczema:

Rp. Oesypi

Ol. olivar. āā. 10'00,

Zinci oxydati

Amyl. q. s. f. pasta mollis.

Oleum hydrargyri vel cinereum.

Gęsty olej złożony z 3 części rtęci utartej z Lanoliną i dodatkiem 4 części ol. olivar. Używa się do podskórnych wstrzykiwań przy leczeniu kily. Przed użyciem należy olej ogrzać. Wstrzykiwania skutecznia się co 5 lub 8 dni po 0'10 do 0'15. Do wyleczenia wystarcza podobno 2—3 tygodni.

Oleum Gurjun.

Balsamum G. Murell poleca go w miejsce Bals. Copaive, gdyż nie sprawia pieczenia w przełyku i biegunki, ani wysypki nie wywołuje. Służy też jako środek wykrztuśny przy Bronchitis, w chorobach skóry, zwłaszcza Elephantiasis.

Dawka 2—4'0 dziennie 2 lub 3 razy. W celu poprawienia smaku zapisuje się na 2 części balsamu, 10 części ekstraktu słodow.

Orexinum v. O. hydrochloricum.

Bezbarwne błyszczące igielki, rozpuszczają się we wodzie łatwo; smaku gorzkiego. Zostawia uczucie pieczenia na języku i w przełyku. Polecona jako Stomachicum przy braku apetytu, blednicy, gruźlicy, osła-

bieniach i t. p. Wywołuje uczucie głodu.

Dawka 0'20—0'50 pro die, już to w opłatku, już w pigułkach.

Ze względu na drażniące właściwości, należy popić większą ilością rosółu, herbaty, mleka, lub kawy. Najlepiej zażywać między 7—9 godz. rano, gdyż skutek pojawia się w 3—4 godzin.

Doświadczenia ś. p. Dra Podgórskiego w Szpitalu św. Łazarza wykazały niejednostajność działania.

(O. hydrochlor 10 gr. 1 złr. 60 ct.).

Orthinum, O. hydrochloricum.

Środek przeciwgorączkowy. Ostrzegają jednak przed używaniem onegoż Prof. Kobert i Unverricht, gdyż sprawia dreszcze, nudności, wymioty.

Pental czyli trójmetyetylen

Płyn bezbarwny, nierozpuszczalny we wodzie, natomiast w każdym stosunku w chloroformie, eterze i wysokoku. Łatwo zapalny i niezmiernie lotny, przeto wymaga ostrożności. Używa się do narkozy zapomocą wziewań, jak chloroform (w celu zaoszczędzenia tego dość drogiego środka, najodpowiedniejsza maska Junkera). Zapach podobny do oleju gorczycznego. W celu uspiania na krótki przeciąg czasu wystarcza 5—10'00. Uspienie występuje w 1—3 minut. Doświadczeń o skutkach przy dłuższej trwających operacjach dotąd nie ma.

Dotychczasowe badania wykazały niebezpieczeństwo przy użyciu P.

(100 grm. 3 złr.).

Phenocollum hydrochloricum

czyli Amido-acet-para-phenitidin, nowy środek przeciwgorącz-

kowy i przeciwościcy na równi z Antipyriną, Phenacetyną.

Proszek biały, rozpuszcza się w 16 cz. wody. Prof. Mering spostrzegł po jedno-gramowej dawce (u chorych z zapal. płuc i tyfusem) spadek ciepłoty o 2° C. bez zapadu i sinicy. Działanie trwa 2 godziny, podwyższanie się ciepłoty występuje bez dreszczu i bez potów. W reumatyzmie po 5 grm. pro die, zmniejsza ból.

Lekarze włoscy polecają Ph. przeciw zimnicy od 0·50—1·50 pro die. Dla dzieci środek nieodpowiedni.

Dawka 0·50—1·00 pro dosi (co 2—4 godziny), do 5·00 pro die.

Phenosalyl.

Mieszanka 9 cz. Kw. Karbol. 1 cz. Kw. Salicyl. 2 cz. Kw. mlecznego i 0·10 Mentolu. Ciecz gęsta przeźroczysta, zapachu mniej drażniącego od karbolu, w wodzie rozpuszcza się łatwo (4:100). Zastosowanie jak Kw. Karbolowego do desinfekcyi, opatrunków, przestrzykn. 1—2%.

Phenyluretan zob. Euphorinum.

Photoxylinum.

Rodzaj Collodium z wełny drzewnej, pozostawia grubszą i mocniejszą warstwę niż zwykłe Collodium.

Pichi - Pichi

extractum fluidum (fabr. Merck) ciecz ciemnobrunatna, przyjemnego zapachu, mocno gorzka. Szczególniej korzystne działanie w chorobach dróg moczowych, Cystitis, Prostatitis, Gonorrhoea acut. zwłaszcza, gdzie znacznie-sze wydzielanie ropy. Równej wartości co Capaiva, Santał, ol. terpent. przewyższa je gdyż, jako amarum i aromaticum, pobudza

czynność żołądka. Dawka 3 razy dziennie łyżeczkę.

Picrotoxinum.

Środek mocno trujący zalecony przeciw padaczce, eclampsyi. Odrutka na morfinę.

Dawka w pigułkach po 0·001—0·005.

Piperazinum.

Przedstawia się w postaci krystalicznych igiełek, łatwo w wodzie rozpuszczalnych. Posiada smak salmiaku — rozpuszcza znaczną ilość kwasu moczowego, używa się przeto w cierpieniach artrytycznych, kamieniach nerkowych i pęcherza. W wielu przypadkach spostrzegano skutek dobry, zachęcający do dalszych prób. Podaje się w dawkach 1 grm. pro die, we wodzie sodowej lub giesshübelskiej (Zapisywać w 1-gram. flaszeczkach, gdyż przyciągając wodę rozplywa się). Do przepłukania pęcherza 1—2%. Do okładów na artrytyczne obrzęki:

Rp. Piperazini pur. 1·00,

Spir. rectif. 20·00,

Aq. dest. 80·00.

(1 gram 40 ct.).

Podophyllotoxinum.

Głównie działający składnik Podophyllum peltatum. Bardzo silnie trujący.

Pyoctaninum.

(Z greckiego pyon: ropa, kteino zabijam). Są to barwiki anilinowe. (P. coeruleum: Methylviolet, P. aureum: Auramin).

Środki antyseptyczne, sprawiają rychle powstawanie strupów i zabliznienie. P. coeruleum używa się w substancyi, w roztworze 1:1000—1:100, jako zasypka (2%), w maści (2%) na ropiejące rany, eezem i t. p.

P. aureum używa się w okulistyce.

Plamy z Pyoctaniny oczyszcza się spirytusem mydlanym.

(10 grm. 42 ct.).

Pyridinum.

Płyn bezbarwny, przenikliwej woni. Używa się przeciw astmie do inhalacyi, wachając go od czasu do czasu z flaszki. Polecają też przeciw rzerzaczce:

Rp. *Pyridini* 0·03,

Aqu. dest. 90·60.

DS. Raz na dzień wstrzyknąć.

Rademaker twierdzi, że do leczenia potrzeba 3—4 iniekcij.

(100 grm 70 ct.).

Pyrocinum zob. Hydraceticum.

Salacetal.

połączenie Kw. Salicylowego z Ącetolem. Proszek krystaliczny białawy w wodzie nierozpuszczalny smaku nieco gorzkiego. Zdaniem Dra Bourgeta działa znacznie skuteczniej od Salolu, zwłaszcza w biegunkach, czerwonce. Dawka 2—3 grm. najlepiej z ol. ricini.

Rp. *Salacetal* 2—3·00,

Ol. ricini 30·00.

f. solut.

S. Rano na czczo użyć, w razie potrzeby na drugi i trzeci dzień. Dzieciom po 0·50.

(H. 6 złr. 50 ct.).

Salicylamidum, związek stanowiący amid. kw. Salic.

Krystaliczne żółte blaszki rozpuszczalne w eterze, wysoku, a w wodzie 1:250. Mocz po użyciu S. można miesiacami zachować bez zepsucia. Bez smaku. łatwiej rozpuszczalny we wodzie, niż kwas Salicylowy, działa podobnie do tegoż i uży-

wa się w nerwobólach i chronicznym reumatyzmie.

Dawka po 0·15 co godzina. Pro die 1·00.

Salipyrinum vel Antipyrinum salicylicum.

Jestto biały i bezbarwny proszek krystal. trudno w wodzie rozpuszczalny.

Środek przeciwgorączkowy, zwłaszcza przy reumatyzmie stawowym zachwalany. Sprawia czasem wysypkę.

(Pewniej i skuteczniej zapisywać osobno Antipyrinę a osobno Natr. Salicyl.).

Dawka pierwsza 2·0 następnie co godzina po 1·0 do 6·0 pr. die.

(100 grm. 5 złr. 70 ct.).

Salolum = Phenolsalicylat.

Biały proszek krystaliczny, bez smaku i zapachu, w wodzie nierozpuszczalny, natomiast łatwo w wysoku i eterze. Środek antyseptyczny i przeciwgorączkowy. Mocz po użyciu S. zabarwia się, jak przy karbołu. Używa się przeciw cholerze, dysenterji, w chorobach pęcherza, reumatyzmie. Jako antyseptyk w proszku, w maściach podobnie jak jodoform.

Dawka 0·50—1·0 pro dosi (w opłatku) do 5·0 dziennie.

Rp. *Salol* 4·00,

Cocain mur. 0·25,

Vaselin 30·00.

Mf. ung. S. Maść na oparzenie.

(100 grm. 2 złr.).

Salophenum (Acetylparamidosalol).

zawiera 50% kw. salicylowego. W postaci blaszek krystaliczn., bez smaku i zapachu, rozpuszcza się cokolwiek w wodzie gorącej, znacznie więcej w eterze i wysoku. Działa podobnie jak

kw. salicylowy, jednak słabiej. Dawka dzienna (w proszkach) najmniej 4 grm., można zwiększyć do 6 i 7 gr.

Rp. Salopheni 1'00,

Dtur. tal. dos. X.

S. Co godz. proszek.

(100 grm. 8 złr. 75 ct.).

Simulo.

Owoc z *Capparis coreacea*. Tinkturę z nasion polecają przeciw hysteryi i padaczce.

Solaninum.

Środek przeciwkureczowy zwłaszcza przeciw bólom u tabetyków w dawce 0'025—0'03 jako nasenny, w pigułkach, proszkach. Podskórnice w roztworze wodnym po 0'01.

Jestto środek mocno trujący.

Solveol.

Przeźroczysty, obojętny roztwór krezolu, którym wraz z fenolem jest produktem z węgla kamiennych. Środek ten posiada nader silne własności desinfekcyjne. S. przewyższa w działaniu Creolinę, Lysol a nawet i kw. karbolowy, oddziaływanie jego jest neutralne, roztwory nie są mętne, a przytem nie trujące. Roztwór 0'5% Solv. daje tesame usługi, co 2% kw. karbolowy. Wobec tych zalet nadaje się do praktyki chirurgicznej.

(1 kilogr. 1 złr. 85 ct.).

Solutol

jest krezolem przeprowadzonym w stan rozpuszczalny przez dodanie do niego krezolanu sodu. Posiada on silne własności desinfekcyjne. Ze względu na silne alkaliczne własności i formę zewnętrzzną nie nadaje się do praktyki chirurgicznej, służy jednak jako wyborny środek do desin-

fekcyi mieszkań, ulic, sal cho-
rych i t. p.

(1 klgrm. 65 ct.).

Solvinum.

Środek mocno trujący, służy do rozpuszczania salolu, Naph-
tolu, kamfory, przy przyrząd-
zaniu maści.

Somnal.

Środek nasenny. Według ba-
dań Lutze'go okazało się, że jest
szczerem Chloralurethanem, roz-
puszczonym w wysoku. Dawka
2—4 grm. na noc, w wodzie ocu-
krzonej.

(100 grm. 2 złr. 10 ct.).

Sozal.

Sól glinu i kw. parafenolsul-
fonowego. Ziarna krystaliczne
smaku ściągającego, zapachu fe-
nolowego. Rozpuszcza się w wo-
dzie i wysoku. Środek antise-
ptyczny, posiada tę zaletę, że
roztwory jego nie ulegają zmia-
nom.

Sozjodolum.

Połączenie jodu z karbolem,
Kryształki bez zapachu, łatwo
rozpuszczalne we wodzie, wy-
skoku i glicerynie. Środek an-
tiseptyczny, w miejsce jodoformu
używany.

Przeważnie jednak polecane
są następujące połączenia:

Hydrargyrum sozjodolicum,
proszek pomarańczowej barwy
(31% Hdrgr. i 38% Jodu). W ma-
ściach 1:50 do 1:10.

Lithii sozjodol. w reuma-
tyzmie stawów:

Rp. Lithii sozjodol 0'50—1'00,

Sacchari 1'00,

Tal. dos. 20.

S. 3 pr. dz.

Kalium sozjodol. przeważnie
w maściach i proszkach.

*Rp. Kali sozojodol 3'00,
Lanolin 30'00.*

Mfu. S. Maść na rany i oparzenia.

*Rp. Kali sozojodol 5'00,
Talcu venet 50'00.*

S. Puder przeciw potom nóg, eczema, do wdmuchiwania do nosa.

Natrium sozojodol. Łatwo rozpuszcz. we wodzie.

*Rp. Natri sozojodol 2'00,
Aqu. dest. 200'00,
Aqu. colon. 20'00.*

S. Woda na włosy do przemywania głowy.

Zincum sozojodol. do zasypek (10:100) lub n. p.

*Rp. Zinci sozojodol. 2'00,
Aqu. dest. 100'00,
Glycerin 5'00.*

S. Do przestrzyk. ucha.

Przetwory sozojodolu używają się głównie do opatrunku ran, w chorobach skóry, krtani, ucha: wewn. przeciw reum. stawów. (Sozojod. natr. 100 gm. 4 złr. 70 c.).

Strontium bromatum.

Krystaliczne igiełki łatwo rozpuszczalne we wodzie i wysoku. Seé używał z dobrym skutkiem w chorobach żołądka, dyspepsyi, gastralgii, z dobrym skutkiem używano przeciw wymiotom, (1 gm. pro dosi, 1—3 gm. pro die).

Dawka 2—4'00 pro die.

*Rp. Strontii bromati 20'00,
Aqu. dest. 300'00.*

MDS. 2 do 3 łyżek dziennie.

(100 gm. = 75 ct.).

Strontium lacticum.

Proszek biały, ziarnisty, we wodzie łatwo rozpuszczalny. Dujardin Beaumetz i Paul stwierdzili skuteczne działanie w chorobach nerek, a mianowi-

cie Nephrit. parenchym., w białkomoczu u ciężarnych i gruźliczych. Ilość wydzielanego białka zmniejsza się b. znacznie i stan ogólny się poprawia. Laborde uważa Str. 1. jako skuteczny środek przeciw tasiemcowi.

*Rp. Strontii lactici 50'00,
Aqu. dest. 250'00.*

MDS. 2 do 3 łyżek dziennie.

*Rp. Strontii lactici 30'00,
Syrup aurant. 200'00.*

MDS. Łyżka zawiera 3 gm. Str. lac.

*Rp. Strontii lactici 20'00,
Aqu. dest. 120'00,
Glycerin 30'00.*

MDS. Przez 5 dni po 2 łyżki (przeciw tasiemcowi). Laborde.

Strophantin.

Główny składnik z nasienia Strophantusa. Jestto środek bardzo trujący i z powodu braku pewnych doświadczeń, niepowinien być jeszcze używanym.

Sulphonalum.

Środek nasenny. Biały, krystaliczny proszek, bez smaku i zapachu, rozpuszcza się w 500 cz. wody zimnej, a w 15 gorącej. Środek nieszkodliwy. Działa nie tak szybko, jak chloral, lecz za to dłużej, lepszy od Amylenhydratu lub Paraldehydu. Używany w chorobach umysłowych, nerwowych (Trismus neonator. po 0'20 w lewatywie). Przy Diabecie zmniejsza ilość cukru w moczu. Przeciw potom u suchotników. Dawka 0'25—0'30 w opłatku co $\frac{1}{2}$ godziny 3—5 razy. Chorem umysłowo 2—3'00. Diabetykom 1—2 gm. Najwyższa dawka 4'00 pro dosi 6'00 pro die.

Po zażyciu 2 gm. dziennie spostrzegano już czasem czerwono-brunatną barwę moczu — ja-

ku objaw zatrucia — w takim razie natychmiast zaprzestać.

Rp. Sulphonali 4'00,

Aqu. dest. 100'00,

Syrup aurant. 20'00.

DŚ. Połowę na raz użyć.

(100 grm. 1 złr. 80 ct.).

Terpinolum.

Płyn bezbarwny, lotny, w wodzie nierozpuszczalny. Środek wykrztuśny w nieżytach dróg oddechowych w celu zwiększenia wydzieliny. Dawka 0'10 pro dosi.

Rp. Terpinoli

Natri benzoici āā. 1'00,

Sacch. q. s. f. pil. 10.

S. 5—6 pigułek dziennie.

(100 grm. 1 złr. 80 ct.).

Teucrium.

Wyciąg z Teucrium Scordium, czarniawy płyn ostrego smaku, zapachu czosnku. Mose-tig Morhof zastrzykuje T. w celu wywołania reakcyi w ogniskach chorobowych jak np. zimnych ropniach, zwyrodniałych gruczołach, wilku itp. Po zastrzyknięciu 3 grm. T. czerwieni się skóra, ciepłota w tem miejscu się podnosi, abscess staje się bolesnym. Po otwarciu takich abscessów zabliźnienie szybko następuje. Do wewnątrz podaje się T. w kapsułkach po 0'5 jako Stomachicum.

(4 fiołki po 3 grm. 1 złr. 20 ct., 30 kapsulek 1 złr. 20 ct.).

Thiol = Ichtyolum germanic.

Używa się w chorobach skóry podobnie, jak Ichtyol, jednak temu ostatniemu w dobroci nie-dorównywa.

Thiophendijodid.

Krystaliczne tabletki nierozpuszczalne we wodzie, natomiast

w wyskoku. Użyć można w miejscu jodoformu w proszku lub w postaci gazy 10⁰/₀.

Thioresorcinum.

Proszek bez zapachu i smaku, ma służyć jako środek antyseptyczny w miejscu jodoformu. Działa czasem trująco.

Thiosinamin.

Połączenie należące do grupy eterycznego olejku gorczyczanego poleca Hebra (na kongr. dermatolg.) do wstrzykiwań w tkalinę liszaja żrącego (Lupus), jako środka niesprawiającego zaburzeń w organizmie.

Tolypyrin i Tolysal,

połączenia Antipyriny i kw. salicyl. (Pojedynczo zapisana Antipyrina i kw. salicyl. i skuteczniejsze i tańsze).

Tribromphenol zob. Bromol.

Trionalum et Tetronalum.

Kryształy bez smaku i woni w cieplej wodzie, wyskoku rozpuszczalne. Środek nasenny.

Dawka 1—3'00 pro dosi 4'00 pro die.

(10 grm. 2 złr.).

Tumenolum.

Produkt otrzymany z łupków bitumicznych przez suchą destylację. (Wielkie podobieństwo z Ichtyolem). Stosownie do sposobu, użytego przy wyrabianiu, powstają 3 preparaty: 1) T. venale w postaci gęstej brunatnej cieczy (mieszanki z Tumenol. sulfonu i kw. tumenolo sulfonowego). 2) Tumenolsulfon, nazwany przez Neissera „olejem tumenolowym.“ 3) Kwas tumenolosulfonowy. Używa się do gojenia owrzodzeń, nadżerek, eczema, jako środka suszącego i zmniejszającego stan zapalny:

a) w 2—5% roztworze wodnym do okładów.

b) jako pasta 5—10%.

Rp. Tumenoli 2·50—5·00,

Flor. zinci

Bismut. subnitr. āā. 2·50,

Ung. lenientis

Ung. simpl. āā. 25·00.

c) jako tinctury:

Rp. Tumenoli, Aetheris, Spir.

rectif. Aqu. dest. āā. 15·00.

d) proszek tumenolowy (kwas tumenolosulfon.) do posypek na

owrzodzenia (posmarowane poprzednio tłuszczem.

(T. venale 1 klgr. = 18 zlr.).

Thymacetinum.

Derywat Thymolu, w postaci proszku białego, trudno w wodzie rozpuszcz. Działa podobnie jak Phenacetyna.

Dawka 0·25—1·00. Dokładniejszych opisów dotąd niema.

Uralium zob. **Chloralurethanium.**





WAŻNIEJSZE
KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZAKŁADY
zdrojowo-kąpielowe, wodolecznicze,
galaktoterapeutyczne, klimatyczne, kąpieliska morskie
i sanatoria,
tudzież
wybór najodpowiedniejszych zdrojowisk
do leczenia poszczególnych chorób.

Skrócenia: C. = Celsius.

L. Zkł. = lekarz zakładu.

L. L. = lekarze.

m. = miasto.

mtr. = metrów,

n. p. m. = nad powierzchnią morza.

p. kąp. = pora kąpielowa.

p. pob. = pora pobytu.

p. zdroj. = pora zdrojowa

St. k. ż. = stacya kolei żelaznej.

St. klim. = stacya klimatyczna.

wtrz. = wewnątrznie.

wś. = wieś.

Zkł. = zakład.

ztrz. = zewnątrznie.

Abbazia przy morzu Adryatyckiem, obecnie modna St. klim. zimowa. p. pob. od 15 IX do 15 V.

Atupka w Cesar. rosyjskiem na południowem pobrzeżu półwyspu krymskiego, własność ziemska ks. Woroncowa, osłonięta grzbieciami Jajły, dosięgającej swym wierzchołkiem wysokości 1189 metr. n. p. m., jest wybornem kąpieliskiem morskiem a najprzedniejszą stacyą klimatyczną rosyjską. Powietrze na ogół bardzo łagodne, jednostajnie ciepłe, iście pomorskie. Brak uprzyjemnień wynagradzają przechadzki po wspaniałym parku i tarasowo rozłożonych uroczych ogrodach właściciela.

Abano górno-Włochy, 10 kilm. od Padwy, 31 mtr. n. p. m. cieplice słono jodobromowe, 36—82° C.

Abas-Tuman Ces. rossyjsk. Kaukaz, 1270 m. n. p. m. ma dwie grupy źródeł mineralnych, z tych 1sza obejmuje 3 źródła cieplicy obojętnej do 48° C. zwane Bogatyrskimi; 2ga zaś grupa ma 3 źródła od 33° do 40° C. słabo solankowe, zwane przeciw żółzowemi. Urządzenia zdrojowe są należyte, pomieszkania dla gości dostateczne. — P. zdr. od 1 VI do 1 IX.

Aachen=Akwizgran Prusy nadreńskie, 176 mtr. n. p. m. silne cieplice alkaliczno-muryjatyeczno-siarczane, 45—50° C. urządzenia kąpielne i na porę zimową.

Ahrweiler w Prusach nadreńsk. źródło znane pod imieniem Apollinarisbrunnen, szczawa alkaliczna, w ogromnej ilości (rocznie do 10 milionów flaszek) na handel rozsyłana przez Towarzystwo akcyjne angielskie, dzierżawiące źródło wspomniane. Jestto dowód, co może angielska reklama, skoro blahy ten towar tak wielki ma odbyć.

Acqui Piemont, 140 mtr. n. p. m. liczne słono-siarczane cieplice zdroje, 36—75° C.

Adelheidsquelle=Heilbrunnen Bawaryja, 774 mtr. n. p. m. szczawa jodobromowa słona, przeważnie do rozsyłki używana.

Aix-les-Bains Sabaudyja, 258 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 45° C. znakomite balneotechniczne urządzenia kąpielne przez cały rok do użycia.

Ajaccio Korsyka, St. klim. zimowa. p. pob. od 15 X do 30 IV.

Akwizgran zob. Aachen.

Algier północ. Afryka St. klim. zimowa. p. pob. od 1 XI do 15 IV.

Amelié-les-Bains Francyja, 222 mtr. n. p. m. słynne z balneotechnicznych swych urządzeń i z łagodnego klimatu cieplice siarczane, od 44° do 61° C. Właściwa pora kąp. od 1 V do 30 X, jednak i przez cały rok do użycia.

Arco Tyrol południowy, 93 mtr. n. p. m. St. klim. zimowa, niedawno zaprowadzona. p. pob. od 1 IX do 16 V.

Arnstadt Turyngja, 300 mtr. n. p. m. silna jodobromowa solanka, 24% soli kuchen. zawierająca.

Aussee Styryja (Salzkammergut), 650 mtr. n. p. m. silna solanka, 24.5% soli kuchennej zawierająca.

Baden pod Wiedniem czyli Baden rakuski, 218 mtr. n. p. m. cieplice ziemno siarczane, 26—33. 7° C.

Baden w Szwajcaryi czyli Baden helwecki, 382 mtr. n. p. m. cieplice ziemno słono siarczane, 48° C., urządzenia lazienne i na porę zimową. P. kąp. od 15 V do 30 IX.

Baden-Baden czyli Cieplice szwabskie w W. Ks. Badeńskim, 200 mtr. n. p. m. cieplice solankowe, 65—68° C. najwytworniejsze i najliczniej uczęszczane niemieckie zdrojowisko, klimat bardzo łagodny, licznie używane jako St. klim. przejściowa.

Badenweiler w W. ks. Badeńskim, 422 mtr. n. p. m. cieplice obojętne, 26.4° C. klimat łagodny. P. kąp. od 1 V do 1 X.

Bagnères de Louchon Francya (depart. gór. Garonny), 628 mtr. n. p. m. pyrenejskie cieplice siarczane, 16–68° C. znakomite balneotechniczne urządzenia. P. kap. od 15 V do 15 X.

Bardyów = Bartfeld półn. Węgry, na pograniczu Galicyi, 310 mtr. n. p. m. szczawy wapniowo żelaziste, urządzenia balneotechniczne przestarzałe.

Baréges Francya (Pyreneje), 1232 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 18.8° do 45.3° C.

Bex Szwajcarya, 435 mtr. n. p. m. silna solanka 17%, tudzież St. klim. przejściowa.

Birsztany Litwa (gubern. wileńska), solanka od 0 do 3%, urządzenia zdrojowe i kąpielne w ostatnim czasie znakomicie ulepszone zabiegami i starannością Dra Rodeckiego L. zakład. Ceny wszystkiego bardzo umiarkowane. Pora kąpielowa od 15 V do 15 IX.

Biaritz Francya, w zatoce Biskajskiej, kąpielisko morskie. Pobyt bardzo drogi. Pora kąpiel. od 1 V do 15 X.

Bockiet Bawarya, 1 godz. od Kissingen, 195 mtr. n. p. m. silne żelaziste źródło, bardzo zamożne w kwas węglowy. P. zdr. od 15 V do 30 IX.

Bojarka wieś, pół godz. od Kijowa, zakład kumysowy, własność i kierownictwo Dra Sadowskiego, całorocznie otwarty od 1 V do 1 IX.

Bordighera półn. Włochy, nad zatoką genueńską, St. klim. zimowa, rywalizująca ze sąsiednią San-Remo. P. pob. od 15 X do 15 V.

Bormio = Worms górne Włochy, 1375 mtr. n. p. m. cieplice obojętne, 35–40° C. pora kąpielowa tylko w Lipcu i Sierpniu.

Botzen połud. Tyrol, 260 mtr. n. p. m. St. klim. przejściowa (niekorzystna) i winogrodowe uzdrowisko.

Borżum Ces. rosyjsk. Kaukaz. 798 mtr. n. p. m. zdroje alkaliczno muryatyczne ciepłe, 20–30° C. składem chemicznym zbliżone do Vichy.

Buda = Ofen = Budapest stolica Węgier, cieplice słabo siarczane, 45–63° C. wspaniałe urządzenie t. z. Kaiserbad, Raitzenbad i Lucasbad, pensjonat w zimowym sezonie od osoby od 2 Złr. dziennie. W pobliżu Budy są bardzo liczne źródła wód gorzkich, z nich najważniejsze: Hunyady, Attila, Deak, Rakoczy i Wiktorya.

Bourbonne les Bains Francya (Wogezy), 272 mtr. n. p. m. silne słone cieplice, 58–66° C. poczytane i nazywane francuskim Wiesbadenem. P. zdr. od 15 V do 15 X.

Busko Król. polskie (powiat Stopnicki), Zakład zdrojowo-kąpielowy wód solno alkaliczno siarczanych, Dr. Dobrzański dzierżawca zakładu, LL. Dr. Dymnicki, Grabowski, Majkowski, L. zakł. i Szpitala, Dr Radziszewski, tudzież Dr. Sułmirski. P. kap. od 15 V do 30 IX.

Burtscheid Prusy nadreńskie, niedaleko Akwizgranu, cieplice z akwizgrańskiemii identyczne, 59–74° C. P. zdr. od 1 V do 30 IX; jednak łaźienki i wśród zimy otwarte.

Cairo = **Kair** (Afryka Egipt), St. klim. zimowa, powietrze gorące, umiarkowano wilgotne, rano i wieczór gwałtowny spadek ciepłoty. P. pob. od 15 X do 15 IV.

Cannes Francya, tuż nad morzem Śródziemnem, St. klim. zimowa znakomita. P. pob. w celu klimatyczn. od 1 X do 1 V, dla kąpiel morskich od 1. V do 30. X.

Canstatt Król. wirtemberskie, 218 mtr. n. p. m. solanka od 0 do 2 $\frac{1}{2}$ ‰, 8—20° C. niemiecka St. klim. przejściowa. P. zdr. od 1. V do 15. X.

Carlsbad = **Karlsbad** Czechy, 386 mtr. n. p. m. najslynniejsze cieplice alkaliczno glauberskie, 42—73° C. Dr. Dr. Polacy: Hasewicz, Prof. Jaworski (nie zawsze), Kretowicz, Rosenberg, Stiche, Sternberg i Tugendhat.

Caſania Sycylia, najcieplejsza miejscowość w Europie, St. klim. zimowa. P. pob. od 15 XI do 30 III.

Charlottenbrunn Szląsk pruski, 440 mtr. n. p. m. szczawa ziemno żelazista. P. zdr. od 15. V do 1. X.

Churwalden Szwajcaryja, 1217 mtr. n. p. m. St. klim. górską. P. pob. od 1. V do 30. IX.

Cautérêts Francya, (dep. wysok. Pyrenejów), 992 mtr. n. p. m. słynne cieplice siarczane, 15—55° C. P. kąp. od 15 VI do 15 IX.

Ciechocinek Król. polskie, st. k. ż. warszaws. bydgoskiej, solanka 0 $\frac{1}{2}$ —4‰, Dr. Dr. Certowicz, Lewenstein, Lubowski, L. Zł. Pajewski, Ruppert, Stockmann, Tannenbaum i Wolberg.

Cieplice czeskie = **Teplitz - Schönan** Czechy, 220 mtr. n. p. m. słynne cieplice obojętne, 32—48° C. Lek. Dr. Skrzyński.

Cieplice trenczyńskie = **Trenczyn - Trencsin - Teplitz** Król. węgierskie, 259 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 38—40° C. L. Dr. Filipkiewicz.

Cieplice warażyńskie = **Töplitz - Warasdin** = **Waradyn** Krocacyja, 274 mtr. n. p. m. cieplice ziemno siarczane, 57° C.

Colberg = **Kołobrzeg** Prusy pomorskie, kąpielisko morskie i solankowe 4—5‰ soli kuchennej zawierające, wzajemnego połączenia obu rodzajów kąpiel następujące. Kuchnia na ogół fatalna. P. kąp. od 15. VI do 30 IX.

Contrexeville Francya (Wogezy), 342 mtr. n. p. m. wybitnie ziemne źródła.

Cranz = **Kranzkühren** po polsku **Koło** Prusy zachodnie, 4 mile od Królewca, morskie kąpiele, bardzo uczęszczane przez Polaków. P. kąp. od 15. VI do 20. IX.

Cudowa = **Kudowa** Szląsk pruski, 412 mtr. n. p. m. szczawy alkaliczno ziemno żelaziste.

Davos dwie obok siebie miejscowości: Davos-Dörfli i Davos am Platz, Szwajcaryja, 1570 mtr. n. p. m. najznakomitsza klimatyczna alpejska zimowa St. przez cały rok do używania. Pensjonat od osoby 10—15 frank. dziennie. Od kilku lat jest tu dobrze urządzone Sanatorium Dr. Turbanna przeważnie dla chorób płucnych.

Dieppe Francya (Normandyja), wyborne morskie kąpielisko. P. kąp. od 1. VI do 30 IX.

Driburg Westfalia, 200 mtr. n. p. m. szczawy alkaliczno ziemno żelaziste. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Dorna-Watra zwykle **Dorna**, Bukowina w Karpatach, wysokość n. p. m.? szczawy alkaliczno żelaziste, urządzenia nędzne, nielicznie uczęszczane.

Druskieniki Litwa (guber. grodzieńska), 17 kilm. od St. k. ż. warszawsko petersburskiej, 200 mtr. n. p. m. solanka 1%, L. L. Bujakowski i Szepietowski. Zakład zdrojowo-kąpielny znakomity. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Družbaki, niemiec. **Rauschenbach**, węgiers. **Felső-Ruszbach**, dwie wsie: Družbaki niżnie i wyżnie, Węgry (Spiż), wysokość n. p. m.? cieplica wapniowa, 24. 2^o C. już w r. 1541 opisana po łacinie przez Wernhnera, a po polsku w r. 1640 przez Petricego, w 17 wieku przez magnatów polskich licznie odwiedzane, obecnie bardzo mało, pobyt nader tani.

Eaux-Bonnes Francya (depart. doln. Pyrenejów) 748 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 32^o C. P. kap. od 15. V do 15. IX.

Eaux-chaudes Francya (depart. doln. Pyrenejów), 675 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 11—36^o C. o 6 klm. od poprzednich odległe. P. kap. od 15. VI do 15. IX.

Elster Saksonija, 457 mtr. n. p. m. alkaliczno słono żelaziste wody, identyczne z Francensbadem, wyborne balneotechniczne urządzenia, L. polak Dr. Błociszewski.

Ems Ks. Nassauskie, 91 mtr. n. p. m. słynne cieplice słono alkaliczne, 28—46^o C. nader wielki export ich wód.

Ernsdorf zobacz **Jaworze**.

Essentuki Ces. rosyjsk. Kaukaz, 24 źródeł, stanowiących dwie grupy: zdroje alkaliczno słone, a z tych dwa najważniejsze, oznaczone Nr. 17 i 18, na miejscu i do rozsyłki używane, składem chemicznym zbliżone do Luchaczowic; nadto jest tu źródło siarczany zimny. Dr. Badde tudzież Prof. Prof. Drowie Woskreszynsky i Alexejew podnieśli bardzo ważne ujemne strony źródeł essentuckich mianowicie Nr. 20, 21 i 22 oznaczonych. P. zdr. od 15. V do 10. IX.

Euganejskie zdroje Włochy w zachodniej stronie Padwy, dawniejsze podmorskie wulkaniczne wzgórza ujawniły tu liczne i silne cieplice ziemno słone, 60—70^o C. w miejscowościach: Abano, Bataglii i St. Pietro Montagnone.

Eupatoria w Ces. rosyjskiem, m. na półwyspie krymskim, nad szeroką i otwartą zatoką, stepem otoczone, jest kąpieliskiem morskiem. Wśród lata nieznośne upały. Ciepłota wody w morzu dochodzi latem do 25^o C. Najsposobniejszy czas do kąpeli w morzu stanowi Październik i Listopad.

Fachingen Prusy (okrąg rządowy Wiesbaden), 112 mtr. n. p. m. wyborna czysta alkaliczna szczawa, zamożna w kwas węglowy, mnogo rozsyłana do dyetetycz. i leczniczego użycia. Nie ma tu urządzonego zakładu zdrojowego.

Falkenstein Prusy (prowincya Hessén-Nassau), 440 mtr. n. p. m. Sanatorium dla chorych piersiowych, wzorowo urządzone, kierownik Dr. Dettweiler, pensjonat od osoby 9—12 marek dziennie.

Fellathalquellen Karyntyja, 598 mtr. zn. p. m. proste alkalicz. szczawy, z niemieckich najzamożniejsze w dwuwęglan sodowy, mnogo na handel rozsyłane.

Flinsberg Szląsk pruski, 528 mtr. n. p. m. szczawy alkalicz. żelaziste, tudzież St. klim. górską leśną. P. pob. od 15. V do 30. IX.

Frankenhausen Turyngija, 115 mtr. n. p. m. solanka 20%. Sanatorium dla skrfulic. dzieci od 2 do 4 lat, za czterytygodniowy pobyt 60 mrk. od chorego.

Francensbad Czechy, 3 $\frac{1}{2}$ klm. od m. Eger, zkał dawna nazwa Eger-Francensbad, 423 mtr. n. p. m. alkaliczno słono żelaziste szczawy, zamożne w kw. węglowy, wzorowe balneotechniczne urządzenia kąpielne. LL. Polacy: Dembicki, Frenkel, Kittel i Rosner Jan

Fürstenhof Styryja, prywatny folwark przy m. Kapfenbergu, 533 mtr. n. p. m. Zkł. hydropatyczny Dra Czerwińskiego, przeważnie przez Polaków uczęszczany, pensjonat 30 do 40 Zlr. tygodniowo od osoby.

Gainfarn przy m. Vöslau pod Wiedniem, 200 mtr. n. p. m. Zakł. hydropatyczny Dra Friedmanna, pensjonat 50 Zlr. tygodniowo od osoby.

Gais Szwajcarya (kant. Appenzell), 935 mtr. n. p. m. najdawniejszy zkł. galaktoterapeutyczny, pensjonat 4—6 $\frac{1}{2}$ frank. dziennie od osoby. P. pob. od 1. VI do 1. X.

Gastein = Wildbad-Gastein i Hof-Gastein po pols. Gastuń, Austryja (Ks. Salzburskie), 960 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 24—48° C. klimat czysto alpejski. Najodpowiedniejszą P. pob. jest Lipiec i Sierpień.

Giesshübl-Puchstein pod Karlsbadem, Czechy, 340 mtr. n. p. m. znakomita prosta szczawa alkaliczna, export roczny do dyetetycznego użytku około 4 milionów flaszek, napełnianie wzorowe. Jest tu Zakład hydropatyczny.

Gleichenberg Styryja, 248 mtr. n. p. m. szczawy alkalicz. muryatyczne, klimat łagodny, urządzenia balneotechniczne wzorowe, LL. Polacy: Brühl i Bulikowski. P. pob. od 1. V do 30. IX.

Gmunden Austryja górna, 415 mtr. n. p. m. St. klim. powietrzna letnia, kąpiele solankowe z wody słonej Ebensee, 24% soli kuchen. zawierającej. P. pob. od 1. VI do 30. IX.

Goczałkowice Szląsk pruski, $\frac{1}{4}$ godz. od St. k. ż. Pszczyny (Pless), 266 mtr. n. p. m. solanka jodobromowa, 3% soli kuchennej, znaczny export stężonej solanki i soli zdrojowej.

Goriatszewodzk Ces. rosyjs. Kaukaz, w górach kabardyńskich, cieplice siarczane 87 9° C. gorące.

Görbersdorf Szląsk pruski, 450 mtr. n. p. m. Sanatorium dla chorych piersiowych, ś. p. Dra Brehmera, obecnie pod kierunkiem Dra Achtermanna, cały rok otwarte. Pensjonat czterotygodniowy 300 marek. Obok poprzedniego zakładu jest drugi Dra Römpler'a nieco tańszy.

Gräfenberg Szląsk austriacki, 580 mtr. n. p. m. przez swego założyciela Priessnitz'a najdawniejszy i powszechnie znany Zkł. hydropatyczny, cały rok otwarty.

Griess połudn. Tyrol, 270 mtr. n. p. m. $\frac{1}{4}$ g. od Botzen, St. klim. zimowa i uzdrowisko winogrodowe. P. pob. od 15 IX do 30 IV.

Griesbach W. ks. Badeńskie, 496 mtr. n. p. m. szczawy alkalicz. żelaziste. P. pob. od 15. V do 15. IX.

Grodzisko Król. pols., St. k. ż. warszaw. wiedeńskiej, Zkł. kąpielowo leczniczy, dom zdrowia z wygodami, żywienie dyetetyczne z kuchni zakładu, L. i właściciel Zkł. Dr. Bojasiński, konsultant r. Rzecznowski.

Hall rakuski, Górna Austryja, 376 mtr. n. p. m. jodobromowa solanka 1‰.

Hall tyrolski, Tyrol, 537 mtr. n. p. m. solanka 26‰, urządzenia kąpielne liche.

Hall = Schwäbisch Hall król. Wirtembergs., 290 mtr. n. p. m. solanka 2 $\frac{1}{4}$ ‰.

Hallstadt Austryja (Salzkammergut przy Ischlu), solanka 27‰, wysokość n. p. m.?

Harkany połud. Węgry, 90 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 62° C. Szczególną własnością tutejszej cieplicy jest wydobywający się z niej tlen siarczek węgla (Kohlenoxydsulfid), który zapalony pali się niebieskawą barwą.

Helgoland wyspa m. północnego, kąpielisko morskie. p. kap. od 1 VI do 1 X.

Herkulesbad zobacz **Mehadia**.

Homburg Ks. Nassauskie (okrąg rządowy Wiesbaden), 189 mtr. n. p. m. źródła żelazisto głaubers. i żelazisto słone, klimat dobry a urządzenia wspaniałe. P. zdr. od 1. V do 1. XI.

Hyeres Francya, 1 godz. od Toulonu, 100 mtr. n. p. m. St. klm., dzienne wahania ciepłoty gwałtowne, przeto dla chorych piersiowych miejscowość nieodpowiednia. P. pob. od 1 X do 1 V, jednak najwięcej chorych wyjeżdża już na początku Marca, z powodu panujących o tej porze wiatrów.

Inowrocław po niemiecku **Inowrazlaw** Ks. Poznańskie, m. powiatowe, od r. 1876 urządzony Zkł. silnych kąpiel solankowych 25‰, własność Towarzystwa akcyjnego, zawiązanego staraniem Dr. Dr. Wilkońskiego, Grabowskiego i Rakowskiego. L. L. Krzymiński i Przybyszewski.

Interlaken Szwajcaryja (kant. Bem.), 568 mtr. n. p. m. St. klim. podalpejska i uzdrowisko galaktoterapeutyczne, licznie uczęszczane osobliwie od Kwietnia do Września. Koszt dzienny w pensjonacie od osoby 8 do 12 Złr.

Ischl Austryja (Salzkammergut), 484 mtr. n. p. m. solanka 24‰, klimat łagodny, wilgotno ciepły. P. zdr. od 1. VI do 30. IX. Pobyt drogi.

Iwonicz Galicyja, St. k. ż. transversalnej, o 2 mile oddalonej od zakładu zdrojowego, w którym od r. 1892 rozpoczęto wydobywanie oleju skalnego dziennie po 150 metryczn. cetnr. z ujmą przeznaczeniu i celowi leczniczego zdrojowiska. 410 mtr. n. p. m. szczawy jodobromowo słone, opisywane od r. 1630, około 400 pokoiów gościnnych, 3 gmachy łazienkowe z 114 wannami do kąpiei. Zkł. Dr. Dembicki, tudzież Dr. Kaden, Łukasiewicz i Rościszewski. P. zdr. od 15. V. do 1. X.

Jastrzębie niemiec. **Königsdorf - Jastrzemb** Szląsk pruski, 250 mtr. n. p. m. wody słone brom zawierające. L. Żakl. Dr. Witeczak wybornie poski język posiadający.

Jaszczurówka Galicyja w Tatrach przy Zakopanem, ad-tynenecya wsi Poronina, 908 mtr. n. p. m. jedyna polska cieplica obojętna 21° C. kąpiele w zbiorniku, hotel wygodnie urządzone.

Jaworze niemiec. **Ernsdorf** Szląsk austrijski u stóp Beskidu, 1 mila od Bielska. 360 mtr. n. p. m. Żkl. wodolecznicy i żętyczny, kierownik Dr. Kowalski.

Johannisbad Czechy, 651 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 29° C. St. klim. powietrzna letnia. P. zdr. od 16. V do 30. IX.

Juliuszall Brunświk, 317 mtr. n. p. m. solanka 6‰, St. klimatycz. powietrzna na lato. P. zdr. od 25. V do 1. X.

Karlsbad zobacz **Carlsbad**.

Kaltenleutgeben Austrija, 2 godz. od Wiednia, pierwszorzędnny w Austrii Żkl. hydropatyczny, własność Prof. Dra Winternitza, mogący współcześnie pomieścić około 900 chorych, racjonalnie i wzorowo prowadzony, pensjonat od osoby 50 Zlr. tygodniowo.

Kamionka Podole rossyjs. miasteczko nad Dniestrem, jedyne polskie uzdrowisko winogrodowe.

Kisłowodzk Ces. rossyjsk. Kaukaz, guber. Stawropolska, 864 mtr. n. p. m., liczne i rozmaite źródła, z tych najważniejszy zdroj Narsan (w narzeczu krajowem ma znaczyć olbrzymie źródło), szczawa alkaliczno słono żelazista z ogromną ilością kwasu węglowego, w analizie zdroju cyfrą niewyrażoną; 83 hektolitrow na 1 minutę wody dostarczająca, pomieszkania i gmachy zdrojowe sa odpowiednie a nawet wspaniałe. P. zdr. od 15. VI do 1 X.

Kissingen Bawarya, 190 mtr. n. p. m. pierwszorządne zdrojowisko pod względem balneotechn. urządzeń i komfortu, znakomite szczawy żelazisto słone, 10—20° C. L. Dr. Chłapowski. Posiada zakłady: hydropatyczny, dyetetyczny i pneumatyczny. P. zdr. od 1. V do 30 IX.

Kołobrzeg zobacz **Colberg**. Dr. Weissenberg (po polsku).

Königswart Czechy, 1 godz. od Maryenbadu, 632 mtr. n. p. m. szczawy alkalicz. żelaziste w kw. węglowy zamożne.

Kösen Prusy (prow. saska), 110 mtr. n. p. m. solanka 5‰, zamożna w siarkany alkaliczne i wapniowe, uznana za północno niemiecki ogródek dziecięcy.

Köstritz Saksonija, 170 mtr. n. p. m. 22‰ solankowe kąpiele, tudzież gorące piaskowe, tak urządzone, iż chory leżąc, na świeżem powietrzu może przebywać. P. zdr. od 15. V do 1. X.

Korytnica Węgry, komitat liptowski, w Karpatach. 847 mtr. n. p. m. zdroje ziemno żelaziste. klimat istic karpacki.

Krankenheil przy Tölz (górna Bawarya), 650 mtr. n. p. m. jodosodowo alkaliczne zdroje, z których przyrządzane kąpiele wzmacniają solą zdrojową i takiemże mydłem, bywają zazwyczaj zastosowane zbyt gorąco i długo. P. zdr. od 15. V do 1. X.

Krapina-Töplitz Kroacja, 160 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 41—43° C.

Krasnobród w. Król. polskiem, gub. lubelska, pow. zamojski, St. k. ż. nadwiślańskiej Rejowiec, od r. 1888 Zkł. kumysowy i uzdrowisko klimatyczne z pensjonatem dla chorych piersiowych, utrzymanie miesięczne z kumysowem leczeniem od 75 do 100 r. s. L. Zkł. Dr. Skłodowski.

Kranz zobacz **Cranz**.

Kreuth Bawaryja, 812 mtr. n. p. m. pierwszorzędny zakład galaktoterapeutyczny niemiecki, idylliczne położenie, pyszne lasy, najstaranniejsze promenady wolne od kurzu, klimat ostry, wachania dziennej ciepłoty gwałtowne, wyborna żentycza. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Kreuznach Bawaryja, 106 mtr. n. p. m. słaba solanka, odrobinę jodku i bromku sodu zawierająca, o ciepłocie 8—30° C. zasilana 6 źródłami słonemi, pochodzącymi z miejscowości Münster am Stein, o 25 minut od Kreuznach odległej, ogromny export wyrabianego ługu i soli zdrojowej. P. zdr. od 1. V do 1. X.

Królewica m. portowe w Kroacyi, po Kroacku Kraljevica. niemiecku Königshafen, włosku Porto-re, nad m. Adryatykiem, o 1 godzinę drogi oddalone od Fiumy, kąpielisko morskie od 4 lat założone, klimat ten sam jak w Abbazyi, pobyt bardzo tani. L. miejski i Zakł. Dr. F. Grodecki (Polak). autor najpierwszej monografii tutejszej miejscowości, wydanej p. t. „*Porto-re-Kraljevica*) — *Seebad u. Klimatische Station-Susak* 1893. 8^o str. 83 z *illustracyq*“.

Krondorf Czechy, 1 mila od Karlsbadu, prosta szczawa alkaliczna, corocznie około 1 miliona flaszek do dyetetycznego użycia rozsyłana, napelnianie wzorowe.

Krynica Galicyja, St. k. ż. Muszyna-Krynica, 589 mtr. n. p. m. z filialnym zdrojem w Slotwinach, nadto zakład hydropatyczny pod kierunkiem Dra Ebersa, z pensjonatem od osoby dziennie 5—7 Złr. tudzież zakład dyetetyczny własność Dra Skórczewskiego, za opłatą tygodniową od osoby 24—42 Złr., 18 źródojów szczawy alkaliczno ziemno żelazistej, bardzo zamożnej w kw. węgl wy, wzorowe urządzenia balneotechniczne kąpeli: mineralnych, borowinowych i suchych gazowych, L. Żkł. Dr. Kopff, nadto Dr. Dr. Askenazy, Blatteis, Cercha, Ebers, Glücksmann, Lorentski, Kmiotowicz, Michalik, Roth Władysław, Skórczewski i Waligórski. 1200 pokojów gościnnych, 2 gmachy łaźienne o 100 wannach, klimat podalpejski, na miejscu wyrób pastylek krynich i wyciągu z igliwia świerkowego na kąpiele balsamiczne. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Krzeszowice w ks. Krakowskiem, St. k. ż. 24 kilm. od Krakowa, zakład kąpielny wód siarczanych, Lekarz Zakładu Dr. Dura.

Kudowa zobacz **Cudowa**.

Kumagorsk Ces. rossyjs. Kaukaz, zdroj siarczany 30·5° C. ciepły. Nie ma tu urządzeń zdrojowokąpielnych.

Landeck Szląsk pruski, 452 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 22—29° C. nieco siarkowodu i siarczku sodu zawierające, L. Żkł. Dr. Ostrowicz, Dr. Pomorski wśród sezonu. P. zdr. od 15. V do 15. IX.

Langenbrücken W. ks. Badeńskie, 138 mtr. n. p. m. zimne wody siarczane. P. zdr. od 1. V do 30 IX.

Levieo Tyrol południowy, 533 mtr. n. p. m. zdroje z siarkanem żelaza, zawierające niedokwas miedzi i arsen, używane przeważnie do rozsyłki. P. zdr. od 1. V do 30. IX.

Libawa kąpielisko morskie w Bałtyku. P. kap. od 15. V do 1. IX.

Lipik Sławonija, 158 mtr. n. p. m. alkal. muriat. jodowa cieplica, 46—63° C. P. zdr. od 1. V do 30 IX.

Lippsringe Prnsy (Westwalja), 136 mtr. n. p. m. wody ziemno żelaziste, tutejsze gazy źródłane: z tlenu, azotu i kw. węglowego złożone, używane są do wzięwań. P. zdr. od 15 V do 15. IX.

Lubień Galicya 3 mile od Lwowa, 275 m. n. p. m. bardzo obfite zimne źródła siarczane. L. Zkł. Dr. Radecki.

Lubownia nowa Węgry (Spiż), 556 m. n. p. m. Zakład zdrojowy w pięknym i rozległym parku, szczawy alkali z. ziemno żelaziste. Pobyt bardzo tani. Tutejszy zamek pamiętny jest przytulkiem Jana Kazimierza i wytchnieniem Jana Sobieskiego w powrocie z pod Wiednia.

Madeira północ. Afryka z. m. Funchal, słynna St. klim. południowa wilgotno gorąca, pobyt tu zwykle wymagany do 2 lat, pensjonat najtańszy tygodniowo 12—15 fnt. szterl. od osoby.

Maryenbad Czechy, 640 mtr. n. p. m. położenie zakładu idylliczne, klimat wilgotny, ranki i wieczory chłodne, alkaliczno glauberskie zimne zdroje w g. węglowy zamożne, wzorowe urządzenia balneotechniczne. L. Zakł. Prof. Kisch, znany balneolog, L. L. Polacy: Dobiszewski, Harajewicz jun., Jaroszyński, Kaufman i Prager. P. zdr. od 1. V do 30. IX.

Maryówka zakład hydropatyczny 6 kilom. od Lwowa, świącie (1892) a przez cały rok otwarty, własność E. Brajera, kierownik Dr Legeżyński, koszt tygodniowego pobytu od 25 Zlr. i wyżej.

Mehadia = Herkulasbad przy **Mehadia** Węgry (Banat), 174 mtr. n. p. m. Słynne cieplice siarczane 39—40° C.

Meinberg w ks. Lippe-Detmold, 210 mtr. n. p. m. ziemno i słono siarczane zdroje, kąpiele: siarczano mułowe i gazowe. P. zdr. od 20. V do 10. IX.

Mentona = Mentone połud. Francya, 1 godz. k. ż. od Nizy, w zatoce genueńskiej, St. klim. nader korzystnie położona umiarkowano wilgotna a względnie ciepła, pensjonat dziennie od osoby 10 franków. P. pob. od 1. X do 30. IV.

Meran wraz ze sąsiednimi gminami: Ober- i Untermais tudzież Gratsch, połudn. Tyrol 319 mtr. n. p. m. Uznana i znakomita St. klim. zimowa, p. pob. od 15. IX do 15 V, w pensjonatach wyborna kuchnia, 4—5 Zlr. dziennie od osoby, wiosną leczenia galaktoterapeutyczne, jesienią winogrodowe. Lekarz polak Dr. Brühl.

Morgentheim król. Wirtemberskie 191 mtr. n. p. m. Zakład od miasta 1000 kroków odległy od swego źródła Carlsquelle, nazwany Calsbadem, ma wodę słono gorzką, którą w podparowanym stanie na handel rozsyłają.

Michailowodzkie źródła Ces. rossyjsk. Kaukaz 254 mtr. n. p. m. cieplice siarczane i słono siarczane o temperaturze od 55° do 68° C. najchłodniejszy zaś źródło ma 28° C.

Mishor w Ces. rossyjsk. kąpielisko morskie na południowym pobrzeżu półwyspu krymskiego, wieś tatarska od Alupki 2 wiorsty oddalona. Obok Mishoru jest ziemską posiadłość hr. Szuwałowa, a w należącym do niej parku znajdują się wille na pomieszkanie gości kąpielowych. Pobyt spokojny iście sielski.

Misdroy Pomerania, dobre i ulubione kąpielisko morskie, lecznica prywatna dla zolżowych dzieci. P. kap. od 20. VI do 20. IX.

Mondorf W. ks. Luxemburskie, 198 mtr. n. p. m. 1—15‰, cieplica bromowo solankowa, 24° C. przeważnie na kąpiele używana.

Monsummano Włochy (prowincja Lucca), oprócz cieplic siarczanych 40—50° C., posiada grocie z naturalną parą, służącą na kąpiele gazowo parowe. Pobyt od Maja do Września.

Mont-Dore Francja (depart. Puy-de-Dôme), 1046 mtr. n. p. m. klimat zmienny i ostry, cieplice solankowe 42—45° C. ze śladem arsenu. Pobyt drogi, w pensjonacie 15 fr. dziennie od osoby.

Montreux Szwajcarya (nad jeziorem Genewskim kant. Waadt), wspólna miejscowość z 20 sąsiednich gmin złożona, 979 mtr., n. p. m. St. klim. zimowa, o wiele chłodniejsza, jak Meran. Zetyczne tudzież winogrodowe leczenie. P. pob. od 1 IX do 15 V.

Morszyn Galicyja (obwód Stryjski), 316 mtr. n. p. m. oprócz słonych źródeł, znakomite słono gorzkie źródło, wyrób odnośnej soli zdrojowej do picia i na kąpiele, zakład zdrojowy jest własnością „Towarzystwa lekarzy galicyjsk.” stanowiąc fundusz wdów i sierót pozostałych po lekarzach.

Naleczów Król. polskie, o 10 kilm. od Lublina, zdroje ziemno żelaziste, skąpe w kwas węglowy, zakłady: kąpielny, hydropatyczny (przeważnie) i kumysowy, pensjonat dziennie 3½ do 5 r. s. od osoby, Dr. Chmielewski Dyrektor Zkł. tudzież Dr. Dr. Chełchowski, Doliński i Nusbaum, jako specjaliści.

Nauheim X. Hessen-Darmstadt, 140 mtr. n. p. m. najsilniejsza niemiecka cieplica solankowa, nader zamożna w kw. węglowy, 35° C. położenie rozkoszne, urządzenia balneotechniczne wyborne.

Nenndorf Prusy (prowincja Hessen-Nassau), 71 mtr. n. p. m. zimne wody siarczane, z niemieckich najsilniejsze, tudzież solanka 6‰ wzorowe urządzenia balneotechniczne. P. zdr. od 1. V do 30. IX.

Nervi Włochy przy Genui. St. klim. południowa, pensjonat 10—12 frank. dziennie od osoby. P. pob. od 1 X do 1 V.

Neuenahr Prusy nadreńskie, 87 mtr. n. p. m. cieplice alkaliczne 20—40° C. analogiczne z Ems i Vichy, klimat łagodny. P. kap. od 1. V do 15. IX.

Nieklan Król. polskie, St. k. ż. iwanogrodzko-dąbrowskiej tegoż nazwiska, świeżo otwarty Zkł. hydropatyczny w willech hr. Platara, okolica leśna, kierownik Dr. Misiewicz.

Niemirów Galicyja (obwód żółkiewski), zimne siarczane źródło, zakład kąpielny opuszczony.

Niederlangenau Szląsk pruski, 359 mtr. n. p. m. szczawa alkaliczno żelazista.

Niederselters zobacz **Selters**.

Nizza = Nice Francyja (depart. Alp. morskich), tuż przy morzu Śródziemnem, ulubiona St. klimat, południowa, umiarkowano wilgotno ciepła, pensjonat od 10 do 20 frank. dziennie, L. polak Dr. Tymowski. P. pob. od 1 X do 1 V.

Norderney Prusy (Hanowers.), wyspa m. północnego, najznakomitsze niemieckie kąpielisko morskie, lecznica dla złozych chorych, pensjonat w hotelach 50 marek tygodniowo od osoby. P. kap. od 1 V do 15 IX.

Nowe Miasto nad Pilicą Król. pols. gubernija Piotrowska. Zakład wodoleczniczy Dra Bilińskiego, pensjonat od 2 r. 20 k. do 3 r. s. dziennie od osoby, L. L. Dr. Dr. Niedzielski i Pawiński.

Obersalzbrunn Szląsk pruski, 380 mtr. n. p. m. szczawy słono-alkaliczne, galaktoterapija, klimat przyostry i wilgotny, pobyt tani. P. zdr. od 1. V do 30. IX.

Odessa w Ces. rosyjsk., m. portowe na północnem pobrzeżu morza Czarnego, kąpielisko morskie. Ciepłota wody w morzu waha latem od 15° do 26° C., średnia jej temperatura 15° do 18° C. W Odeskiej zatoce są trzy naturalne słone jeziora („limany: Kujalnicki, Chadżybejski i Klein-liebentalski“), służące na kąpiele słonemułowe. Najlepsza pora do namienionych kąpiel jest od 20. VI do 15. VIII. Ocenienie działania i skutków (fizyologicznych i terapeutycznych) kąpeli limanów zawdzięczamy Drowi Moczutkowskiemu.

Oyenhausen = Rehme-Oyenhausen Prusy (Westfalia), 134 mtr. n. p. m. cieplice słone w kw. węglowy zamożne. 26–31° C. od 3‰ do 9‰ soli kuchennej zawierające. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Ostenda = Ostende Belgija, najwięcej uczęszczane kąpielisko morskie, wspaniałe i zbytkowne urządzenia, pobyt drogi, Zakład zbyt ruchliwy i bez spokoju.

Palermo stolica Sycylii, krajobraz pyszny, bogatą roślinnością umajony, klimat ogółem wilgotno ciepły, St. klimat. południowa, pensjonat w hotelu 15 lir. dziennie. P. pob. od 15 X do 30 IV.

Pau Francyja (depart. niższych Pyrenejów), 207 mtr. n. p. m. St. klimatycz. zimowa, cieplejsza o 2° C. od Meranu, pensjonat 10 frank. od osoby dziennie. P. pob. od 1 X do 15 IV.

Piatigorsk Ces. rosyjsk. Kaukaz, guber. Stawropolska, 993 mtr. n. p. m. 20 źródeł siarczanej cieplicy o temperaturze od 29·3° do 51·25° C. tudzież źródła alkaliczno żelaziste 11° R. mające, urządzenia kąpielne należyte nawet zbytkowne. P. pob. od 1 V do 1 X.

Petersthal W. ks. Badeńskie, 421 mtr. n. p. m. jedna z t. z. Kniebisbäder, najznakomitsze szczawy alkalicz. ziemno żelaziste. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Pfäfers zobacz **Ragatz-Pfäfers**.

Plombières Francya (Wogezy), 421 mtr. n. p. m. liczne źródła ciepłe obojętne od 19 do 69° C. kąpiele wybornie urządzone. P. zdr. od końca V do połowy X.

Pontresina Szwajcaryja (kant. Graubinden), 1828 mtr. n. p. m. Schronisko letnie, mimo wielkiego wyniesienia, klimat łagodny, liczne hotele i pensjonaty, od 6 do 10 frank. dziennie od osoby. P. p. od 1. V do 30. IX.

Psekups Ces. rossyjs. 50 kilometr. od m. Jekatinodaru, cieplice alkaliczno siarczane od 30·5° do 52·2° C. z tych najużywanwsze do kąpiel źródła: Alexandra, Maryi i Michała.

Pustomyty Galicyja, 1 mila ode Lwowa, wody siarczane zimne, od r. 1879 skromny zakładzik zdrojowo kąpielny.

Pyrmont ks. Waldeck, 130 mtr. n. p. m. liczne źródła trzech rodzajów: proste szczawy, wody słone 4‰, a najważniejsze silne żelaziste zdroje, bardzo zamożne w kwas węglowy, pobyt drogi. P. zdr. od 15. V do 30. X.

Piszczany = Pystjan Węgry (komitat Neutra), 135 mtr. n. p. m. Cieplice siarczane 57—73° C. Tutejszy muł zdrojowy terapeutycznie ważny i bardzo używany na kąpiele. P. zdr. od 1. V do 30. IX.

Rabka Galicyja, St. k. ż. transversalnej, 500 mtr. n. p. m. najsilniejsze z europejskich źródła słono jodobromowe, w tutejszym zakładzie jest od r. 1887 filia Szpitala św. Ludwika dla chorych dzieci; na miejscu wyrób soli zdrojowej i ługu; klimat podgórski, powietrze czyste. L. Zł. Dr. Gluchowski, i Dr. Mo-midłowski. P. zdr. od 15. V do 1. X.

Ragatz-Pfäfers Szwajcaryja (kant. St. Gallen), dwa zdrojowiska: Pfäfers 685 mtr. a Ragatz 521 mtr. n. p. m. których cieplice obojętne 38° C. służą wspólnie do użycia, pensjonat od 7 do 10 frank. dziennie. Ragatz zajmują osoby zamożne; zaś Pfäfers stanu średniego, spokoju szukające.

Rehme zobacz **Oeynhausen**.

Reichenhall Bawaryja, 457 mtr. n. p. m. podalpejskie zdrojowisko, stosunki klimatyczne pomyślne, dobra solanka 24‰ do kąpiel, tudzież zdroj pitny solankowy (Trinksoole) i woda gorzka przyrządzana z żóły reichenhalskiej, g. kw. węglowym wysyconej, nadto wyborna żentycza i soki ze świeżych ziół wyciśnięte, jakoteż znakomity zakład aeropneumatyczny i inhalacyjny do wzięcia solankowych i balsamicznych (własność Macka) pod kierunkiem znakomitego pneumoterapeuty Dr. G. Liebiga będący, a drugi zakład inhalacyjny (własność Lehmann) urządzony według systemu Jahra, służą za środki kuracyjne. Ogółem urządzenia balneotechniczne wzorowe, między lekarzami zdrojowemi polak Dr. Zygm. Goldschmidt. P. zdr. od 1. V do 30. IX.

Reinerz Szląsk pruski, 558 mtr. n. p. m. źródła ziemno alkal. żelaziste, wyborna żentycza, klimat górski, kąpiele: mineralne, wodne i borowinowe znakomicie urządzone. P. zdr. od 1. V do 30. IX.

Roncegno połud. Tyrol, 535 mtr. n. p. m. zdroj arsenowo żelazisty, do picia i do kąpiel na miejscu używany.

Römerbad połud. Styryja, 237 mtr. n. p. m. obojętne cieplice 36—38° C. klimat łagodny.

Royat Francja (depart. Puy de Dome), 415 mtr. n. p. m. cieplice alkaliczno muryatyczne, 20—35° C. klimat dosyć ostry, częste deszcze i burze, pobyt bardzo drogi, zdrojowisko od arystokracji wielce uczęszczane, urządzenia balneotechniczne znakomite. P. zdr. od 15. VI do 15. IX.

Rožnów = Roznau Morawja, 400 mtr. n. p. m. zakład żentyczny, dosyć uczęszczany, liche urządzenia.

Ryga w Ces. rossyjsk. (gub. inflancka), m. portowe i forteczne, pierwszorządne rossyjskie kąpielisko morskie, jest tu zakład kumysowy i fabryka sztucznych wód mineralnych, tudzież wspaniały zakład hydropatyczny z pensjonatem. P. kap. od 15. V do 15. VIII.

Rymanów Galicyja, (obwód sanocki), St. k. ż. transwersalnej, o milę od zakładu oddalona, 3 źródła szczawy alkaliczno słono jodobromowej, od r. 1881 zakład kąpielny, wyrób soli zdrojowej, podczas lata dokonują wakacyjna dla ubogich dzieci ze Lwowa. L. Zł. Dr. Dukiet, nadto Dr. Jodłowski, Krzyszkowski, Pelczar i Regiec. P. zdr. od 20. V do 20. IX.

Saidschütz Czechy, źródło wody gorzkiej mnogo rozsyłanej.

Saki w Ces. rossyjsk. (gub. taurycka), 150 mtr. n. p. m, Czarnego. o 3 wiorsty od niego odległe, posiada naturalne słone jezioro (liman), używane na kąpiele słono mułowe i wodne. P. kap. od 1. VI do 15. VIII.

St. Honore Francja, 272 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 26—31° C. Wspaniałe balneotechniczne urządzenia.

St. Sauer Francja, 770 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 20—34° C. Najliczniej uczęszczane francuskie zdrojowisko.

St. Moritz Szwajcaryja (kant. Graubünden), 1856 mtr. n. p. m. St. klim. alpejska i zakład silnych źródeł żelazistych, bardzo zamożnych w kwas węglowy, P. zdr. od 1 VI do 15 IX.

Salzbrunn = Obersalzbrunn Śląsk pruski, 380 mtr. n. p. m. szczawy solno alkalicz. i żelaziste, nadto środki galakto-terapeutyczne, znaczna rozsyłka tutejszych wód, urządzenia znakomite, tani pobyt.

Salzschlirf Prusy (prow. Hessen-Nassau), 240 mtr. n. p. m. jodobromowa solanka 1%, w kw. węglowy zamożna, tudzież źródło gorzki sodowo siarczany.

Salzungen ks. Sasko-Meiningen, 250 mtr. n. p. m. silne solanki 26%, korzystne klimatyczne położenie uczyniło to zdrojowisko niezmiernie ulubionem letniem schroniskiem dla osób zolzowych i nieżytno podlegających. P. zdr. od 15. V do 1. X.

San-Remo Włochy (Riviera di Ponente) w zatoce genueskiej, St. klim. południowa, która co do ochrony od wiatrów i jednostajności ciepłoty powietrznej przewyższa: Nizzę, Cannes i Hyeres. Uzdrowisko klim. zbyt świeże, stać wiele do zyczenia pozostawia, pensjonat w hotelach 10—12 frk. dziennie od osoby, P. pob. od 1. X do 30. IV. L. Dr. Ostrowicz. Poprzednio wiele lat bawił tu zimą Dr. Tymowski.

Saxon = Saxon les Bains Szwajcaryja (kant. Wallis), 620 mtr. n. p. m. klimat niezdrowy, cieplice jodowe 25° C. pensjonat od 8 do 12 fr. dziennie od osoby. P. p. od 1. V. do 30 IX.

Schinznach Szwajcaryja (kant. Aargau), 342 mtr. n. p. m. klimat łagodny, ciepłice ziemno siarczane 28—34° C. nadto zdroj jodowy z Wildegg, ulubiony zakład od zamożnych, wyborne urządzenia balneotechniczne, L. Zkł. Dr. Tymowski. P. zdr. od 15. V do 15. IX.

Schlangenbad Prusy (prow. Hessen-Nassau), 313 mtr. n. p. m. ciepłice obojętne 32° C. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Schwaibach = Langenschwalbach, 315 mtr. n. p. m. silne szczawy alkal. żelaziste, wyborne urządzenia balneotechniczne, mnoga rozsyłka wód tutejszych. P. zdr. od 1. V do 15. IX.

Szmeks = Schmecks i Neu Schmecks po węgiers. Tatra-Füred, Węgry, 1011 mtr. n. p. m. ulubiona węgierska St. klim.-górska, Zkł. hydropatyczny, lecznica dla chorych piersiowych na wzór w Davos niedawno tu zaprowadzona, pobyt drogi.

Selters = Niederselters Prusy (prow. Hessen-Nassau), wieś, szczawa alkaliczna, export roczny około 4 miliony flaszek, Zkł. zdrojowego tutaj niema.

Simaiz w Ces. rossyjsk. na południowem pobrzeżu półwyspu krymskiego 5 wiorst od Alupki, wyborne kąpielisko morskie i stacya klimatyczno lecznicza ciepła, klimat i roślinność jak w Alupce, podostatek mieszkań dla gości kąpielnych.

Sławinek Król. polsk. pod Lublinem, wody alkaliczno ziemno żelaziste słabe, pozbawione gazu kwasu węglowego, skromny zakładzik zdrojowo kąpielowy, L. Zkł. Dr. Olechowicz.

Sławuta Wołyń, St. k. ż. brzesko-kijowskiej, St. klimat. leśna i zakł. kumysowy, lecznica dla chorób piersiowych pod światłym kierunkiem Dra Dobrzyckiego, Dr. Przesmycki właściciel zakładu i konsultant, nadto Dr. Dzierzbicki. Zakład otwarty corocznie od 22. V do 22. IX. Pensjonat 6-cio tygodniowy 150 r. s. od osoby.

Słotwiny zobacz **Krynica**.

Soden Prusy (prow. Hessen-Nassau), 142 mtr. n. p. m. klimat łagodny, liczne źródła wód słonych w kw. węglowy zamożnych, 15—30° C. wyborne balneotechniczne urządzenia, pensjonat 36—45 mrk. tygodniowo od osoby. P. zdr. od 15. V do 15. IX.

Solec Król. polskie (powiat Stopnicki), wieś, zdroj zimny alkal. słono siarczany, z krajowych najsilniejszy co do siarkowodu i połączeń siarki, niesłusznie opuszczony, L. L. Dr. Dr. Daniewski i Siarczyński.

Spaa = Spa Belgija, 250 mtr. n. p. m. wytworny zakład kąpielny silnych wód alkalicz. żelazistych, w kwas węglowy zamożnych, dawniej od arystokracji licznie odwiedzany, obecnie po zniesieniu banku gry mało uczęszczany, opłata czyli taxa zdrojowa na sezon od 50 do 100 frk. w miarę ilości osób. P. zdr. od 1. V do 30. IX.

Staraja-Russa w Ces. rossyjsk. (gub. Nowogrodzka), m. powiatowe, 37 mtr. n. p. m., zdroje słone 1% soli kuchennej zawierające, urządzenia odpowiednie. P. zdr. od 26. V do 20. VIII.

Steben = Untersteben Bawaryja (okrag rządowy Oberfranken), 750 mtr. n. p. m. najwyższej położone niemieckie zdrojowisko wód żelazistych, w kw. węglowy zamożnych, pobyt tani. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Swoszowice Galicyja, 10 kilom. od Krakowa, St. k. ż. transversalnej, dawniej słynne kopalnie siarki, zimne wapniowo siarczane zdroje ze zakładem kąpielnym, od niedawna restytuowanym, L. Zkł. Dr. Kotulecki.

Szczawnica Galicyja (obwód Nowo-Sandecki), 523 mtr. n. p. m. wieś, 42 kilm. od St. k. ż. transversalnej Stary Sącz, składa się ze Szczawnicy niższej i wyższej tudzież ze środkowej adtynencyi zwanej Miodziś, klimat podgórski, zdrojowisko jest obecnie własnością Akademii Umiejętności, szczawy słono alkaliczne, bogate w kwas węglowy a z europejskich najzamożniejsze w dwuwęglan sodowy, ma: filialny zakład zdrojowo kąpielny na Miodziśiu, Zkł. hydropatyczny własność Dra Kołaczkowskiego i Zkł. inhalacyjny, należący do spadkobierców Dra Janochy, coroczny export wód około set tysięcy flaszek, L. Zkł. Dr. Ściborowski, nadto Dr. Dr. Doskowski, Gluziński, Hammerschlag, Kołaczkowski, Kruszyński, Nieszkowski i Starachowicz.

Szkleno Węgry, 1 godz. od Schemnitz, ziemne cieplice 30—56° C.

Szliacs Węgry (komitat Sohl), 300 mtr. n. p. m. proste ciepłe wody żelaziste 11—31° C. w kw. węglowy zamożne. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Szko Galicyja, 35 kilom. ode Lwowa, zimne wody siarczane, wysokość n. p. m. ? ma 2 Zkł. kąpielne: wojskowy i cywilny, urządzenia nędzne. Najpierwsza jego monografia Dra Erazma Syxta: „O cieplicach we Szkle wydana w r. 1527“.

Taraps-Schuls Szwajcaryja (kanton Graubünden), 1180 mtr. n. p. m. klimat alpejski, bogaty zasób źródeł mineralnych: glauberskich i szczaw żelazistych, zamożnych w kw. węglowy, dojazd utrudniony, pensjonat 6—10 frk. dziennie od osoby. P. p. od 15. VI do 15. IX.

Töplitz-Schönan zobacz **Cieplice czeskie.**

Trenczyn zobacz **Cieplice trenczyńskie.**

Truskawiec Galicyja, wieś 8 kilom. od m. Drohobycza, St. k. ż. transversalnej. 400 mtr. n. p. m. Zkł. własność Spółki obywatelskiej jest obecnie w toku rzetelnych ulepszeń balneotechnicznych, rozmaite zdroje mineralne: solanka 23%, 3 źródła słonoglauberskie i szczawa magnowo alkaliczna, borowina o cennych własnościach, L. Zkł. Dr. Plech nadto Dr. Dekański, Dr. Kozłowski i Dr. Steynhaus. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Tüffer Styryja. 215 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 35—39° C. P. kap. od 1. V do 30. IX.

Vals Francyja (depart. Ardeche), 10 zdrojów alkalicznych, do wód Vichy składem chemicznym bardzo zbliżonych, lubo zimniejszych, 13—16° C. mających, export tych wód wielki, pobyt tańszy jak w Vichy.

Vevey Szwajcaryja nad jeziorem genewskim, 380 mtr. n. p. m. St. klim. podalpejska, dobra na wiosnę i jesień, z wyjątkiem Lipca i Sierpnia, nieodpowiednia na zimę dla chorych pier-

siowych, leczenia winogrodowe, pensjonat 7—15 frank. dziennie od osoby.

Vichy Francya (depart. Allier), 230 mtr. n. p. m. najznakomitsze zdrojowisko francuskie, cieplice alkaliczne, 12—44° C. wspaniałe balneotechniczne urządzenia, ogromny wyrób soli zdrojowej i pastylek, pobyt drogi, rozsyłka wód corocznie do 3 milionów flaszek. Właściwa pora zdrojowa od 1. V do 1. X, jednak zakład kąpielny jest cały rok otwarty.

Vöslau pod Wiedniem, cieplice obojętne, 24° C. wielce uczęszczane przez zamożnych mieszkańców Wiednia, przede-wszystkiem pleć żeńską, tudzież leczenia winogrodowe.

Warmbrunn Śląsk pruski, 325 mtr. n. p. m. cieplice obojętne, 35—38° C. Urządzenia balneotechniczne dobre. P. zdr. od 1. V do 1. X.

Warażdyn zobacz **Cieplice warażyńskie**.

Wenecya morskie miasto nad Adryatykiem, załedwo bardzo mało ponad poziomem morza na wyspach i piaszczystych ławicach zbudowane, St. klm. zimowa, średnio ciepła, wilgotna, wolna od kurzu i wichrów, słoneczna. Średnia zimowa ciepłota o 1½ do 2° C. wyższa jak w Meranie lub w Montreux. Styczeń i Luty są na pobyt najodpowiedniejsze Ujemną stroną stanowi niedobra woda do picia; jesienią są tu dobre morskie kąpiele na Lido, pensjonat 7 do 10 frk. dziennie od osoby.

Weilbach Prusy (prow. Hessen-Nassau), 135 mtr. n. p. m. zimne wody alkaliczno siarczane, tudzież zdroj sodowolitowy.

Wiesbaden Prusy, stolica ks. Nassauskiego, 117 mtr. n. p. m. cieplice solankowe, 50—68° C. nietylko na kąpiele ale i do picia zastosowane, 900 gabinetów łaziennych, zdrojowisko używane za stację klim. wiosną, jesienią nawet i przez zimę, najliczniej uczęszczane niemieckie zdrojowisko, urządzenia kąpielne i na zimę, pensjonat od osoby miesięcznie od 100 mrk. i wyżej, są tu i leczenia winogrodowe.

Wildbad król. Wirtembergskie, 400 mtr. n. p. m. obojętne cieplice, 33—37° C. używane na kąpiele i do picia, urządzenia balneotechniczne wyborne, pensjonat 10 do 15 marek dziennie od osoby. P. zdr. od 1. V do 1. X.

Wysowa Galicyja (obwód jasielski), od r. 1882 zakład zdrojowo kąpielny, szczawy słono alkalicz. żelaziste, urządzenia zbyt skromne. L. Zł. Dr. Blatteis jun. P. zdr. od 1. VI do 1. X.

Zakopane Galicyja, wieś w Tatrach, 942 mtr. n. p. m. od st. k. ż. transversalnej Chabówka o 43 kilom. odległe. z inicjatywy i staraniem nieodżałowanej pamięci Dra Chałubińskiego St. leczniczo klimatyczna, klimat górski, korzystne na pobyt latem dla dotkniętych: malaryą, nieżytami oddetchów, niedokrewnością, blednicą, neurastenią, tudzież dla ozdrowieńców po przebytych ciężkich chorobach. Są tu 2 Zakł. hydropatyczne: Dra Chramca i Dra Piaseckiego. L. Stacyi Dr. Smorągiewicz L. L. Buzdygan, Chramiec, Chwistek Kulczyński i Piasecki. Od r. 1892 jest tu „Dom zdrowia“ (własność i lekarskie kierownictwo Dr. Chwistka) o 20 pokojach, latem i zimą otwarty, za kurację, stół i pomieszkanie z kompletną pościelą dziennie od Złr. 3 i wyżej. Obe-


cie Zakopane wchodzi w użycie i na pobyt zimowy dla chorych, tak zwanych piersiowych.

Zaizon Siedmiogród, 2 mile od Kronstadtu, 548 mtr. n. p. m. zdroje alkal. muryatyczno jodowe.

Zoppot = Sobótka Prusy, 12 kilom. od Gdańska, kąpielisko morskie od Polaków licznie uczęszczane. P. kąp. głównie od 15. VI do 30. IX.

Żegiestów Galicyja (obwód sandecki), St. k. ż. transwersalnej, wysokość n. p. m. ? szczawy alkal. ziemno żelaziste, tudzież rzeczne kąpiele w Popradzie, L. Zkł. Dr. Korezyński, nadto Dr. Szczepański. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Żelenowodzk w Ces. rosyjsk. na Kaukazie, stannica kozacka 12 wiorst od Piatygorska a 18 wiorst od st. k. ż. Roztowowladykaukaskiej „Mineralnyja wody“, miejscowość leżąca 610 mtr. n. p. m. od niedawna zabudowywać się poczynająca. Źródeł mineralnych około 20 alkaliczno żelazistych o ciepłocie 15° do 48° C. gmachów łaźiebnych 3, jest tu i kumysowy zakład. P. zdr. od 25. V do 15. IX.





WYBÓR

NAJODPOWIEDNIEJSZYCH ZDROJOWISK

do leczenia

POSZCZEGÓLNYCH CHORÓB.

Anaemia właściwie Oligaeemia

rzeczywista niedokrewność z ubytkiem ogólnej ilości krwi i z niezbędnym pomniejszeniem czerwonych jej ciałek, jakkolwiek zbyt często przekazywana do leczenia zdrojowo kąpielnego, jednak należy właściwie do zakresu działalności higieny. Jakoż odpowiednie żywienie tego rodzaju chorych, używanie czystego świeżego powietrza, zdrowotne stosunki ich pomieszkania, należycie do sił chorego zastosowany ale nigdy ich niewyczerpujący i nienadużywany ruch fizyczny i przechadzki wraz z wesołem umysł chorego podnoszącem zajęciem, są środkami higienicznymi, obok zabiegów zdrojowo kąpielnych przy leczeniu niedokrewności niezbędnie wymaganymi, wpośród których wody żelaziste najpierwsze miejsce zajmują. Źródła przeto iście żelaziste, obficie kwasem węglowym wolnym zaopatrzone: Bocqulet, Imnau, Pyrmont, Schwalbach i Spaa, tudzież szeszawy alkaliczne, ziemno lub muryatyczne żelaziste przedewszystkiem w górach położone: Bardyów, Driburg, Elster, Francensbad, Königswart, Krynica, St. Moritz, Żegiestów i mnóstwo innych mają tu palmę pierwszeństwa. Ale jak w każdym przypadku choroby, leczeniu zdrojowemu przekazywanej, tak i w omawianem cierpieniu należy ściśle indywidualizować poszczególnego chorego; albowiem jeżeli jego niedokrewność nastąpiła po krwotokach krwawnicowych, macicznych lub żołądkowych, albo jeżeli połączoną jest z wadami zastawek serca, z moczówką cukrową, z grążlicą, z nieżytkiem owrzodzeniem kiszek, z nawykowym zaparciem stolca, i t. d., wówczas potrzeba należytego uwzględnienia zwyż wymienionych cierpień, bez którego wody żelaziste od razu zastosowane, nie tylko niekorzystnymi się okazują, ale nawet szkodliwe następstwa i skutki mogłyby wyrządzić.

Po używaniu wód żelazistych, wskazany jest następnie pobyt w stacyach klimatycznych górskich, albo nad jeziorem genewskim, na pobrażach m. północnego lub wschodniego, wreszcie w uzdrowiskach leśnych.

Anomalia menstruationis:

1) **Amenorrhoea** stósownie do zasadniczej przyczyny: w razie zółzów wtrz. i ztrż. wody jodobromowo słone: Baasen, Goczałkowice, Hall rakuski, Iwoniec, Kreuznach, Lippik, Rabka, Rymanów, Wildeg, Zaizon.

2) w razie niedokrewności i blednicy wtrz. szczawy alkaliczno żelaziste, tudzież wody iście żelazne: Antogast, Bardyjów, Bocqlet, Driburg, Elster, Francensbad, Königswart, Krynica, Pyrmont, Spaa, Wysowa, Żegiestów. — Obok picia rzeczonych wód zalecamy odnośnie ich kąpiele wodne i borowinowe.

3) w razie zatrzymanej lub bardzo skąpej miesiączki, wszakże wobec nadmiernej otyłości (*Polysarcia*) albo wobec zastoin brzusznych (*Plethora abdominalis*) wtrz. i ztrż. wody glauberskie: Kissingen, Maryenbad, Tarasp-Schuls.

4) **Dismenorrhoea congestiva** wewn. mierne użycie lekko rozwalniających wód gorzkich lub wód alkaliczno muryatycznych chłodnych: Homburg, Kissingen, Maryenbad, Nauheim lub Soden wraz z tamtejszemi kąpielami o letniej ciepłocie.

5) **Dismenorrhoea nervosa** wymaga zewnętrzn. zastosowania ciepłe obojętnych letnich lub gorących: Cieplice czeskie (Teplitz-Schönau), Johannisbad, Landeck, Pfäfer, Ragatz, czasem ciepłe siarczanych: Akwizgran, Baden rakuski, Burtseid, Schinznach, albo gęstych borowinowych kąpiel o wyższej ciepłocie: Elstern, Francensbadu, Krynicy, Maryenbadu lub Muskau.

Arthritis

obok zastosowania odnośnego dyetetycznego sposobu życia, środki balneoterapeutyczne mają zadanie: z jednej strony uprządkować zmienioną w ustroju przez dnę materię, a z drugiej strony ośwładnąć i usunąć wyrządzone dną miejscowe przeobrażenia: złoży w stawach, w torebkach stawowych i w otaczającej je powięzi. Do pierwszego zadania posłużą wtrz. i ztrż. wody słone i niektóre z wód glauberskich: Baden-Baden, Homburg, Kissingen, Neuheim, Neuhaus, Pyrmont (Salzquelle), Rehme (Bitterbrunnen), Soden, Wiesbaden, a z wód glauberskich Karlsbad (Sprudel), przy których metodycznym zastosowaniu jako środek dyetetyczno pomocniczy zalecamy użycie szczaw prostych lub słabo alkalicznych.

Osiągnięcie drugiego celu zmierzamy zastosowaniem kąpiel nie tylko z wód poprzednio już wymienionych; ale nadto do rzeczonych celu nadają się też kąpiele z rodzimych ciepłe obojętnych: Neuhaus, Pfäfer, Ragatz, Schlangenbad, Teplitz-Schönau, Wildbad; ze siarczanych: Akwizgran, Burtseid, Baden helwecki, Bärèges, Cauteres, Mechadya, Piszczany, Schinznach, Trenczyn i Wielki Waraźdyn; nadto kąpiele słonosiarczane i parowosiarczane, tudzież kąpiele i okłady: borowinowe, mułowosiarczane i słonosiarczane.

Asthma cum bronchit. catarrh.

wtrz. wody alkaliczne rodzimo ciepłe albo zimne po ich ogrzaniu: Ems, Gleichenberg, Luchaczowice, Salzbrunn, Szczawnica —

wiosną galaktoterapia — jesienią leczenia winogradowe — latem pobyt w zdrojowiskach na pomórzu albo w stacyach klimatycznych górskich — jesienią i zimą pobyt w stacyach klimatycznych południowych: Abbazia, Arco, Meran lub na Riviera di Ponente.

Bronchitis, Tracheitis, Laryngitis catarch. chron.

wtrz. szczawy alkaliczne same lub ocieplone gorącym mlekiem albo żentycą: Ems, Gleichenberg, Obersalzbrunnen, Selters, Szczawnica, Vichy; wody alkaliczno muryatyczne i alkaliczno słone: Luchaczowice, Radain, Roisdorf, Elster (Salzquelle), Francensbad (Salzquelle), Rohitsch (Tempelbrunnen), Homburg, Soden.

Wziewanie rozpylonych wód alkaliczno-muryatycznych lub alkaliczno-słonnych, albo inhalacje igliwiowe, tudzież leczenia galaktoterapeutyczne albo winogradowe.

Pobyt latem, jesienią i zimą: zobacz asthma.

Chlorosis

w namienionej chorobie bardzo licznego zastępu chorych zdrojowiskom dostarczającej, oprócz zastosowania środków higienicznych, tudzież wewn. użycia wód iście żelaznych i szczaw żelazistych, które wymieniliśmy, mówiąc o Anaemii, nie odmawiamy skutku i wodom arsenowym: Levico, Roncegno i Srebrenica Gubersquelle, obecnie mających licznych swych wielbicieli.

Po odbyciu poprzednio kuracyi wodami żelazistemi, dla utrwalenia skutku, zalecamy następnie: kąpiele morskie albo pobyt w klimacie podalpejskim lub alpejskim.

Catarrhus ventriculi chron.

1) **acidus** wtrz. wody alkaliczne: Bilin, Ems, Fachingen, Gleichenberg, Krondorf, Selters, Szczawnica (ogrzewana); kąpiele letnie z wód powyższych.

2) **mucosus**: dyeta lekko podniecająca. wtrz. Elster (Salzquelle), Francensbad (Salzquelle), Karlsbad (słabsze źródła), Szczawnica (zdrój Szymona ocieplony), Vals, Vichy, Wysowa (zdrój Bronisławy lub Wandy).

Catarrhus intestinorum chr. (Enteritis follicularis).

1) **cum diarrhoea**.

Leczenie wstępne wtrz. wody alkaliczno muryatyczne albo alkaliczno słone rodzimo ciepłe: Karlsbad, Baden-Baden, Ems, Vals, Vichy, Wiesbaden, tudzież ztr. ich kąpiele; przedewszystkiem zaś kąpiele borowinowe.

Leczenie następowe wody alkaliczno ziemne (ocieplone): Krynica (zdrój główny), Lippspringe, Maryenbad (zdrój Rudolfa), Wildungen, tudzież kąpiele borowinowe lub morskie ciepłe.

2) **cum obstipatione alvi** wtrz. Kissingen, Krynica (zdrój słotwiński), Maryenbad, Żegiestów, średnie dawki wód gorzkich: Friedrichshall, Hunyady, Seidlitz lub Morszyn w przerwach używane — metodyczne zastosowanie enteroklyzy z wód gazowych — ztr. kąpiele chłodnawe — hydroterapia.

W balneoterapeutycznym leczeniu nieżytów żołądka i kiszek ani mowy być nie może o skutku, bez zastosowania uprządkowanej diety, a odpowiedniej do zasadniczego cierpienia narządów trawienia i do jakości ich wydzielin.

Catarrhus uteri et vaginae chron., (Endometritis chron. Blenorhoea genitalium, Fluor albus)

stosownie do zasadniczego cierpienia i powodujących przyczyn (niedokrewność, ogólne ustroju osłabienie, zaburzenia w miesiączkowaniu, zołży, pozostałości po zapaleniu: omacicznym, śródmacicznym lub okołomacicznym, nienależyte wsteczne przeobrażenia macicy po porodzie lub po poronieniu, nadużycie spółkowania, samogwałt) i t. d. wtrz. i ztrz. użycie wód: alkaliczno ziemno żelazistych, alkal. słonych, solanek lub wód siarkanowo żelaznych.

Zarazem najstaranniejsze utrzymanie czystości narządu choroba dotkniętego za pomocą: bardzo oględnie używanych z prostej a nie mineralnej wody wstrzykiwań i natrysków macicznych, nasiadów i ogólnych kąpiel, a między nimi przedewszystkiem kąpiel borowinowych.

Catarrhus chron. vesicae et pelvium urinar. (Pyelitis chron.)

wtrz. szczawy alkaliczne w obfitej ilości wśród całego dnia: Bilin, Fachingen, Geilnan, Giesshübel, Krondorf, Neuenahr, Teinach, Vals, Vichy (zdrój Puits de mes dames). Ztrz. przy dłużej trwającej kąpiele z wód namienionych albo z cieplic obojętnych: Badenweiler, Gastein, Johannisbad, Ragatz, Schlangenbad, Tüf-fer, Wildbad.

Cholelithiasis

wtrz. przedewszystkiem Karlsbad; u osób delikatnej budowy i słabowitych: Ems (zdroje: Kränchen, Kesseli-Fürstenbrunnen) albo Vichy (zdrój Grand Grille); zaś u osób silnych, dobrze odżywionych, wobec nawykowego zaparcia stolca: Heilbrunn, Kissingen, Maryenbad (zdrój Kreuzbrunnen).

Mimo pomyślnego skutku, leczenie zdrojowe kilkakrotnie powtarzać.

Przez zimę dyetetyczne użycie szczaw alkalicznych.

Diabetes mellitus

obok przynależnej diety, wtrz. w pierwszym rzędzie Karlsbad, w drugim rzędzie Vals albo Vichy — podczas kuracji i poza nią dyetetyczne użycie prostych szczaw lub słabo alkalicznych: Giesshübel, Krondorf — po przeprowadzonym leczeniu w Karlsbadzie, u osób bardzo podupadłych na siłach, następne leczenie w zdrojowiskach żelazistych, tudzież kąpiele borowinowe.

Emphysema pulmonum

starać się o usunięcie towarzyszącego rozedmnie nieżytku oskrzelowego albo pełnokrwistości i zastoinom w krwionośnych narządach trzewiów — a zatem leczenie zdrojowe powyżej na-

mienione „zobacz *Bronchitis catarrh. chr.*“ lub poniżej podane przy opisie „*Plethora abdominalis*“.

Następnie pobyt w stacyach klimatyczn. podalpajskich lub na pomorzu. Na zimę za pobyt: Abbazia, Arco, Meran, Nizza, Palermo.

Haemorrhoids (*Plethora abdominalis*)

u osób pełnokrwistych, dobrze żywionych, otyłych wtr. i ztr. Maryenbad, Kissingen, Rohitsch, Taraps-Schuls — o ile narząd trawienia jest silny i prawidłowo funkcjonuje nawet niektóre z wód siarczanych jak: Weilbach, Nenndorf, Szobranz, Schinznach; zaś u osób w odżywianiu podupadłych, wobec nieżyty dróg trawienia, cierpien wtroby lub nerek, skromne użycie wód alkaliczno słono żelazistych: Francensbad, Elster, Kudowa, Rippldsau, szczaw alkalicznych: Ems, Gleichenberg, BadenBaden.

Obok tego, odnośne symptomatyczne leczenie uciążliwych przypadłości: zaparcia stolca, krwi upływów z odbytnicy lub szluzotoku z kiszek, odmy brzusznej, zgagi i t. p.

Po kuracyi zdrojowo-kąpielnej, leczenie winogradowe: w Dürkheim, Gries, Meranie lub w Wiesbaden.

Dyeta cierpieniu odpowiednia jest koniecznie potrzebną.

Hysteriasis (*Neurasthenia*)

obok leczenia zasadniczej choroby (zboczenia odżywiania, niedokrewność, blednica, zmiany w narządzie moczopłciowym), u osobników w okresie rozwoju i pokwitania: kąpiele morskie zrazu letnie, następnie chłodne; cieplicze kąpiele temperaturę ustrojową obniżające: Landeck, Liebenzell, Badenweiler, albo łagodne hydropatyczne leczenie.

Ischias.

Zobacz *Neuralgiae*.

Laryngitis catarrh. chronica

ściśle zachowanie się dyetetyczne i higieniczne co do wpływów atmosferycznych, używanie głosu niewysilające a wcale nienadużycie tegoż; wtr. zastósowanie na ogół tychsamyh balneoterapeutycznych środków, o jakich mówiliśmy przy *Bronchitis catarrh. chron.*

Otyłym, pełnokrwistym, dobrze odżywionym, wobec zboczeń krwiobiegu w trzewiach i zastoin brzusznych wtr. wody: Maryenbadu (Kreuzbrunnen), Taraspu (Lucius — Emerita- lub Ursusquelle), Kissingen (zdrój Rakoczy) lub Homburga (Elisabethquelle i Kaiserquelle).

Osobom otrętwiałym, żółzowym, dotkniętym dną lub gościem, będącym w podeszłym wieku wtr. wody słono siarczane: Langenbrücken, Nenndorf, Wipfeld, Weilbach; tem zaś właściwiej zdrojowiska siarczane francuskie: Amelie les bains, Barèges, Bagnères de Louchon, Sauver, zawdzięczające swą skuteczność w omawianej chorobie wybory ich klimatycznym stosunkom, tudzież znakomitą swym urządzeniem do leczeń wzięwnych.

Metritis chronica (Parametritis. Perimetritis chron.), Oophoritis chronica.

W świeżych wypadkach a przy zupełnej nieobecności stanu zapalnego wtrż. i ztrż. wody jodobromowo słone: Kreuznach, Krankenheil (Tölz), Hall rakuski, Iwonicz, Rabka, Sulza, Zai-zon; rzadziej: Kissingen, Homburg, Wiesbaden.

Przytem w miarę nawykowego zaparcia stolca od czasu do czasu mierne dawki wód gorzkich: Friedrichshall, Morszyn, Pül-na.

U delikatnych i niedokrewnych niewiast, wobec niedawnego i nierozległego cierpienia wtrż. i ztrż. wody alkaliczno mury-acyjne: Ems, Neuenahr, Vichy.

Wobec stanu niedokrewności jako następowe leczenie szcza-wy alkaliczno żelaziste: Elster, Francensbad, Krynica, Żegie-stów, a nawet iście żelazne wody: Bocqlet, Driburg, Pyrmont, Schwalbach, Spaa.

Tuż obok picia, okłady i kąpiele: żelazisto borowinowe, solankowe, jodobromowo słone lub z wód silnych alkalicznych.

W niemożności zastósowania kuracyi zdrojowo-kąpielnej, zalecamy używanie w domu odpowiednio wskazanej wody mi-neralnej do picia, a ztrż. na kąpiele: przetwory borowinowe (sól i ług) wyrobu Mattoniego.

Morbus Basedowii.

Zabiegi hydropatyczne w zakładzie, będącym w wysokogórzy-stej okolicy, racjonalnie prowadzone; obok tego wewnętrzne użycie wód żelazistych, bardzo posilna dyeta; następnie ką-piele morskie.

Morbus Brighti chron.

obok właściwego sposobu żywienia chorego, dyetetyczne użycie szczaw prostych lub słabo alkalicznych a wtrż. wody gazo-wożelaziste: Antogast, Bocqlet, Brückenau tudzież szczawy ziemno alkaliczne: Driburg, Kudowa, Krynica, Żegiestów; zaś leczenia kąpielne z wielką ostrożnością zastósowane z ciepłe obojętnych (od temperatury 37° do 42° C.) nawet w grocie Mon-summano.

W białkomoczu u nadmiernie otyłych, Karlsbad lub Mary-enbad (ogłędnie).

Na zimę pobyt w ciepłym, suchym klimacie: Cannes, Pau, Pisa, St. Rémó.

Myelitis chronica et Tabes dorsualis.

Proste przekrwienie rdzenia pacierzowego, nierzadko spowodo-wane przekrwieniem brzuszem i zastoinami w trzewiach, usprawiedliwi zastósowanie hydropatyi, a zabiegów na ogół odprowadzających: chłodnej półkąpieli, zlewu na grzbiet, okładu lodowego woreczkiem Chapmana; ze środków zaś balneoter-aapeutycznych użycie: wód alkaliczno słonych, glauberskich, lub ogłędne zastósowanie wód gorzkich.

W przewlekłym zapaleniu rdzenia pacierzowego, połączo-nem z wypocinami, wskazane są kąpiele wessanie lekko pobu-

dzające: żelazisto słono borowinowe: Elsteru, Francensbadu lub Maryenbadu; cieplice słone: Oyhausen, Neuheim, Baden-Baden, Bourbonne les bains, Wiesbaden albo obojętne: Gastein, Pfäfers, Ragaz, Römerbad, Teplitz-Schönau.

Osobniczość i pobudliwość chorego ma rozstrzygać przy wyborze zdrojowiska (kapielowego); same zaś kąpiele winny być zastosowane z wielką ostrożnością, a pod ścisłą kontrolą lekarza co do ich: ciepłoty, czasu trwania, przedewszystkiem co do wpływu na chorego.

Nie pomijać środków leczenia zdrojowe wspierających: elektryzacya, mięsienie.

Po kuracyi pobyt zimą w klimatycznym uzdrowisku ciepłym, suchem i słonecznym, byłby w tym razie pożądanym, jeżeli chory może odbyć podróż bez wszelkich niewygód i umęczenia.

Neuralgiae

Nerwobóle wymagają rozmaitego leczenia balneoterapeutycznego, odnośnie do podstawowego cierpienia.

W nerwicach opartych na goścu lub dnie zalecamy wtr. wody alkaliczno muryatyczne: Ems, Vichy, Karlsbad; jeżeli zaś przekrwienie brzuszne powoduje nerwobóle to: Maryenbad, Kissingen lub Homberg — u osób zołzowych nerwicą dotkniętych wody jodobromowo-słone: Kreuznach, Iwonicz, Rabka, Soden lub Truskawiec. W nerwicach spowodowanych kiłą lub rtęcią wskazane są: Akwizgran, Burtseid, Busko, Solec lub Szohranz; zaś w nerwobólach powikłanych z niedokrewnością, tylokrotnie już przytaczane wody żelaziste.

Co do kąpiel zalecamy: w nerwobólach samoistnych cieplice obojętne; zaś w nerwobólach goścowych i dnawych cieplice kąpiele siarczane lub słone.

Migrena

samoistna, opierająca się innym zabiegom leczniczym, bywa czasem usuniętą kąpielami morskimi.

W nerwicy kulszowej

(*Ischias*) okazały się skutecznymi cieplice kąpiele: Teplitz-Schönau, Wildbad, Plombiers, Piszczany, Mehadya.

Neurasthenia zobacz Hysteriasis.

Obstipatio alvi constitutionalis

zobacz *Catarrhus intestinorum chron. c. obstipatione.*

Oophoritis chronica

zobacz *Metritis chronica.*

Ozaena chronica

stósownie do przyrody: ozaena *scrophulosa* wtr. i ztr. wody jodobromowo słone, tylokrotnie już przytaczane; zaś ozaena *sypylistica* wymaga kuracyi podstawowej tego cierpienia. W obu rodzajach tej choroby, nie obejdzie się bez miejscowego leczenia. Dla gruntowego polepszenia, kuracyę balneoterapeutyczną kilkakrotnie powtarzać należy.

Paralyses centrales (cerebrospinales) et periphericae.

Stósownie do natury i podstawy porażen ze zasobu Balneoterapii, głównymi środkami leczniczymi są kąpiele ciepłe: obojętnych, gazowo słonych, siarczanych, tudzież żelazisto borowinowe. Wszelkiego rodzaju kąpiele podrażnieniem (termicznym, chemicznym i mechanicznym) nerwów obwodowych i pobudzeniem wessania ewentualnej wypociny w chorobą dotkniętych nerwach, a nadto wzmocnieniem i poprawą przeróbki materji w ustroju, rokują swe skutki.

Rzeczzone ogólne kąpiele, zalecamy z razu chłodniejsze i krótko trwające, z przerwami co drugi lub co trzeci dzień; następnie zaś w ciągu leczenia co raz cieplejsze (niekiedy od 40° do 43° C.) i dłużej trwające (od $\frac{1}{4}$ do $\frac{3}{4}$ godziny), uzupełniając leczenie kąpielą natryskową z wód zastósowywanych, nie pomijając użycia elektryzacji i mięsienia.

W porażeniach przyrody hysterycznej radzą natryski szwedzkie (naprzemian gorące i zimne).

Rhachitis.

Najskuteczniejszymi okazały się w tej chorobie wtrż. wody zawierające: węglany alkaliczno ziemne, żelazo i kwas węglowy wolny, tudzież wody gazowo słone, podawane z mlekiem lub żentycą, a u dzieci nader kakotroficznych z mocnym rosołem przedewszystkiem zdroje: Bardyowa, Krynicy, Borszoku, Elöpataku, Flinsbergu, Reinerzu, Rodny, Karlsbrunnu, Pyrawarthu i Recoaro. Na pierwszeństwo zasługują zdrojowiska, położone w wysokich górach i lasem otoczone. Kąpiele gazowo słone lub słono żelaziste; u dzieci zaś bardzo wåtłych i osłabionych żelazisto borowinowe są nieodzowne.

Należy zwrócić uwagę rodzeństwa odnośnych pacjentów, iż w krzywicy żadną miarą nie można oczekiwać polepszenia, a tem mniej uleczenia po jednorazowej kuracji zdrojowej.

Coroczny pobyt tego rodzaju chorych (aż do czasu ich rozwoju) w górskich klimatycznych uzdrowiskach jest wielce pożądanym; gdzieby zaś było możliwe, przezimowanie na Rivierze.

Rheumatismus chron. musculorum vel articulationum.

Zdawien dawna zgodzili się praktyczni lekarze na uznanie termicznej podniety za najskuteczniejszy środek we wszelkich postaciach przewłocznego gościa, za lek usuwający bóle, uspakajający, rozszerzający miejscowo naczynia krwionośne, wzmagający prześiąkanie i krwiobieg w tkaninie chorobą dotkniętej, pobudzający przemianę materji; wszystkie zaś te sprawy zdolne są wywołać pożądaną zmiany w częściach gościem zajętych. Przedewszystkiem zalecają się w omawianem cierpieniu cieplice: chemicznie obojętne: Teplitz-Schönau, Pfäffer, Ragaz, Gastein, Krapina-Töplitz, Warmbrunn; solankowe lub słone: Baden-Baden, Badlaruc, Bourbon les bains, Nauheim, Soden, Wiesbaden i siarczane: Akwizgran, Baden helwecki, Burtscheid, Harkany, Mehadya, Ofen, Piszczany, Trenczyn i Waraždyn; tak jako kąpiele wodne jak i mułowe, nadto kąpiele: borowinowe, igliwiowe

i piaskowe (w Blasewitz pod Dreznem zakład przyrodoleczniczy pod kierunkiem Dra Kaphenget'a).

Przy wyborze zdrojowiska uwzględnić należy jego położenie i klimat; ochronność od burz, deszczów i wichrów; a brak nagłych i wielkich skoków i wahań ciepłoty atmosferycznej.

W wyborze i zalecaniu poszczególnych rodzajów kąpieli, na baczna uwagę lekarza zasługują: powikłania gościa z innymi chorobami, przewaga niektórych przypadłości i konstytucya chorego.

Obok ogólnej kąpieli używają się też w gościach ciepłe natryski na części chorobą zajęte, którychto natrysków uprawdliowanie: stopnia ciepłoty, trwanie czasu i mechanicznej siły natrysku, lekarz zdrojowy ściśle choremu ma oznaczyć.

Wogóle racjonalne i metodyczne postępowanie w leczeniu kąpielnem gościa, tudzież kontrola lekarza nad poszczególnymi objawami i nad skutkiem z każdego rodzaju lub odmiany kąpiel, jest wielkiej wagi i doniosłości. Nie wystarczy tu dawny szablon objęty wyrażeniem: „kąpać się 20—30 razy, 15 lub 30 minut, po kąpieli godzinę w łóżku poleżeć“, a co do reszty kierować się choremu dowolnością lub własnem natchnieniem. W ten sposób skuteczniana kuracya, wcale nie usunie ciężkiego goścowego cierpienia.

W leczeniu przewlekłych gości, hydroterapia (w ścisłem tego wyrazu znaczeniu), dopiero wtedy wchodzi w swe prawa, jeżeli już gościec uleczonym został. Zadaniem jej jest zahartowanie powłok powszechnych dla zapobieżenia powrotom choroby. Toż samo odnosi się na ogół do morskich kąpieli.

Pomieszkowanie chorego w zaleconem mu zdrojowisku winno być: zupełnie suche, ciepłe, o ile można południowe i słoneczne a należyście przewietrzalne.

Scrophulosis.

Pomyślny skutek balneoterapeutycznego leczenia żoźów wtr. i ztr. użyciem wód mineralnych zwiększy się: korzystnym klimatem odnośnego zdrojowiska tudzież dyetetyką i higieną; wszystko zaś to razem i współcześnie zastosowaniem być winno, jeżeli mamy zadziałać na poprawę wyrobu krwi, na wzmożenie czynności ustroju i na usunięcie zboczeń odżywiania.

W żoźach cechy pobudliwej zalecamy wtr. i ztr. wody słone: Baden-Baden, Canstatt, Ciechocinek, Goczałkowice, Hall rakuski, Jastrzęb (Königsdorf) lub Heilbrunn.

Wobec wielkiej tkliwości narządu trawienia u osobników żoźowych a nader pobudliwych, którzy zrazu nie znoszą wód słonych, kuracya ich zaczyna się pobytem w zdrojowiskach ciepłie obojętnych, położonych w wysokich górach: Pfäffer, Ragatz, Neuhaus lub Schlangenbad; następnie zaś leczenie skuteczniejsza się wspomnianymi zwyż słonymi wodami.

W żoźach cechy otretwiałej polecamy: Kreuznach, Krankenheil-Tölz, Iwonicz, Rabkę, Rymanów, Salzhausen, Truskawiec lub Zaizon; ku uzupełnieniu zaś kuracyi, odbywanej w namienionych zdrojowiskach, kilku tygodniowe następowe

leczenie u wód alkaliczno ziemno żelazistych: Borszek, Bardów, Krynica, Pyrawarth lub Żegiestów.

Wobec ogromnej częstotliwości zółzów między działwą mniej zamożnej naszej ludności, byłoby arcypożądane zaprowadzanie w naszych zdrojowiskach leczenia dla ubogich dzieci zółzowych, jakie oddawna posiadają już: Anglia, Francya, Niemcy i Włochy; u nas zaś najpierwszy i jedyny dotychczas tego rodzaju jest zakład w Rabce, t. z. filialny szpitalik dla dzieci św. Ludwika.

Stases abdominales.

Powszechnie znana grupa zjawisk: przekrwienia brzuszego i nieżyków wielu narzędzi trawienia, trudności strawności, nawykowego zaparcia stolca, krwawnie i t. p. zboczeń, których powód po części w niewłaściwym sposobie życia, a po części w dziedzicznym usposobieniu. Tego rodzaju chorzy dostarczają bardzo liczne zastępy osób do leczenia zdrojowego. Należy między niemi odróżnić: otyłych, pełnokrwistych i dobrze odżywionych od pacjentów wychudłych, ogólnie na zdrowiu podupadłych i osłabionych.

Dla pierwszego działu chorych zalecamy: Maryenbad, Kissingen, Rohitsch lub Tarasp-Schuls, tudzież niektóre z wód słonych; dla drugiego zaś działu pacjentów wskazane są: Francensbad, Elster, Rippoldsau, Krynica-Słotwiny i Żegiestów, a w lżejszych postaciach namienionego cierpienia: Soden, Homburg, Gleichenberg, Baden-Baden lub Nenndorf.

Leczenie następowe winogrodowe: w Gries, Meranie lub Wiesbaden bywa bardzo pożyteczne.

Tuberculosis bacillosa pulmonum.

Balneoterapia wraz z jej pomocniczymi: Aëro—Klimato- i Galaktoterapią, tudzież Balneodyetetyką i Hygieną w wielorakim kierunku bardzo korzystnie podziała w gruźlicy. Wody mineralne: Ems, Gleichenberg, Charlottenbrunn, Reinerz, Salzbrunn, Szczawnica lub Soden zwalniają towarzyszacy gruźlicy nieżyt oddetchów, polepszają upośledzone trawienie, podnoszą odżywianie, wraz z niem ogólne siły żywotne i dopomagają wessaniu nacieków gruźliczych.

Klimatoterapia tak w zapobieżeniu jakoteż w leczeniu gruźlicy jest niemal pierwszorzędnym środkiem. Najodpowiedniejszym klimatem dla tego rodzaju chorych, są miejscowości w górach, powyżej 1000 m. n. p. m. wzniesione, dostarczające najczystsze powietrze, wolne od drobnoustrojów i kurzu, zalecające się zwiększeniem ozonu, wyższą aniżeli gdziekolwiek aseptycznością górskiego powietrza i większą tamtejszą insolacją, byle chory miał tu umożliwione jak najdłuższe przez dzień przebywanie na wolnym powietrzu, a zabezpieczony był od przeszkód z tem nieodłącznych ze strony samego powietrza i od innych okoliczności, niedozwalających choremu długiego pobytu na wolnym powietrzu; to się zaś usuwa odpowiedniemi urządzeniami zakładów, przeznaczonych dla gruźlicy dotkniętych, jakie posiadamy: w Davos, Görbersdorf i Falkenstein, a jakie

moglibyśmy mieć w Zakopanem, jeżeliby ono pozyskało odpowiednie ku temu urządzenie higieniczno-lecznicze; albowiem dotychczasowe doświadczenia tej miary lekarzy jak ś. p. Chałubiński tudzież Dr Baranowski i Sokołowski stanowią za tem przemawiają.

Urolithiasis.

Zanim się przedsięwzięcie balneoterapeutyczne leczenie kamicy moczowej, przedewszystkiem należy najdokładniej zbadać skład chemiczny moczu, ocenić jego jakość, a jeżeli można to i samej skrzepliny czyli konkrementu; albowiem zaniechanie tej sprawy lub błędne jej uskutecznienie poprowadziłoby do arcy niepożądanych wyników leczenia.

Skamieliny moczowe pod względem chemicznym dzielimy na zawierające ogółem i przeważnie sole ziemne (fosforany ziemno alkaliczne — *Phosphaturia*) i na skamieliny kwasowe, pochodzące z powiększonej ilości kwasu moczowego i moczanów; lubo znachodzą się i konkrementa szczawianowe (*Oxaluria*).

Zadaniem Balneoterapii jest tu przedewszystkiem leczyć usposobienie kamiączkowe (*Diathesis urolithiaca*); byłoby bowiem złudzeniem a płoennym zabiegiem, żądać i oczekiwać od wód mineralnych rozpuszczenia albo wydalenia z ustroju większych konkrementów moczowych, aniżeli na to zezwala średnica przewodu odnośnych narządzi.

Zapobieżenie i poskrómienie wytwarzania się kamiączki moczowej, a nawet przeszkodzenie wzrostowi już obecnych skrzeplin moczowych, otrzymujemy zastosowaniem w konkrementach przyrody kwasowej wód alkaliczno muryatycznych: Vichy, Vals, Karlsbad, Ems, Assmanhausen, Neuenahr, Szczawica (źródł Józefiny).

W skamielinach złożonych z węglanu wapniowego zalecamy obfite picie wód zamożnych w kwas węglowy, a ubogich w sole zasadowe: Biliu, Krondorf, Heppingen, Landskrone, Sinnbergen; nawet prostą wodę sodową, byle przyrządzoną na wodzie przekroplonej, lub przysposabianą ze źródła Cieplicy czeskiej (Teplitz-Schönau) od roku w handel wprowadzoną.

W skrzeplinach szczawianowych, odpowiednie są proste szczawy, tudzież słabo alkaliczne szczawy: Ahrweiler, Bilin, Fachingen, Giesshübel, Teinach.

W najnowszym czasie na zasadzie, iż węglan litynowy posiada większą siłę rozpuszczalną kwasu moczowego, aniżeli ją mają alkalia, zalecano w kamiężce wody zawierające lit: Salzschlirf, Dürkheim, Weilbach, Wildungen. Jednak zbyt mała ilość węglanu litynowego w rzeczonych wodach znachodząca się (w 1000 częściach wody od 0.0124 do 0.0450), upoważniła do zastąpienia ich sztuczną wodą litową, mogącą zawierać pożądaną a dokładnie oznaczoną ilość litu.

Ciepłe ogólne lub nasiadowe kąpiele poskutkują w usunięciu dolegliwości, towarzyszących kamiężce moczowej.

Dr Michał Zieleniewski.

Szczawnica

w powiecie Nowotarskim w Galicyi.
powszechnie znany Zakład zdrojowo-kąpielowy,
klimatyczny, żętyczny i kefirowy

położony w pięknej górskiej okolicy, w pobliżu Pienin,
otoczony górami, odznaczający się orzeźwiającem po-
wietrzem z 7 zdrojami silnej szczawy sodowo-solnej
i sodowo-żelazistej.

Liczne, niedrogie a porządnie urządzone mie-
szkania zakładowe i w domach prywatnych
właścicieli, około 1000 pokoi, trzy główne
restauracye i kilka drugorzędnych.

Lekarzem zakładowym jest Dr. Władysław
Ściborowski, prócz niego kilku lekarzy udziela
chorym rady lekarskiej. Stała apteka w miej-
scu; mleko, żętyca, kefir. Zakład inhalacyjny, so-
lankowy, tudzież powietrza zawierającego czę-
ści balsamiczne igliwiowe. Zakład wodoleczni-
czy Dra Kołaczkowskiego, łązienki z kąpielami
ciepłymi, żelazistymi i borowinowymi, oraz
natryskami letniami i zimnemi, kąpiele rzeczne
w Dunajcu i bliższym Zakładzie Ruskim Potoku.
Czytelnia czasopism, wypożyczalnia książek. Klub
szczawnicki kierujący zabawami. Muzyka kon-
certowa. Zebrania towarzyskie, koncerty. Za-
kład artystyczno-fotograficzny A. Szuberta. Poczta
i telegraf w miejscu. Sklepy wszelkiego ro-
dzaju. Wycieczki w uroczę okolice Szczawnicy.
Komunikacya z Krakowem i Lwowem koleją
żelazną do Starego Sącza, z kądem 41 kilome-
trów wybornym gościńcem na miejsce.

Pora zdrojowa trwa od 20 Maja do 20 Września.

Zamówienia na mieszkania przyjmuje Zarząd Zakładu
zdrojowego przez Stary Sącz w Szczawnicy.

Zamówienia na wodę mineralną adresować wprost do
Zarządu Zakładu zdrojowego w Szczawnicy.

Dzierżawca **Feliks Wiśniewski.**

C. k. Zakład zdrojowy

Stacya kolei
Muszyna-Krynica:

z Krakowa 8 g.
ze Lwowa 12 „
z Budapesztu 12 „

KRYNICA

W miejscu:
Poczta trzy razy
dziennie,
Telegraf,
Apteka.

(w Galicyi)

najobfitsza szczawa żelazista.

W Karpatach 590 metr. n. p. m. Od stacyi kolejowej godzina drogi bitej, znakomicie utrzymanej.

Srodki lecznicze: klimat podalpejski, kąpiele żelaziste, nader obfite w wolny kwas węglowy, ogrzewane metodą Schwarza.

Kąpiele borowinowe parą ogrzewane.

Kąpiele gazowe z czystego kwasu węglowego.

C. k. Zakład hydropatyczny pod kierunkiem specjalisty Dra K. Ebersa.

Picie wód mineralnych miejscowych i zagranicznych. Zentyca, kefir, gimnastyka lecznicza.

Lekarz zdrojowy Dr L. Kopff cały sezon stale ordynujący. — Nadto 12 lekarzy wolnopraktykujących.

Spacery: bardzo rozległy park szpilkowy, znakomicie utrzymany. Bliższe i dalsze wycieczki w uroczyska Karpaty.

Mieszkania: przeszło 1500 pokoi z komfortem urządzonych, z pościelą kompletną, usługą, dzwonkami elektrycznemi, piecami i t. d.

Kościół katolicki i cerkiew. Wspaniały **Dom zdrojowy**, kilka restauracyj. Kilka pensyonatów prywatnych. Mleczarnie. Cukiernie.

Muzyka zdrojowa, pod kierunkiem A. Wronskiego od 21 maja. Stały **Teatr**. **Koncerty.** — **Frekwencya** w r. 1893 — 4.600 osób.

Sezon od 15 maja do 30 września.

W maju, czerwcu i wrześniu ceny kąpiel, pomieszkań i potraw w głównej restauracyi niższe.

Rozsyłka wody mineralnej: od kwietnia do listopada, składy we wszystkich większych miastach w kraju i za granicą.

W miesiącu lipcu i sierpniu ubogim żadne ulgi, jak: uwolnienie od taks zdrojowych i t. d., udzielone nie zostaną.

Na żądanie udziela wyjaśnień

c. k. Zarząd zdrojowy w Krynicy.

ZEGIESTÓW

Zakład zdrojowo-kąpielowy nad Popradem

miejsowość odsłonięta tylko od południa, wyniesiona 486 mtr. nad poziom morza.

Stacya kolei żelaznej, poczta i telegraf w miejscu.

Najsilniejsza szczawa żelazista, kąpiele borowinowe, mineralne, popradowe i hydropatyczne, znakomita górska stacya klimatyczna, mleko, żentyca.

Pora kąpielowa trwa od 20 Maja do końca Września.

Wskazania lecznicze.

Zboczenia w odżywianiu i przemianie pierwiastków, choroby układu nerwowego, dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, narządu moczopłciowego, choroby kobiece, przewłoczne zatrucia (Rtęć, alkoholizm, morfinizm) przewłoczne choroby zakaźne.

Woda Żegiestowska przyjemna jako napój zastępuje Francensbadską

jest do nabycia we wszystkich składach wód mineralnych i aptekach tak w Galicyi jak i w Królestwie polskim.

Wysyłka rozpoczyna się z dniem 15 Marca i trwa aż do zimy. Skrzynia zawierająca 40 flaszek kosztuje na dworcu w Żegiestowie 7 Złr. 50 ct., skrzynia o 20 flaszek 4 Złr.

Woda Żegiestowska zawiera w 1000 częściach:

Dwuwęglanu litowego	0,0244
wapniowego	1,5628
żelazowego	0,0544
Kwasu węglowego istotnie wolnego	2,9661



Wszelkich bliższych wyjaśnień udziela na żądanie Zarząd Zakładu.

TRUSKAWIEC

Zakład zdrojowo-kąpielowy

**Stacya klimatyczno-lecznicza i zakład
inhalacyjny.**

Położony w uroczej górskiej okolicy (415 m. n. p. m.), posiada najsilniejsze w Europie źródła słone (23%), słono-glauberskie, siarczane i alkaliczne.

Rozporządza też kąpielami słonemi, siarczanemi, słono-siarczanemi i borowino-żelazistemi.

Zalecany przeto bywa Truskawiec przez najznakomitszych lekarzy krajowych i zagranicznych w cierpieniach skrofalicznych, gośćcowych, dnawych, syfilitycznych, we wszystkich chorobach połączonych z wysiękami, w przewlekłych cierpieniach pęcherza i nerek, w chorobach kobiecych, skórnych i nerwowych.

Nowo założona wzięwalnia według najnowszego systemu Wassmutha, nadaje się znakomicie do leczenia przewlekłych cierpień dróg oddechowych, a zwłaszcza rozédmy płuc.

Nadto zaopatrzony jest zakład w maszynki elektryczne, pompy żołądkowe, przyrządy do natrysków nosowych, aparat suspensyjny Charcot-Mocztukowskiego i t. d.

Ordynują lekarze zakładowi:

Dr Plech, cesarski Radca z Jarosławia, i **Dr Zenon Pelczar** z Krakowa, oraz wolnopraktykujący **Dr Steinhaus** ze Lwowa, emeryt c. k. lekarz powiatowy i **Dr Kozłowski** z Sanoka.

Kąpiele z dodatkiem środków lekarskich.

Na kąpiel pełną (po szyję) dla osoby dorosłej, liczy się 200—300 litrów płynu. 50—200 litrów na kąpiel dla dzieci. Na kąpiel sięgającą tylko do dołka podsercowego 100—150 litrów; kąpiel nasiadową 20—30 litrów, na kąpiel na nogi 10 litrów.

Za zimną uważa się kąpiel do				+ 15° R.
"	chłodną	"	"	+ 15 do 22° R.
"	letnią	"	"	+ 22 " 27° R.
"	cieplą	"	"	+ 27 " 32° R.
"	gorącą	"	"	+ 32° R.

K. gorczyczne. Na kąpiel pełną daje się 100—250·0 grubo potłuczonej gorczycy. Do kąpeli miejscowej np. na nogi 50—120·00.

K. igliwiowe. Ponieważ przez wygotowanie igliwia niemożna otrzymać eterycznych, a właśnie głównie działających pierwiastków, stósowniej przeto dawać ekstraktu. (Extr. turionum pini sylv. ad balnea, Nitribitta w Kryniey) 150—500 gram.

K. jodowe. (Wanna drewniana). Kali jodati 50—100·0 na kąpiel pełną; 5·0—10·0 na litr wody. — Jodi 10·0 kali jodati 20·0 rozpuścić w kilogr. wody i dodać do kąpeli, przyczem należy tak osłonić wannę, aby pacjent nie wdychał parującego jodu.

K. klejowe. 1—2 funtów Colla animalis, rozpuszczonego we wrzącej wodzie.

K. z kory dębowej lub z kory wierzby, kasztana itp. odwar z 1 funta w 2 litrach wody, lub też (ponieważ tutaj chodzi o środek ściągający), można użyć Taniny (acid. tannicum) 20—100 grm. rozpuszczonej w szklance wody.

K. z liści orzecha włoskiego. (Fol. Ingrandis) Dekokt z 1—2 fnt.

K. ługowe. Dwa do ośmiu funtów popiołu bukowego lub dębowego, gotuje się z kilkoma litrami wody, lub też potażu ($\frac{1}{4}$ —1 funta, na kąpiel pełną, dla dzieci połowę tej ilości).

K. mrówczane. Napar (Infusum) z 300·0—700·0 formica rufa.

K. mydlane. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ funta pokrajanego mydła na pełną kąpiel (Sapo domesticus, Sapo aromatic. lub Sapo kalinus).

K. z otrąb. 1—3 funtów otrąb pszenicznych odgotowanych w worczku w 4—6 litrach wody.

K. siarczane. 50·0—200·0 Kalium sulphuratum ad balneum, w celu wzmocnienia działania dodaje się 15—20·0 Acidum sulphur. crud.; aby jednak złagodzić, dodać można Colla animalis $\frac{1}{2}$ funta.

Bogatszym można zapisać:

Rp. Calcii sulphurati crudi 20·00,

Natri chlorati 7·50,

Extr. Saponar. 5·00,

F. c. Aq. font. q. s. Globulus. Dtur. tal. dos. 5.

S. Jedną kulę do kąpeli.

(Wanna drewniana, nie metalowa).

K. słodowe. Słodu jęczmiennego 4—6 funtów gotuje się z kilkoma litrami wody przez $\frac{1}{2}$ godziny, odcedza i wlewa do kąpieli.

K. słone. 3—5—15 funtów soli kuchennej lub morskiej.

K. sodowe. Natri carbon. crudi 200—500·0 na kąpiel pełną. 100—200·0 na kąpiel miejscową.

K. sublimatowe. (Tylko w wannie drewnianej) 2·50—10·0 Hydrarg. bichlor. corros. rozpuszczonego w 50—200·0 Aq. Na kąpiel miejscową tj. ręce i nogi 0·05—0·25.

K. ziołowo-aromatyczne. Napar rumianku lub mięty, korzenia tataraku, lub spec. aromatic. z 200—500·0 na 2000·0 wody, wlewa się do kąpieli, albo też dodać można: Aq. coloniens., Spir. Calami., Spir. Angelicae, Spir. Serpyll. (60·0—100·0 na dawkę). Dla dzieci połowę tych ilości.

K. żelaziste. Ferrum sulphur. siccum (50·0—200·0), Liquor ferri sesquichlorati (15·0—60·0), Tart ferratus s. globuli martiales pulv. (50—200·0), lub też do przyrządzania kąpieli żelazistej z kwasem węglowym; 1 część Ferr. sulph. sicc. (30·0), 2 części Natr. chloratum (60·0), i 3 części (90·0) Natr. bicarbon. nasypuje się warstwami do szklanki i razem wrzuca do wody (pro balneo 150·0—200·0 tej mieszaniny).

Rp. Ferri sulphur. sicci

Argillae aa. 100·00,

Mf. pulv. d. tal. dos. 10.

S. Jeden proszek do kąpieli.

Dla dzieci wszystkich przetworów po $\frac{1}{4}$ części.

Szkodliwe połączenia leków.

1. Dając kwas solny wewnątrz, nie należy przepisywać kalomelu, bo w żołądku utworzy się sublimat.

2. Nie należy kłaść plastru merkurialnego na miejscu posmarowaniem jodem, bo wytwarza się Hydr. bijodat. rubrum, wywołujące ból i zapalenie.

3. Nie dawać do wewnątrz jodu ani bromu gdy się oko posypuje kalomelem (najwcześniej można zasypać oko kalomelem w 24 godzin po ostatniej dawce jodu).

4. Nie łączyć kali chloricum z garbnikiem, kamforą, siarką, węglem w proszkach, bo nieostrożne potarcie wywołuje eksplozję.

5. Nie łączyć kwasów z zasadami, bo tworzą się sole.

6. Nie łączyć opium z garbnikiem, bo tworzą się garbnikauy nierozpuszczalne.

7. Nie łączyć Arg. nitr. z Aq. amygd. amar., bo wytworzy się sinek srebra.

Najwyższe dawki środków leczniczych,
których lekarz przekraczać nie powinien,
nie oznaczwszy wykrzyknikien (!)

	pro dosi	pro die
Acidum arsenicosum	0·005	0·02
„ carbolicum	0·10	0·50
Apomorphinum hydrochloricum	0·01	0·05
Aqua Amygdalarum amarum concentrata. .	1·50	5·00
„ Laurocerasi	1·50	5·00
Argentum nitricum	0·03	0·20
Atropinum sulphuricum	0·001	0·003
Cantharides	0·05	0·20
Chloralum hydratum	3·00	6·00
Cocainum hydrochloricum	0·10	0·30
Coffeinum	0·20	0·60
Cuprum sulfuricum qua emeticum	0·40	—
Extractum Aconiti radiceis	0·03	0·12
„ Belladonnae foliorum.. . . .	0·05	0·20
„ Cannabis Indicae	0·10	0·30
„ Colocynthis	0·05	0·20
„ Conii herbae	0·20	0·60
„ Hyoscyami foliorum	0·10	0·50
„ Opii	0·10	0·40
„ Scillae	0·20	1·00
„ Secalis cornuti	0·50	1·50
„ Strychni	0·05	0·15
Folia Belladonnae	0·20	0·60
„ Digitalis	0·20	0·60
„ Hyoscyami	0·30	1·00
„ Stramonii	0·30	1·00
Fructus Colocynthis	0·30	1·00
Herba Conii	0·30	2·00
Hydrargyrum bichloratum corrosivum . . .	0·03	0·10
„ bijodatum rubrum	0·03	0·10
„ jodatum flavum	0·05	0·20
„ oxydatum flavum	0·03	0·10
Jodoformium	0·20	1·00
Jodum	0·03	0·10
Kreosotum	0·10	0·50
Lactucarium	0·30	1·00
Morphinum hydrochloricum	0·03	0·12
Oleum Crotonis	0·05	0·10

	pro dosi	pro die
Opium	0·15	0·50
Phyostigminum salicylicum	0·001	0·003
Pilocarpinum hydrochloricum	0·03	0·06
Plumbum aceticum	0·10	0·50
Radix Aconiti	0·10	0·50
„ Belladonnae	0·07	0·30
Santoninum	0·10	0·30
Secale cornutum	1·00	5·00
Semen Strychni	0·12	0·50
Solutio arsenicalis Fovleri	0·5	2·00
Stibium Kalio-tartaricum	0·2	0·50
Strychninum nitricum	0·007	0·02
Tinctura Aconiti radiceis	0·50	1·50
„ Belladonnae foliorum	1·00	4·00
„ Cantharidum	0·50	1·00
„ Colchici seminis	1·50	5·00
„ Digitalis	1·50	5·00
„ Jodi	0·30	1·00
„ Lobeliae	1·00	5·00
„ Opii crocata }	1·50	5·00
„ „ simplex }		
„ Strophanthi	1·00	3·00
„ Strychni	1·00	3·00
Veratrinum	0·005	0·02
Vinum Colchici seminis	1·50	5·00
Zincum sulfuricum qua emeticum	0·80	—

Waga różnych dawek.

Łyżeczka cieczy waży mniej więcej 3—5 grm. Łyżeczka cukru, soli, siarki 2·5—5 gram., proszków różnych 2·50. Łyżka wody 15 grm. Łyżka syropu 20·0. Garść nasion 70—80 grm. Garść liści 20—30 gr. Szezypta kwiatu 2 grm. Litry wody dest. 1000·0; litr spirytusu 850; litr chloroformu 1480; litr oliwy 920·0; szklanka 200—250·0; kieliszek 70—80 grm.

Porównanie wag aptekarskich.

28·5 unc. = kilogr.	1 gran = 0·07
1 unc. = 35 grm.	2 „ = 0·15
6 „ = 210 „	3 „ = 0·22
1 drachma = 4·3 grm.	$\frac{1}{2}$ „ = 0·04
$\frac{1}{2}$ „ = 2·15 „	$\frac{1}{4}$ „ = 0·02
1 skrupuł = 1·5	$\frac{1}{8}$ „ = 0·008

L e k i	Do 1 roku	od 1—5 lat	do 5—10 lat
Hydrargyrum tannicum oxydulat.	0·005	0·02	0·03
Hydrochinon	0·05	0·2	0·3
Kalium bromatum	0·1	0·3	0·5
Kalium chloricum	1·0	2·0	3·0
Kalium jodatum . } pro die . .	0·1	0·5	1·0
Kreosotum	0·005	0·01	0·02
Liquor Ferri sesquichlorati pro die	0·3	0·5	0·5
Liquor Kali arsenicosi	—	0·05	0·1
Morphinum hydrochloricum	—	0·001	0·003
Naphtalinum	0·05	0·2	0·2
Natrium paracresotinicum	—	0·25	0·5
Natrium salicylicum pro die . . .	1·0	2·0	3·0
Phenacetinum antipyr.	—	0·1	0·3
Phenacetinum antispasm.	0·001	0·05	0·1
Pilocarpinum hydrochloricum (inj.)	0·001	0·002	0·004
Plumbum aceticum	0·003	0·005	0·01
Phosphorus	—	0·0001	0·0002
Podophyllum	—	0·005	0·015
Pulvis Ipecacuanhae opiatus . . .	—	0·005	0·02
Radix Ipecacuanhae emetic. . . .	0·05	0·1	0·2
Resorcinum	0·2	0·4	0·5
Santoninum	—	0·01	0·02
Sirupus Ferri jodati	1 gtt.	5 gtt.	10 gtt.
Strychninum nitricum (inj.) . . .	—	0·0005	0·001
Tartarus stibiatus	—	0·0075	0·01
Thallinum sulphuricum	0·01	0·02	0·03
Tinctura Opii simplex	0·025	0·05	0·2
Tinctura Strophanthi	—	—	3 gtt.
Urethanum	0·05	0·1	0·2

Porównanie dawki leków

według rozmaitego wieku chorych.

Dawki zmieniają się mniej więcej, jak następuje:

aż do ukończonego 1 roku $\frac{1}{10}$

od 2 do 4 " $\frac{1}{8}$

" 5 " 7 " $\frac{1}{5}$

" 8 " 10 " $\frac{1}{4}$

" 11 " 14 " $\frac{1}{2}$

Począwszy od roku 50 należy dawki znowu zmniejszać tak, iż u starców między rokiem 60 a 70 należy znów dawać tylko $\frac{1}{3}$ dawki dla osób dorosłych.

Kobietom zadają się wogóle mniejsze dawki, mniej więcej $\frac{2}{3}$ tej, jaką się przepisuje mężczyznom odpowiedniego wieku.

Ile kropli leków płynnych liczy się na gram.

Acet. concentrat	16	carvi, chamomil. aeth.,	
Acid. acetic	16	citri, crotonis, foeni-	
„ hydrochlor.	13	culi, juniperi, lavan-	
„ „ dilut.	16	dulae, menthae, ori-	
„ hydrocyanic. Aqu. . .	16	gani, rosmarini, rosae,	
„ „ spirit.	32	sabinae, tanaceti, tere-	
„ nitricum	12	binthinae, eucalypti .	25
„ phosphor.	16	Ol. caryophyl., cinnam.	20
„ sulphur. con.	12	„ pinguae	20
„ „ dilut.	16	Petrol. rectificat . . .	25
Aether acetic.	25	Plumb. acet. solut. . .	20
„ sulphur.	50	„ basic. solut. . . .	16
Aq. amygd. amar. . . .	24	Solutio arsen. Fowleri.	16
„ destilat. var.	16	„ extr. narcot. (1:2)	37
„ spirit. var.	25	Spir. aethereus	25
Bals. copaivae	25	„ alcoholis 90 $\frac{1}{2}$ % . .	40
„ peruv. nigr.	16	„ ferr. chlor. aeth. . .	25
Carbon sulphur.	25	„ muriat. aeth. . . .	30
Chloroformium	25	„ nitric. aeth.	30
Ferrum sesq. sol.	12	„ varii c. spir. vini	
Kali carbon. sol.	16	dil. parat.	25
Kreosotum	25	„ Vini concentr. . . .	30
Liq. acidi Halleri. . . .	25	„ „ dilut.	25
„ hydrar. nitric. . . .	12	Stibium chlor. solut. .	12
Mucilago gummi ar. . .	12	Syrupi var.	12
Oleum amygd. aether. .	20	Tinct. spirituos.	25
„ anis, auranti flor.		Vinum stibiat. et alia	
bergamottae, cajeputi		vina medicam	20

Leczenie zapomocą wziewań.

Wdychanie rozpylonych cieczy używa się w cierpieniach błony śluzowej ust i połyku (pharyngitis catarrhalis, grannlosa, ulcerosa, crouposa, syphilitica), a także w cierpieniach dróg oddechowych: bronchitis putrida, bronchiectasia, bronchorrhoea, po zapaleniu miąższu płucnego przyrody zapalnej czy gruźliczej. Używanie rozpylacza jest daleko przyjemniejsze, jak tuszowanie lub wdmuchiwanie suchych pyłów.

Oddychać należy głęboko, spokojnie, przycisnąwszy język ku dołowi, w ciągu $\frac{1}{2}$ —1 minuty, a następnie przerywać na parę minut, aby odpocząć. Jedno posiedzenie trwa 5—30 minut, 2—4 razy dziennie. Wziewania mleczanki ze środkami odurzającymi lub bez tychże usuwają w ostrych nieżytach tchawicy i oskrzeli przykre uczucie palenia i suchości; wziewanie płynów rozpuszczających błony chorobowe może znacznie zmniej-

szyc nasilenie choroby, nareszcie wziewanie środków lotnych, balsamicznych i przeciwnilnych może wpłynąć na ograniczenie ilości chorobowej wydzieliny i na zniszczenie smrodliwych jej własności w chorobach dróg oddechowych. Do środków wysuszających zawartość jam zapalnego czy też gruźliczego pochodzenia należą: oczyszczona smoła drzewna, ol. terpentynowy. olejki żywiczne (ol. pini), kreozot, tymol. Używają się te środki zwykle wtedy, gdy gorączka jest słaba (do 38° C.), a płwocina obfita. Do środków odwianiających i niszczących obrzydliwy zapach należy przedewszystkiem kwas fenilowy; środka tego używa się tam, gdzie podniesienie ciepłoty jest wysokie (39—40° C.). w okresie jam, po zapaleniu przyrody gruźliczej.

Dawki środków używanych do wziewań.

- Acid. benzoicum 0·5—1·0 na 10 spir. vini.
 Acid. carbolieum 0·5—1·0 na 100 wody.
 Acid. lactieum 1—2:100.
 Acid. tannieum 1—2:100.
 Alumen crud. 2—3:100.
 Ammonium chloratum 1—2:100.
 Amylnitrit 2—5 kropli nalać na chustkę i wdychać.
 Aq. calcis szczera lub na połowę z wodą.
 Aq. chlorata na pół z wodą.
 Aq. hydrosulphurata na pół z wodą.
 Aq. laurocerasi 3—5:100.
 Aq. picis szczera lub na pół z wodą; chorzy ją znoszą chętnie, bo nie drażni.
 Argent. nitr. 0·1—0·2:100.
 Borax venet. 3—5:100.
 Bromum, Kali brom. aa. 0·2:100 na gąbce, oddycha się przez rurkę.
 Emuls. oleosa 5:100.
 Extr. conii maculat. 0·05—0·15:100, albo Extr. stramonii 0·5—1·50:100.
 Extr. hyoseyami 0·05—0·20:100.
 Extr. opii aq. 0·1—0·2:100.
 Ferri sesquichl. solut. 0·5—1:100.
 Flores sambuci, flores tiliae, rad. Altheae 5—25 na 500·0.
 Glicerini puri 10:100.
 Hydr. bichlor. corros. 0·05—0·10:100.
 Kali bromati 3:100.
 Kali chlor. 3—5:100.
 Kali hypermang. 0·1—0·2:100.
 Kali jodati 1—2:100, albo z dodatkiem 0·02 jodu czystego.
 Kreosot. gtt. 2:100.
 Liq. kali caustici 2:100.
 Lithium carbon. 0·2—2:100.
 Morph. muriat 0·1:100.
 Natrium chlorat. 1—2:100.
 Natr. benzoicum 1—2:100.
 Natr. bicarbon. 3—5:100.
 Natr. hydrochlor. 0·2—2·0:100.

Ol. pini 1—2:100, albo Ol. terebinthinae rect. 1—2:100.

Plumb. acet. bas. sol. 3—5:100. Pyridin 3—5:0:100.

Tannini puri 1—2:100.

Tinct. cannabis indicae 0·5—1:100

Tinct. jodi 0·10 z Spir. vini 10:100.

Tinct. opii simpl. 0·2—0·5:100.

Zincum sulphur. 1:100.

Leki w cieple ulatniające się, jak Ol. pini, Ol. terebinth. można wzięwać bez przyrzędu, nalawszy do szklanki 10 do 20 kropli i wstawiwszy ją do gorącej wody.

Mineralne wody z Ems, Salzbrunn, Szczawnickie do wzięwań używają się szczerze lub wodą rozcieńczone.

Z kalend. Dr. J. St. Saw.

Leczenie zapomocą wstrzykiwań podskórnych.

Używane zwykle strzykawki zawierają 1 grm. płynu i są zaopatrzone w przedziałkę dziesiętną. Przepisywać więc należy lekarstwo rozpuszczone w 10 grm. płynu, a wtedy każdy decigram (0·1) cieczy zawierać będzie setną część przepisanego leku.

Acidum carbolicum crystallisatum 0·10 na Aq. dest. 10·0; z tego $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki t. j. 0·005—0·01 kwasu karbolowego na raz. Działa przeciwnie, miejscowo znieczula. Używa się w róży, reumatyzmie stawów, itd.

Acidum osmicum 1:100, 0·5—1·0 pro dosi (= 0·005—0·01) jako antineuralgicum in loco; S. ad vitrum fuscum.

Acid. sclerotinicum 5:100 aq. dest. p. dosi 0·5—1·0 (0·025—0·05).

Aether 0·5—1·0 naraz.

Apomorphinum hydrochl. 0·10 na 10·0 aq. dest., z tego 3—7 podziałek, 0·003—0·007 apomorphinu) dorosłym, a 1— $\frac{1}{2}$ dzieciom. S. Środek wymiotny.

Aspidosperminum alcaloid Quebracho 2:100 wody; pro dosi 1·0 (= 0·02) i więcej.

Atropinum sulph. 0·01:10·0 wody; z tego 5—10 podziałek (0·001—0·002 Atropinu). W tępcu, nerwobólach, padaczce, drgawkach, wściekliwości i otruciu morfiną. Zaleca się wielką ostrożność!

Camphorae 0·50 Ol. amygd. dulc. 10·0; $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki (0·005—0·01 kamfory), środek pobudzający.

Chininum bisulphuricum (lepsze, niż chininum sulphur.). 1·0 rozpuszcza się wśród ogrzania w 5·0 gliceryny czystej i 5·0 wody; z tego używa się 8—10 podziałek (0·03 do 0·10 chininy). W zimnicy, nerwobólu, gościecu stawowym.

Chloralum hydratum cryst. 4·0 na 10 wody; 1—4 strzykawkę wstrzyknąć w różne części ciała (Łatwo sprawia ropnie). Środek nasenny i kojący ból.

Chloroformium purum 1·0 i więcej.

Cocaini murat. 0·5 na 10 wody $\frac{1}{2}$ strz. = 0·01 kokainy w zapaleniu tęczówko-rzęskowem dla uśmierzenia bólów.

Coffeinum purum citricum, hydrobromicum 0·5 Aq. dest. Spir. vini dil. aa. 5·0; $\frac{1}{2}$ do całej strzykawki na raz (0·01—0·05 kofeiny); migrena, otrucie morfiną.

Curarinum sulph. 0·2 Aq. dest. 10·0 z tego wstrzykuje się ostrożnie 1—4 podziałek (0·002—0·01). Poraża końce nerwów. Używa się w tężcu i kureczach.

Daturinum jak atropinum sulphuricum.

Digitalinum 0·05 Aq. dest. Spir. vini dil. aa. 5·0; z tego 1—5 podziałek (0·005—0·01 Digitalinu). Obniża czynność serca.

Duboisinum sulphuricum 1:500 aq. dest.; p. dosi 0·1—0·2 = (0·0002—0·0004).

Eserinum 0·1—0·5 Aq. destil. 10·0; $\frac{1}{5}$ —1 strz. (0·01—0·05).

Extr. secalis cornut. aq. 1·0 Aq. dest. Glycerini puri aa. 5·0; $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ —1 strzyk. (0·025—0·05—0·10 Sec. corn.). W krwotokach, w długotrwałem zapaleniu macicy, włókniakach macicy, wypadaniu kiszki stolcowej. Najlepiej używać extract bis purificat.

Ferrum pyrophosphoricum c. natro citrico 2 na 10 wody. z tego 1·0 in Anaemia perniciosa i w wypadkach, gdy wewnętrzne użycie żelaza jest niemożliwe z powodu nieżyty żołądka i kiszki, wrzodu żołądka itp.

Gelsemininum hydrochl. 1:200 wody; 0·1—0·2 pro dosi (0·0005—0·001) przeciw nerwobólom.

Hydrargyrum bichloratum corrosivum 0·1 w 10 wody; z tego $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki (0·005—0·01 sublimatu). *Hydrarg. cyanat.* 0·5 na 10 wody i strzykawkę na raz.

Hydrarg. formamidatum solutum 1:100; 0·5—1·0 p. dosi.

Kalium jodatum 3·0 na 10 wody, $\frac{1}{2}$ —1 strzyk. (0·15—0·3 Jodu).

Liq. hydrargyri albuminati 1:100; 0·5—1·0 pro dosi.

Morphium acet. (hydrochlor., sulph.), 0·20 na 5 gliceryny i 5 wody, 3, 5, 7 podziałek do całej (0·003, 0·005, 0·007—0·01 Morph.); do 0·02 pro dosi.

Narceini hydrochlor. 0·20 na 10 wody, 3, 5, 7 podziałek do całej strzykawki, t. j. do 0·006—0·02 Narceiny.

Physostigminum salicylicum lub *muraticum* 1:500 aq. dest.; pro dosi 0·2—0·5 (0·0004—0·001) zamiast Eserinum murat.

Pilocarpinum mur. 0·20 aq. dest. 10·0; $\frac{1}{2}$ strz. = 0·01.

Solut. arsen. Fowler 1·0 z tego rozcieńcza się 20 wody, 0·3—0·6 pro dosi w drzeniu, psoriasis, chorea.

Strichninum nitr. v. sulph. 0·10 na 10·0 wody; z tego 3—6 podziałek, t. j. 0·003—0·006 strychniny na raz. Wywołuje kurcze. Zadaje się w porażeniach po otruciu ołowiem, w porażeniu pęcherza, w porażeniach obwodowych odnóg i mięśni kiszki stolcowej, w porażeniu poprzecznym (paraplegia), Ataxia med. spin., Atrophia musc. progres. i paralysis infantum essent.

Tinct. opii 5—15 kropli na jedno wstrzyknięcie.

Aconitinum, Coniinum, Emetinum, Hyoseyaminum nie leczą się, bo działają niepewnie.

Strzykawka, której igła ma otwór zapechany, oczyszcza się przeciągnięciem jej na chwilę przez płomień. Jeżeli otwór zardzewiał, to należy wprzód oliwy do igły wciągnąć, następnie ogrzać, a po tem jeszcze wysokiem przepłukać. Taksamo postąpić, jeżeli drut w igle zardzewiał.

Z kalend. Dr. J. St. Saw.

Tablica brzemienności.

Ostatnia regularność		Dzień porodu		Ostatnia regularność		Dzień porodu	
Styczeń	1	Październ.	8	Lipiec	5	Kwiecień	12
"	5	"	12	"	10	"	16
"	10	"	17	"	15	"	21
"	15	"	22	"	20	"	26
"	20	"	27	"	25	Maj	1
"	25	Listopad	1	"	28	"	4
Luty	1	"	4	Sierpień	1	"	8
"	5	"	8	"	5	"	12
"	10	"	12	"	10	"	17
"	15	"	22	"	15	"	22
"	20	"	27	"	20	"	27
"	25	Grudzień	1	"	25	Czerwiec	1
Marzec	1	"	6	"	28	"	4
"	5	"	10	Wrzesień	1	"	8
"	10	"	15	"	5	"	12
"	15	"	20	"	10	"	17
"	20	"	25	"	15	"	22
"	25	"	30	"	20	"	27
"	28	Styczeń	2	"	25	Lipiec	2
Kwiecień	1	"	6	"	28	"	5
"	5	"	10	Październ.	1	"	8
"	10	"	15	"	5	"	12
"	15	"	20	"	10	"	17
"	20	"	25	"	15	"	22
"	25	"	30	"	20	"	27
"	28	Luty	2	"	25	Sierpień	1
Maj	1	"	5	"	28	"	4
"	5	"	9	Listopad	1	"	8
"	10	"	14	"	5	"	12
"	15	"	19	"	10	"	17
"	20	"	24	"	15	"	22
"	25	Marzec	1	"	20	"	27
"	28	"	4	"	25	Wrzesień	1
Czerwiec	1	"	8	"	28	"	4
"	5	"	12	Grudzień	1	"	7
"	10	"	17	"	5	"	11
"	15	"	22	"	10	"	16
"	20	"	27	"	15	"	21
"	25	Kwiecień	1	"	20	"	26
"	28	"	4	"	25	Październ.	1
Lipiec	1	"	8	"	28	"	4

Otrucia ostre i sposób ratowania w tychże.

Trucizna	Objawy	Odtrutki
Aconitinum. Tojad mor-downik (fo-lia, flores, radix, Tinet., Extract).	Pieczenie języka, dławie-nie mrowienie, drętwienie kończyn, ślinotok, wymio-ty, tętno słabe, obniżenie ciepłoty ciała, zimne poty, niepokój, rozszerzenie źre-nie, zabójcza dawka 0·003 —0·004.	Leki wymiotne, pompa żołądkowa, kawa, her-bata, wino, kamfora, Acid. tannic. 4·0 Aq. d. 200·0. Syr. 20·0. S. Co. 5 min. łyżkę. Sztuczna wentylacja płuc.
Acidum car-bolicum.	Wymioty, ból w epigastri-um, zapad, śpiączka. Tru-jąca dawka od 5·0.	Emetica, pompa żołąd. Calcaria saccharata, mleko, kleiki, lód. Rp. Magnes. ust. in Aqua 200·0. S. Połowę na raz, później co 1/2 g. łyżkę. Lód, magnezja, kreda. soda we wodzie, dużo płynów, woda mydla-na, kleiki.
Acidum hy-drochl. „ nitricum. „ sulphur.	Obrzmienie bł. śl. ust, pa-lenie i pieczenie przew. od ust do żołądka, bóleści, wymioty kwaśne fusowate, upadek sił.	Środki wymiotne, sztu-czne oddychanie, oble-wania zimną wodą, środki drażniące skórę.
Acidum hy-drocyanic. kwas sino-wodowy kw. pruski Aq. lauroc.	Wdech krótki, wydech zna-cznie dłuższy, drgawki, po-rażenie oddechania. Mdło-ści, nieprzytomność.	Środki wymiotne, sztu-czne oddychanie, oble-wania zimną wodą, środki drażniące skórę.
Aether	Śpiączka, znieczulenie, u-stawianie oddechu i tętna. Przy wydechu czuć eter.	Sztuczne oddychanie, (faradyzacja n. phre-nic.), zbryzganie wo-dą, iniekty. Strychniny (0·001), gorczycznik na okolicę serca.
Alkalia Ług potas. i sodowy, amoniak żrący, sal-miak.	Nadżarcia ust, ból silny pa-lący w przełyku, wymio-ciny składają się z rozło-żonej krwi i oddział. alkalicznie, kółka często krwa-we stolce.	Mleko, rozcieńczony kwas cytrynowy, pi-gułki lodowe, gdy stol-ce krwawe, lewatywy z wody, z lodu.
Alkohol	Odurzenia, utrata przyto-mności, wymioty, zwężenie źrenic, zapad, lepka zimna skóra, piana z ust, woń wysoku z ust, tętno małe, powolne.	Zlewania zimną wodą, lód na głowę, ręce i nogi zanurzyć w go-rącej wodzie, synapizm na kark, lewatywy z zimnej wody.

Trucizna	Objawy	Odrutki
Antimonium Tart. emetic.	Gwałtowne wymioty, osłabienie akcji serca i osłabienie ogólne, ból palący w żołądku i kiszka, zimny pot, później rozwolnienie, pragnienie, drgawki.	Pompa żołąd., pigułki lodowe, mleko, Tanina, Opium.
Anilinum	Nudności, ból głowy, trudne oddychanie, senność, utrata przytomności, znieczulenie skóry. Sina barwa bł. śluz. i skóry, ciepłota niska, tętno wolne.	Pompa żołąd., środki wymiotne, białko, sztuczne oddychanie, leki podniecające, magnez.
Argentum nitricum	Wymioty białawe, czernieją na powietrzu, oznaki zapalenia żołądka i jelit.	Sól kuchenna, białko, mleko.
Arszenik i jego przetwory.	Ból w okolicy żołądka, nudności, wymioty, biegunka, skóra zimna, przy uczuciu palania, pragnienie. Tętno małe, szybkie, oddech przyspieszony mozołny. Czasami drgawki. Po arsenowodorze mocz krwawy, dawka zabójcza 0'1.	Środki wymiot., (zinc. sulph.) ferr. hydrie. in Aqua, Magnezja, Antidot. arsenici.
Atropinum Radix, folia, baccæ bellad. Szalej.	Suchość i drapanie w gardle, chrypka, nudności, trudność mówienia i połykania, pragnienie, ból i zawrót głowy, złudzenia i omamy, rozszerzenie źrenic, parcie na mocz, osłabienie serca, szal, drgawki, tężec, podwójne widzenie.	Pompa żołąd., środki wym., tanina, kali jodat. morfina, opium, wyskok. Rp. Pilocarp. mur. 0'05, Aq. dest. 5'00 do inj. Zimne okłady na głowę.
Baryum zob. Plumbum Bromum zob. Jodum Camphora	Popęd do ruchów, gonitwa myśli, drżenie, drgawki.	Środki wym., oblewanie zimną wodą.
Cantharides	Ból w ustach, przełyku, żołądku, pęcherze w jamie ust, pragnienie, nudności, kurcze przełykowe, mocz krwawy, podrażnienie części płciowych, ból głowy, odurzenie, drgawki.	Pompa żołąd., klejki napoje z lodem, kamfora, Opium. Unikać tłuszczów!

Trucizna	Objawy	Odrutki
Chloral hydratum	Senność, zwięźlenie źrenic, zwolnione oddychanie i tętno, ciepłota obniżona.	Środki drażniące skórę inj. Strychn., Cocainy, ochranianie przed oziębieniem ciała.
Chloroform	Senność, zwięźlenie źrenic, obniżenie respiracyi i akcyi serca, obniżenie temperatury, woń chloroformowa z przewodu oddch., porażenie oddechania.	Sztuczne oddychanie, inj. Strychniny, zlewanie zimną wodą, środki drażniące skórę.
Chlorum	Skurecz głośni, krwioplucie.	Świeże powietrze, wdychanie amoniaku i ciepłej pary.
Cocainum	Tętno zmienne, powolne to szybkie, duszność, pobudzenie, drgawki.	Wdychanie amyl-nitritu, ciepłe kąpiele, morfina.
Codeinum z. Morfine		
Coffeinum	Niepokój, odurzenie, zawrót głowy, drżączka, kołatanie serca.	Pompa żołąd., środki wymiotne, kali jodat., sztuczne oddychanie, Morphinum.
Colhicin Semen.	Silne bóle brzucha, wymioty, biegunka, pragnienie, tętno zwolnione, mąjaczanie, drgawki.	Środki wym., Tanina, Opium, eter, kamfora, wino.
Colch. Zimowit		
Cuprum grynszpan	Wymioty zieloną treścią, kolka, stolec krwawy, drgawki, oddech utrudniony, nieregularne tętno.	Białko z wodą, mleko, lewatywy ze skrobi, purgantia, wogóle środki osłaniające.
Digitalis	Wymioty, często biegunka, tętno zwolnione, następnie nieregularne, rozszerzenie źrenic, osłabienie mięśniowe, zapad, drgawki.	Środki wymiotne, wino, kamfora, Liquor ammon. anis, synapism.
Ergotinum secal. corn. sporysz	Slinotok, nudności, wymioty, biegunka, ból głowy, drętwienie, śpiączka, zatrzymanie moczu, zapad.	Emetica. opium, amyl-nitrit, chloralhydrat, eter, wino, kawa.
Hydrargyr. Sublimat	Smak metaliczny, ból w ustach, przetyku i żołądku, wymioty, biegunka, czasem krwawa, zatrzymanie moczu, zapad.	Pompa żołąd., mleko, białko.
Hyoscyamus z. Atropin		

Trucizna	Objawy	Odrutki
Jodum	Ból w gardle, przełyku i brzuchu, wymioty, zatrzymanie moczu, osłabienie, tętno słabnie.	Kleiki z mąki pszennej, białko, magnezja, lód, środki drażniące skórę.
Kalium chloricum	Objawy ze strony żołądka i jelit, upadek sił, zatrzymanie moczu, sinica, haematurya.	Pompa żołądk., środki wym., środki podniecające, moczo-pędne, pilocarpin, transfuzja krwi lub wlewanie śródżylne soli kuchen.
Kreosotum	Zob. kw. karbol.	Pompa żołądk., białko.
Morphinum Opium	Zapad, upośledzenie czucia, <i>silne zwężenie źrenic</i> , skóra blada, głowa gorąca, oddychanie zwolnione, zatrzymanie moczu, pod koniec tężec lub drgawki.	Pompa żołądk., środki wym. z wyjątkiem tart. emetici, sztuczne oddychanie, tanina, lód na głowę; ręce i nogi do gorącej wody, synapismy, lewatywy z octem, mocna kawa, Coffeina, Atropina (0·01—10·00 Aq. do inj.).
Nicotinum	Uczucie drapania i palenia w ustach i przełyku, biegunka z silnem parciem, wymioty, bladeść skóry, tętno wolniej, kurcz mięśni oddechow., z początku zwężenie, później rozszerzenie źrenic, tężec, zapad.	Pompa żołąd., kali jodat., Tanina, lewatywy z octu, sztuczne oddychanie, cały aparat środków pobudzając.
Opium vide Morphium Petroleum	Zaburzenia żołądkowo-kiszkowe, zadrażnienie nerek, ból głowy, senność, zapad.	Pompa żołądk., Emetica, sztuczne oddychanie. Exeitantia.
Phosphorus	Ból w dołku podsercowym i wymioty miazgą, świecąca w ciemności, mająca woń fosforu. Gastroenteritis, żółtaczka, bolesność w okolicy wątroby i powiększ. tejże. Lekka gorączka, później wymioty krwawe, osłabienie serca, krwotoki z nosa, jelit, macicy, spiączka, drgawki, mocz krwawy.	Pompa żołąd., purgantia, środki wymiotne: Cupr. sulphur. 1·0:40·0 Aq. dest. S. na raz połowę, po 5 minut. jeżeli trzeba, resztę. Ol. terebinth., crudum (ozonizatum), co $\frac{1}{4}$ godz. po 10 kropli w kleiku. Unikać tłuszczów!

Trucizna	Objawy	Odrutki
Plumbum octan. oł.	Palenie w gardle i żołąd- ku, wymioty, biegunki, mor- zysko, następnie w chro- nicznych przypadkach za- parcie stolca, zawrót głowy, mdłości, porażenia, bóle, przypadki mózgowe.	Emetica, Purgantia, kwas siarkowy roz- cieńczony, siarkan po- tasowy. W braku od- trutek: mleko, białko. Po odtrutkach znowu emetica i purgant, pó- źniej opium i ciepłe kapiela.
Santoninum	Wymioty, odurzenie, żółto- widzenie, upośledzenie res- piracyi, drgawki, (badanie mocz u rozstrzygnąć może).	Pompa żołąd., emetica, Purgantia, sztuczne od- dychanie, przy drgaw- kach Chloral.
Strychninum wronie oko	Kurcze, Paraestęsia wszy- stkich zmysłów. uczucie cią- gnięcia w mięśniach, karku, tężec, szczękostisk, opisto- thonus, sinica, oddech prze- rywany, tętno małe. Przy- tomność zachowana. Dawka trująca 0·015—0·03.	Pompa żołąd., Emeti- ca, Chloralhydr., wzie- wanie chloroform., mor- fina (inj.), czarna kawa.
Sublimat v. hydrgr. Trucizna kiszkowa zepsute kiszki, kielbasy, wędliny	W kilka lub kilkanaście godz. po spożyciu mdłości, ból w okolicy żołądka, mor- zysko, Gastroenteritis, su- chość w ustach, trudność w połykaniu, tętno przyspie- szone, upośledzenie wzro- ku, podwójne widzenie.	Emetica, Purgantia, Calomel, lewatywy, pó- źniej: Rp. Aether de- pur. 2·0 Aq. dest. 150·0, Trae laud. gtts. 10. Syr. 20·0. S. Co $\frac{1}{2}$ g. łyżkę.
Ukąszenie jadowitych węzów	Rozwijające się obrzmie- nie w okolicy rany, skóra sina, ziębnienie i ocięża- łość, osłabienie, drżenie, mdłości, tętno ledwie wy- czuwalne, śpiączka, drgaw- ki, (krwotoki z nosa, ust, żołądka).	Wypalenie rany rozp. żelazem, c. kali cau- stic., wyssanie rany Przewiązanie powyżej rany, wymycie octem, amoniakiem. Na we- wnątrz excitantia: Li- quor ammon. anis: kamfora, wino, cognac.
Gaz świetlny Tlenek węgla	Ból głowy, odurzenie, tę- nienie naczyń szyjnych, wymioty i śpiączka, zaczer- wienie powłok, drgawki.	Usunięcie chorego z at- mosfery zatrutej. Sztu- czne oddychanie, upust krwi. Transfusia.

Ratowanie pozornie umarłych.

Pierwszem zadaniem lekarza wezwanego do pozornie zmarłego powinno być poznanie powodu pozornej śmierci. Rozpytać więc należy obecnych, następnie zbadać ciało, czy nie ma gdzie obrażeń, czy nie nastąpiło udławienie się, czy nie ma plam lub woni, charakteryzujących truciznę, ale jednocześnie, nie tracąc czasu, należy przystąpić do ratowania, a mianowicie:

1. Rozpiąć odzież, obnażyć piersi i szyję, rozpuścić pas lub gorset i obrócić twarz ku drzwiom lub oknu, które należy otworzyć chociażby w czasie mrozu.

Najważniejszą rzeczą jest przywrócenie oddechu, które można skutecznie w rozmaity sposób: 1. nadając choremu położenie boczne, podtrzymując głowę, drażniąc błonę śluzową nosa piórką, słomką lub tabaką, skrapiając mocno twarz i piersi zimną wodą raz po raz, i obcierając po każdym skrapianiu; 2. albo kładąc pozornie zmarłego twarzą ku dołowi, podkładając pod pierś zwiniętą odzież jego, następnie obracając go na bok, a nawet prawie na plecy, żeby nastąpił wdech, a potem szybkim poruszeniem obracając go napowrót twarzą na dół, żeby nastąpił wydech. Powtarza się to 15 razy na minutę i za każdym razem, gdy twarz jest ku dołowi obróconą, należy naciskać plecy, żeby pomódz wyciśnieniu z piersi powietrza; albo 3. wyciągnąwszy język chorego, położyć pacjenta plecami na pochyłą płaszczyznę na wznak, potem stanąwszy przy głowie chorego, uchwycić za ręce wyżej łokci i podnieść je do skroni, a następnie napowrót do klatki piersiowej, przyciskając do niej łokcie mocno, żeby wycisnąć powietrze, znajdujące się w płucach. Powtarza się to około 15 razy na minutę. Jednocześnie można ułatwić wydech pociskaniem brzucha i przyciskaniem doń zgiętych kolan, wdech zaś wyciąganiem nóg, aby napiąć mięśnie brzuszne.

3. Jak tylko oddech naturalny nastąpi, starać się wzbudzić krążenie krwi, pocierając rękami całe ciało, dając środki pobudzające: krople Hofmana, Aether acetic., Liq. amon. anisat, itp.

4. Ratunek winien być dzielny i czynny, ale bez pośpiechu i w należyтым porządku wykonany, przyczem nigdy nie tracić nadziei przywrócenia do życia, chociażby po godzinie bezwzględnej pracy, gdyż są przykłady wskrzeszenia po usiłowaniach trwających sześć godzin i więcej.

Omdlenie. Poziome położenie, usunięcie z pokoju osób zbyt cnych; świeże powietrze, rozpiąć odzież i skrapiać twarz zimną wodą; skronie nacierać eterem lub octem z wodą; dać wachać mocny ocet, salmiak, krople Hofmana (Liq. anodynus Hofmani); ostatnie i do wewnątrz (20—30 kropli). Po przejściu omdlenia Amilnitrit. najwięcej 3 kr. na chustec do wachania.

Apopleksya. Ułożyć głowę wysoko i zastosować zimne okłady często zmieniane, lub pęcherz z lodem; na wewnątrz — leki przeciyszczające, szczególnie, gdy kał lub gazy nagromadzone; na zimne kończyny dolne, kamionkę ogrzaną. Jeżeli twarz mocno czerwona, a żyły szyjne obrzmiałe — upust krwi.

Wstrząśnienie mózgu. Jak przy omdleniu, a zresztą stosownie do przypadków.

Padaczka. Ułożyć chorego tak, żeby nie mógł sobie zrobić nic złego; rozpiąć odzież, między zęby włożyć łyżkę drewnianą owiniętą w płótno, aby uchronić język od obrażenia. Jeżeli twarz jest mocno zaczerwieniona i żyły szyjne nabrzmiąte — zimne okłady, albo niewielki upust krwi.

Rażenie piorunem. Położyć poziomo, oblewać zimną wodą, obwiązać zmoczonymi prześcieradłami, środki trzeźwiące. Prosty lud okłada ciało świeżą ziemią. Przedewszystkiem zaś wzbudzić oddechanie. Rany spieczone okłada się zimną wodą.

Uduśnienie gazami. Położyć chorego na czystym powietrzu poziomo z nieco podniesioną głową i cucić, jak przy omdleniu; lać wodę w twarz, a jeżeli zbiera się na wymioty — ułatwić to, łecząc gardło chorągiewką pióra.

Powieszenie. Zdjąć ostrożnie, potem przeciąć pętlę; ułożyć z nieco podniesioną głową na świeżem powietrzu i zastosować oddech sztuczny, skrapianie, nacieranie podeszew i dłoni, jeżeli przypływ krwi do głowy jest zbyt wielki, to wenesekcya. Drażnić enemy z solą i mydłem.

Zaduszenie ciałem obcem. Wydalić obce ciało przedewszystkiem, albo za pomocą narzędzi odpowiednich, albo wciskając do żołądka, jeżeli to są pokarmy, albo uciec się do przecięcia połyku. Jeżeli obce ciało jest połknięte, to dać do zjedzenia znaczną ilość chleba razowego, aby z nim ciało obce się wydzieliło.

Utopienie. Wydalić piasek lub błoto z nosa i ust palcem, nachylić nieco na bok, aby woda znajdująca się w ustach i w tchawicy mogła się wylać, zdjąć odzież i zastosować oddech sztuczny, nacierając i ogrzewając ciało; ciepłe okłady na brzuch, na nogi i pod pachami: excitantia.

Utrata krwi. Przedewszystkiem należy zatamować krwotok czy to przez podwiązanie naczynia krwawiącego, czy to za pomocą ucisku, użycia gąbki, waty namoczonej w półtora-chlorku żelaza, lodu itd. Przy krwotokach po przystawieniu pijawek — kamień piekielny, półtora-chlorek żelaza na wacie; jeżeli połknięto pijawkę, to roztwór łyżki stołowej soli w wodzie do wewnątrz. W krwotoku po wyjęciu zęba — zatkać zębodół watą namoczoną w półtora-chlorku żelaza. Jednocześnie jeżeli jest omdlenie, to środki trzeźwiące.

Zamarznięcie. Najważniejszą rzeczą jest, aby ogrzewanie nie było raptownem, a odbywało się stopniowo, przy czem należy być bardzo ostrożnym, aby nie złamać zeszytwniałych członków. Najlepiej zdjawszy suknie pozornie zmarłemu, ułożyć na śniegu w jakiej stodołę lub innem nieogrzanem miejscu i całe ciało obłożyć warstwą śniegu, na parę piędzi grubo, zostawiając tylko usta i nos wolny. Tak pozornie zmarły zostaje dopóty, aż zupełnie odstaje i gibkość członków wróci. Jeżeli śniegu niema, włożyć do wanny z lodem. Gdy zamarznięty odstaje, należy go obetrzeć suchem, nieogrzaniem prześcieradłem, nłożyć do łóżka, nakryć chłodną kołdrą, zacząć nacierania i zastosowywanie sztucznego oddechu. Po ukazaniu się pierwszych

znaków życia przenieść pacyenta do umiarkowanego ciepłego pokoju, rozcierać ciało, okryć ciepłej, dać choremu nieco herbaty z winem, lewatywę z ciepłą wodą z solą i trochę rosółu. Jeżeli który z odtajających członków boli, to natrzeć go śniegiem lub wodą z lodem.

Insolatio. Zimne okłady na głowę, gorczyczniki na łydki, zimne lewatywy; jeżeli środków tych użyć nie można, naprzykład w marszu — wenesekya.

Asphyxia neonatorum. Oczyścić usta ze śluzu, rozetrzeć skórę flanelą, skrapiać zimną wodą piersi, twarz i brzuch, drażnić piórkiem nos, gardziel i krtań, dla wywołania odruchów. gorąca wanna, wdmuchiwanie powietrza.

Warunki przyjmowania chorych obłąkanych do zakładów publicznych lub prywatnych.

Według §. 273 ust. cyw. za obłąkanego lub głupkowatego ten tylko uznany być może, który za takiego sądownie, po dokładnem zbadaniu zachowania się jego przez wyznaczonych do tego przez sąd lekarzy, uznanym zostanie. W przypadku takim postanowienie sądu do publicznej wiadomości podane być powinno. Sąd w tym razie ustanawia kuratora (§. 269).

Zakłady dla obłąkanych są prywatne albo publiczne. Do prywatnych, zakładanych jedynie za pozwoleniem politycznej władzy krajowej, przyjmowani być mogą chorzy, tylko na podstawie świadectwa lekarskiego, potwierdzającego istniejącą chorobę umysłową. Świadectwo to musi być wystawione przez lekarza powiatowego lub gminnego miejsca pobytu chorego, lub gdyby przez innego lekarza było wystawione, musi być potwierdzone przez lekarza powiatowego lub gminnego i wygotowane najpóźniej w 14 dniu przed wniesieniem próśby o przyjęcie. Jeżeli chory był poprzednio w kuracyi lekarskiej, dodaną być musi historia choroby, skreślona przez lekarza ordynującego. Chorzy, których władza bezpieczeństwa z powodu zagrażającego ogółowi bezpieczeństwa do zakładu prywatnego oddać jest zniewolona, mają być przyjęci na podstawie świadectwa wystawionego przez lekarza, którym ta władza rozporządza. Lekarz kierujący zakładem ma o przyjęciu chorego w przeciągu 24 godzin donieść trybunałowi pierwszej instancyi, w którego okręgu zakład się znajduje, z prośbą o potwierdzenie odbioru doniesienia. Doniesienie to wtedy tylko ma być zaniechane, jeżeli nie ma wątpliwości, że chory jeszcze pozostaje pod władzą ojcowską. Jeżeli taki chory podczas pobytu swego w zakładzie dojdzie do 24 roku życia, należy o tem, wyszczególniając stosunki jego osobiste, donieść trybunałowi pierwszej instancyi. Tosamo ma nastąpić, jeżeli zajdą okoliczności, które pociągają za sobą zmianę osoby prawnego zastępcy, a sąd opiekuńczy lub kuratelarny zkadinał o tych okolicznościach nie wie. Osoby umieszczone w prywatnych zakładach dla obłąkanych, które uważać należy za wyleczone, mają być z zakładu wypuszczone, po porozumieniu z temi osobami, które prosiły

o przyjęcie chorego do zakładu, albo w miejsce tychże pieczę nad chorym przyjęły. Także chorzy nieuleczalni nie mogą być w zakładzie dłużej zatrzymywani, jeżeli ich wypuszczenia żądają krewni, lub ich prawni zastępcy. Chorzy niewyleczalni mogą być oddani tylko swym prawnym zastępcom, lub osobom przez tychże wskazanym. Jeżeli z zakładu będą wypuszczone osoby, które władza bezpieczeństwa oddała z powodu grożącego ogółowi niebezpieczeństwa, poprzednio o wypuszczeniu tę władzę należy zawiadomić. Taksamo należy postąpić w razie uwolnienia osób takich na próbę. O wypuszczeniu chorych wyleczonych zostających pod kuratelą należy odnośny sąd zawiadomić.

Zakłady publiczne dla obłąkanych rządzą się własnymi statutami, które muszą być potwierdzone przez ministra spraw wewnętrznych, Zakłady publiczne dla obłąkanych mają czynić doniesienia wyżej wymienione do tychże władz sądowych. Gminy a w szczególności ich organa lekarskie są obowiązane utrzymywać w naoczności tych obłąkanych, którzy nie są umieszczeni w domach obłąkanych i czuwać nad pielegnowaniem tychże. Chorych na umyśle, którzy nie pozostają pod władzą ojcowską lub opiekuńczą, mają gminy w celu dalszego zarządzenia wskazać temu trybunałowi, do którego okręgu są wcielone. Władze sądowe są obowiązane o ustanowieniu opiekuna i kuratorów dla umysłowo chorych, znajdujących się w zakładach dla obłąkanych zawiadomić te zakłady. (Dz. p. p. z r. 1874. L. 71).

Przyjmowanie do Kulparkowa i wydalenie. (Tożsamo stosuje się i do Szpitala św. Łazarza w Krakowie). Chorych przyjmuje do zakładu dyrektor na żądanie stron lub władzy bezpieczeństwa. Aby chory mógł być przyjęty, należy dyrektorowi przedłożyć: Świadectwo władzy miejscowej z wymienieniem stosunków rodzinnych i majątkowych chorego, a także historią choroby, sporządzoną przez lekarza i poświadczoną przez fizyka powiatowego. Jeżeli oddaje władza bezpieczeństwa, to powinna wymienić fakty. Jeżeli chory ma leczyć się własnym kosztem, to należy jeszcze dołączyć pisemne zobowiązanie się tej osoby, która ma spłatę uiszczać. Chorzy winni być oddani do zakładu należycie odziani.

Dyrektor zakładu do 24 godzin powinien donieść o przyjęciu chorego trybunałowi pierwszej instancji.

O zamierzonym wydaleniu chorych wyleczonych, lub nieuleczalnych nie zagrażających publicznemu bezpieczeństwu lub obyczajności i o terminie wydalenia, powinien dyrektor zakładu zawiadomić rodzinę lub prawnego zastępcę, urząd gminy, do której chory jest przynależny, władzę opiekuńczą, jeżeli pod tą władzą zostaje i władzę bezpieczeństwa, jeżeli ona oddała chorego do zakładu ze względów policyjnych.

Przy odbieraniu chorego niewyleczonego, odbierający powinien złożyć dyrektorowi: przyzwolenie władzy opiekuńczej, przyzwolenie gminy, w której chory ma mieszkać i pisemne zobowiązanie się do dalszego pielegnowania chorego. (Dz. u. k. 1876. 15 Lutego. Nr 6).

ROZBIÓR CHEMICZNY MOCZU.

A. Badanie fizycznych własności.

Własność	Zmiany jakim ulega	Przyczyna
Barwa	winowo-żółta; zmienia się na: $\left\{ \begin{array}{l} \text{jasno-słomkową} \\ \text{cisawo-win.-żółtą} \\ \text{krwawo-czerwoną} \\ \text{pomarańcz.-żółtą} \\ \text{cisawo-czerwonawą} \\ \text{brunatną} \end{array} \right.$	nadmierna ilość wody Urobilina barwik krwi barwiki żółci kwas chryzofanowy kwas karbolowy
Oddziaływanie	kwaśne; może być alkaliczne (obojętne): przy odparowaniu staje się: $\left\{ \begin{array}{l} \text{kwaśne} \\ \text{silniej} \\ \text{alkaliczne} \end{array} \right.$	węgiel amonowy węgiel sodowy
Ciężar gą- tunkowy	od 1,015—1,023; zwiększa się skutkiem	większ. ilości: mocznika cukru
Osad	skąpy obłoczki złozone z: $\left\{ \begin{array}{l} \text{przybłonek} \\ \text{śluzu w małej} \\ \text{ilości} \end{array} \right.$	(patrz C.)

B. Badanie chemicznych własności.

Składniki	S p o s ó b b a d a n i a	Oddziaływanie
Urochrom.	Do $\frac{1}{4}$ kieliszka kwasu siarkowego zgęszczonego nalewa się moczu odrazu	zabarwienie: różowo-brunatne brunatno-czarne
Indoxyl Uroxanty- na, Indykan	Do $\frac{1}{2}$ kieliszka kwasu chlorowodowego zgęszczonego nalewa się moczu kroplami	zabarwienie: żółtawo-różowe niebiesko-fioletowe ciemno-niebieskie
Mocznik	Oznaczenie ilościowe: w moczu zgęszcz. po dolaniu kw. azotow. zgęszczon.	osad krystaliczny: azotanu mocznika
Kwas mo- czowy	Oznaczenie ilościowe: w moczu zawierającym więcej kw. moczowego, kw. azotowy zgęszczony	daje smugę: białą, rozlaną i wysoko umieszczoną
Chlorki	Zakwasza się kw. azotowym i dodaje kroplę Azotanu srebrowego (1:8)	osad: biały serowaty kaskowaty obłoczkiowaty
Fosforany ziem.	Do $\frac{1}{2}$ kieliszka moczu dodaje się kilka kropli Amoniak u zgęszczonego	osad: krystaliczny + obfity
Fosforany potasowców	Do $\frac{1}{2}$ kieliszka moczu dodaje się: Siarkanu magnowo-amonowego póki tworzy się	osad: żółtawy + obfity
Siarkany	Do $\frac{1}{2}$ kieliszka moczu dodaje się: Chlorku baru z kw. chlorowodowym póki tworzy się	osad: biały ciężki + obfity

S p o s ó b b a d a n i a		Oddziaływanie
Białko	1) Do $\frac{2}{3}$ kieliszka moczu nalewa się po ścianie kwasu azotowego zgęszczonego 2) Po zagotowaniu i dodaniu kw. octow. rozcieńcz.	1) smuga biała + gruba na granicy warstw. 2) osad w kw. octowym nierozpuszczalny
Cukier	1) Po zagotowaniu z równą objętością zgęszcz. ługu potasow. 2) " z ługiem potas. i siarkan. miedzi	1) zabarwienie: żółto-brunatne brunatne 2) osad czerwony
Barwiki żółte	Do $\frac{1}{2}$ kieliszka kwasu chlorowod. zgęszcz. nalewa się moczu a następnie kw. azotowego kilka kropli na dno	pieńszenie barwne zwiększa zielony.
Urobilina	Po dodaniu Amoniaku i Chlorku cynku (uwzględnia się zabarw. moczu a niekiedy ubarwienie moczanów)	zabarwienie: żółte z zieloną fluorescencją
Barwik krwi Haemooxy-Methae- mo globino	Po zagotowaniu z ługiem potasowym (oddziaływ. dla białka, badan. mikroskop. próba spektral)	osad fosforanów czerwono zabarwiony
Fosforan. wapn. zasad.	Po zagotowaniu	osad w kw. węglowym rozpuszczalny, po potwórn. zagotowaniu się wydzielający
Węglan ammonu	Przy zagotowaniu uchodzi Amoniak i	barwi zwilżony papier lakm. czerwony na niebiesko

Składniki	S p o s ó b b a d a n i a	Oddziaływanie
Kw. chryzofanowy Senna, Rheum)	Po dodaniu Amoniaku	zabarwienie: ognisto-czerwone
Kwas karbolowy	Obok braku lub zmniejszonej ilości siarkanów Obok barwy moczu ciemno-brunatnej	badanie przekroju za- pomocą: chlorku żelaz- zow. odczynnika Mil- lona
Naftalina	Do paru kropli moczu dodaje się kilka kropli kwasu siarkowego zgęszczonego	zabarwienie: zielone
Balsam kopaivowy	1) Po zagotowaniu z kwasem chlorowodowym 2) Po dodaniu kw. azotowego (jak przy białku)	1) zabarw. czerwone 2) smuga różowa nie- co wyżej umieszczona
Jodek potasu	1) Po dodaniu kwasu azotowego 2) Z kleikiem skrobi i kwasem azotowym	1) zabarwienie bruna- tne i woń jodu 2) zabarw. niebieskie

C. Badanie osadu drobnowidowe i chemiczne.

Składniki	K s z t a ł t	Własności chemiczne
Ciałka ropy	o charakterystycznych konturach	z ług. potas. lub Amoniakiem zmieniają się w masę galaretową
Ciałka krwi	o charakterystycznych konturach	z kw. octow. lodowatym i chlor. sodu dają: Haemine (kryształki Teichmanna)
Ciałka śluzu	małe ziarniste komórki o wyraźnych konturach	
Przybłönki	okrągłe i owalne drobne (kanaliki nerek) kształtu gruszkowatego (miednicz. nerk.) komórki przybł.: okrągłe wieloboczne, podłużne (pęcherz i moczowody) kuliste, ziarniste (cewka mocz. i dno pęch)	
Walczki	z kanalików nerek kształtu walcowatego ziarniste przeźroczyste krwawe przybłönkowe woskowe	

Składniki	K s z t a ł t	Własności chemiczne
Kwas moczowy	kryształy postrastane lub oddzielne + żółtawo zabarwione kształtu oselek, rombów lub maczugowate	w ługu potasowym lub Amoniaku rozpuszczalne
Moczan sodow.-potas.	masa ziarnista bezpostaciowa	
Moczan amonowy	kryształy kuliste opatrzone czasem kolcami	w kw. octowym nie-rozpuszczalne
Szczawian wapniowy	kryształki drobne kształtu kopert listowych	
Fosforan magn.-amonowy	kryształy duże kształtu trumienkowatego	w kwasie octowym rozpuszczalne: w ługu potas. lub amoniaku nie zmieniają się
Fosforan wapniowy zasadowy	masa drobno-ziarnista	
Kulki tłuszczu	ciałka okrągłe silnie światło łamiące	w eterze rozpuszczalne
Mikroorganizmy	laseczniki, kokki, drożdże, sarcina	
Plemniki	nitki dość proste na jednym końcu zagięte, na drugim opatrzone główką	Dr. Opieński.

Kilka uwag o świadectwach lekarskich.

Nie ma zapewne dokumentu, któregooby tak nadużywano, jak świadectw lekarskich. Nadużyciom ze strony publiczności stara się zapobiedz okólnik c. k. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 14 Marca 1877 r. L. 8431, w myśl którego mają lekarze na każdym świadectwie podawać wyraźnie cel, w jakim takowe wydają. Przykro wyznać, że i ze strony lekarzy musiały się zdarzyć nadużycia z wydawaniem świadectw, skoro c. k. Namiestnictwo we Lwowie (w okólniku z dnia 31 Sierpnia 1889, L. 57489) uznało za stosowne wezwać wszystkich lekarzy i chirurgów „aby przy wydawaniu świadectw w ogóle, a dla celów wojskowości w szczególności postępowali nader ostrożnie i aby w tych świadectwach jedynie to poświadczali, „co jest zgodne z prawdą.“ Jak wynika z omowy tego okólnika dał jeden zwłaszcza przypadek powód do wydania rozporządzenia tej treści, która musi tak przykro dotyczyć wszystkich lekarzy, zwracając im uwagę na sumienne pełnienie obowiązków. Lepiej nieraz uchylić się od wydania świadectwa, pamiętając, że „*scripta manent*“ aniżeli czynić zadość żądaniom publiczności, zwłaszcza, że jej wymagania są niejednokrotnie tego rodzaju, iż im lekarz nie może zadość uczynić bez widocznego wykroczenia poza obręb ścisłej nauki lekarskiej.

Świadectwa lekarskie wydawane osobom prywatnym (t. j. nie na żądanie władz) należy zaopatrywać w markę stemplową (50 centów). Wyjątki pod tym względem stanowią świadectwa szczepienia (względnie przebytej ospy) i świadectwa wydawane uczniom dla udowodnienia przeszki w uczęszczaniu do szkoły lub kościoła, tudzież w złożeniu egzaminów w należyтым czasie (rozp. gubern. z dnia 29 Czerwca 1834 L. gub. 39736 i obwieszczenie gubern. z dnia 4 Grudnia 1844 L. gub. 75852).

Świadectwa stwierdzające istnienie choroby umysłowej i potrzebę umieszczenia w jednym z krajowych zakładów dla umysłowo chorych, mogą wydawać jedynie c. k. lekarze powiatowi i fizycy miasta Lwowa i Krakowa (§ 14 statutu co do przyjmowania chorych do zakładów dla umysłowo chorych).

Co do świadectw sądowo-lekarskich (t. z. *visa et reperta*) istnieją wprawdzie przepisy objęte urzędowaniem gubernialnem z dnia 27 marca 1827 L. gub. 14611; te jednak uchyla po największej części ustawa o postępowaniu karnem obecnie obowiązująca. — Ustawodawstwo austriackie późniejsze nie zawiera szczegółowych przepisów co do formy tych świadectw, lecz mając na oku ich cel, uwzględniając zwyczaj pod tym względem istniejący a zwłaszcza czyniąc zadość wymaganiom tak ustawy karnej jakoteż ustawy o postępowaniu w sprawach karnych, spisuje się je powszechnie podobnie, jak protokoły oględzin sądowo-lekarskich. — Według tego składa się świadectwo sądowo-lekarskie z trzech części. Pierwsza obejmuje imię i nazwisko, wiek, stan i miejsce zamieszkania osoby badanej; wzmianka

o miejscu, gdzie się badanie odbywa, jest również nieraz pożądaną. W części tej zestawia się w miarę potrzeby w streszczeniu lub wyczerpująco podania samej osoby badać się mającej, względnie osób otaczających (które wymienić należy), co miewa miejsce przy badaniach osób nieletnich, nieprzytomnych lub dotkniętych chorobą umysłową. W ostatnim razie ta część świadectwa może mieć największe znaczenie zwłaszcza, że niejednokrotnie pisze się świadectwo na podstawie jednorazowej obserwacji tak, że dopiero podania osób otaczających dają podstawę do orzeczenia. W tej części wyszczególnić należy objawy podmiotowe.

Drugą część świadectwa, którą rozpoczyna się zazwyczaj wyrazami: „Badanie dokonane w dniu dzisiejszym wykazuje:“ dzieli się w miarę potrzeby na ustępy, oznaczone liczbami porządkowymi lub literami tak, aby się na nie w orzeczeniu powołać można.

W tej części świadectwa mieści się o ile możliwości wyczerpujący a zwięzły wynik badania przedmiotowego, w którym w przypadkach uszkodzeń ciała nie należy się ograniczać do dokładnego opisu śladów obrażeń z osobna, lecz odpowiedniem jest uczynić uwagę co do budowy ciała, stanu odżywienia, wrodzonych lub nabytych nieprawidłowości tudzież przemijających stanów fizjologicznych, zwłaszcza ciąży i jej okresu. Odpowiedniem jest również zaznaczyć w tem miejscu i wynik badania ujemnego pewnych narzędzi, zwłaszcza, gdy podania osoby badanej wskazują na istnienie objawów podmiotowych: w końcu należy uczynić uwagę co do stanu ogólnego osoby badanej. Jeżeli świadectwo jest wynikiem kilkakrotnej obserwacji, jest odpowiedniem zestawić wynik poszczególnych badań z osobna, aby czytającemu dać o ile możliwości dokładny obraz przebiegu, unikając przytem wyrażen, które stanowią rozpoznanie.

Trzecia część świadectwa stanowi orzeczenie, którego treść zależy od celu, w jakim się świadectwo wydaje. Tutaj mieści się przedewszystkiem rozpoznanie a nadto w przypadkach uszkodzeń ciała ocenienie sądowolekarskie, jak tego wymaga § 129 p. k. „.... lekarze orzec mają w szczególności, które ze znalezionych obrażeń ciała lub nadwyřeżeń zdrowia same przez się lub w połączeniu z innemi, bezwzględnie lub ze względu na szczególne okoliczności przypadku, uważać należy za lekkie, ciężkie lub dla życia niebezpieczne; jakie skutki uszkodzenia takie zwykle za sobą pociągają, i jakie w danym przypadku ztąd nastąpiły, tudzież, jakimi środkami albo narzędziami i w jaki sposób zadane były. Zbyteczna nadmienić, że do odpowiedniego ocenienia uszkodzeń ciała trzeba gruntownej znajomości §§ ustawy karnej, odnoszących się do obrażeń ciała, orzeczenia te bowiem nie są tylko lekarskimi lecz sądowolekarskimi: mają uwzględniać pojęcia prawnicze dla nauki lekarskiej obce i tylko w takim razie mogą zadowolić sędziego.

Dr. Schaitter.

Świadeństwo sądowo-lekarskie. +) ++)

Stempel
50 ct.

Kazimierz Mazur, lat 38 liczący, rolnik z Łobzowa, żonaty, podaje, że dnia 14-go Września r. b. doznał w Łobzowie pobicia przez Piotra Mosala i Jana Prusaka obu z Czarnej Wsi, z których pierwszy ugodził go grubym kijem w głowę, drugi obuchem kopaczki w przedramię lewe, poczem obaj obaliliwszy go na ziemię, kopali nogami obutymi po bokach klatki piersiowej tak, że wskutek odniesionych obrażeń jest niezdolnym do pracy.

Badanie dokonane w dniu dzisiejszym wykazuje:

1. U mężczyzny dobrze zbudowanego i miernie odżywionego (z wyraźną liniową bladą blizną na licu prawem), na czole po stronie lewej od guza czołowego ku granicy porostu włosów w pionie guza czołowego ranę długości 3 cm. rozwartą na 6 mm., prostopadle przebiegającą. Brzegi rany równe, dno strzępiaste, badanie zgłębnikiem okazuje, że rana przenika skórę, lecz nie obnaża kości, okolica rany miernie obrzmiała. (Ranę wyczyszczono i opatrzono).

2. Powieka górna oka lewego okazuje mierny obrzęk i zasinienie, dolna nieznacznie zasiniała.

3. Na klatce piersiowej po stronie prawej w linii pachowej przedniej widać na wysokości 6-go i 9-go żebra po jednym sińcu rozmiarów talara; badanie nie wykazuje w tych miejscach nieprawidłowej ruchomości żeber ani chrupotania, wypuk i przysłuch prawidłowy.

4. Mniejszy sińiec widać na klatce piersiowej po stronie lewej w wysokości 8-go żebra i tutaj nie wykazuje badanie nieprawidłowej ruchomości żebra, ani zboczeń w wypuku lub przysłuchu.

5. W dolnej trzeciej części przedramienia lewego, które badany prawą ręką podtrzymuje, widać po stronie zewnętrznej zasinienie rozmiarów 4 centów, okolica tegoż miernie obrzmiała. Badanie wykazuje w tem miejscu nieprawidłową ruchomość w przebiegu kości łokciowej i wyraźne chrupotanie odłamków, przychem badany doznaje znacznego bólu. Tak przy ruchach biernych jak zwłaszcza czynnych, uskarża się na ból.

6. Zresztą badanie nie wykazuje innych śladów obrażeń, ciepłota ciała prawidłowa (37.3° C.) tętno 78.

*) Powyższy napis czyni już zbytecznem wymienianie celu świadectwa, jak tego żąda okólnik c. k. Namiestnictwa.

**) W przypadkach zbrodni (ciężkich uszkodzeń, zgwałceń i t. p.) jest lekarz obowiązany uczynić doniesienie w myśl § 359 u. k. Doniesienia takie (bez stempla) pisane przez lekarzy mogą być poparte świadectwem lekarskiem w takim razie również bez stempla. (Orzeczenie c. k. krajowej Dyrekcji Skarbu z dnia 9-go Lipca 1887, L. 40492).

O R Z E C Z E N I E.

Rana opisana pod 1) taksamo jak i zmiana pod 2) mogą pochodzić od uderzenia kijem w głowę, sińce na klatce piersiowej od kopnięć, obrażenie zaś przedramienia lewego a mianowicie złamanie kości łokciowej lewej od silnego uderzenia obuchem kopaczki tak, jak to badany twierdzi. Obrażenia pod 1 i 2 jakoteż pod 3 i 4 opisane stanowią tak z osobna, jakoteż razem lekkie uszkodzenia ciała i sprowadzają upośledzenie zdrowia przez dni 6 do 8 niezdolność do pracy zawodowej o kilka dni krócej trwające. Obrażenie pod 5 opisane t. j. złamanie kości łokciowej lewej, stanowi samo przez się obrażenie ciała ciężkie, sprowadza bowiem upośledzenie zdrowia i niezdolność do pracy zawodowej przez więcej niż 20 dni. Czy niezdolność do pracy zawodowej i upośledzenie zdrowia wskutek odniesionego złamania kości nie potrwałają w tym przypadku przez więcej niż 30 dni, ocenić będzie można dopiero po zdjęciu opatrunku ustalającego, który badanemu właśnie założono, t. j. po upływie trzech tygodni.

Co niniejszem, jako zgodne z zasadami nauki lekarskiej....
Kraków, dnia 16 Września 189... Dr N. N.

O sądowych oględzinach i sekcyach zwłok

mieszczą się wszystkie przepisy w rozporządzeniu Ministerstwa spraw wewnętrznych i sprawiedliwości z dnia 28 Stycznia 1885. Dz. u. p. Nr. 26; większe lub mniejsze wyjątki z tego rozporządzenia znajdują się w zwykłe używanych podręcznikach o postępowaniu w sprawach karnych. Ponieważ rozporządzenie to jest tak obszernem, że go tutaj w całej rozciągłości podawać nie możemy, przeto odsyłamy ciekawych do Zbioru ustaw i rozporządzeń zdrowotnych dra Olpińskiego (Tom I str. 284 do 351) tutaj zaś nadmieniamy tylko, że rozporządzenie to wyczerpuje wszystko, co tylko lekarzy obchodzić może tak co do formy, jakoteż co do poszczególnych czynności i porządku sekcyj. Poznanie treści tego rozporządzenia jest bardzo pożytecznem, zwłaszcza, że często zdarzają się przy sekcyach niedokładności, które udaremniają wyniki dochodzeń.*)

Szemat protokołu sekcyjnego osoby dorosłej przedstawia się mniej więcej jak następuje: (opisanie odzieży następuje przed oględzinami zwłok § 31 rozp. ministeryalne).

*) Pomimo wyraźnego przepisu ustawy co do sposobu zaopatrywania wnętrzności, które się przesyła do rozbioru chemicznego, otrzymują chemicy takowe prawie zawsze w słojach zawiązanych pęcherzami. Rzecz naturalna, że gdy pęcherz zgnije, a dzieje się to nader rychło, wylewa się wszystko ze słoja do opakowania n. p. trocin, siana, tak, że badanie jest przez to utrudnionem a wynik jego może być nawet wątpliwym.

A. *Ogledziny zewnętrzne.* 1. Zwłoki mężczyzny lat zbudowanego odżywionego 2. Długość zwłok zabarwienie skóry Steżenie trupie; plamy trupie znajdują się na barwy przez nacięcie stwierdzone. 4. Włosy na głowie na brodzie. 5. Twarz zwłok oczy gałki oczne źrenice tęczęwki; otwory i małżowiny uszne z ust i nosa wydobywa się; jama ust zawiera zęby język 6. Szyja; klatka piersiowa; brzuch; odnogi palce grzbiet części płciowe (tu należy opisać dokładnie ślady obrażeń znalezione na poszczególnych częściach, z których każdy można oznaczyć literami alfabetu).

7. Zresztą po dokładnem obejrzeniu zwłok nie zauważono innych śladów.


B. *Ogledziny wewnętrzne.* (Sekcyja wykonywa się w porządku anatomicznym, jedynie regulamin pruski (z d. $13\frac{1}{2}$ 1875) zaleca w przypadkach podejrzenia o otrucie badać najprzód trzewia brzuszne). 8. Powłoki czaszkowe miękkie ... 9. Sklepienie czaszki grubość kości 10. Opona twarda zatoka podłużna ... 11. Opony miękkie zwoje mózgowe 12. Zbitość mózgu istota korowa biała na rozkroju komórki mózgowe zwoje wielkie sploty żyłne móżdżek rdzeń przedłużony komórka 4-ta naczynia na podstawie mózgu 13. Opona na podstawie zatoki podstawowe ... podstawa czaszki po odjęciu opony twardej 14. Jamy bębenkowe ... 15. Krtani i tchawica (otwarte in situ) mięśnie szyi język nagłośnia przełyk gardziel 16. Powłoki klatki piersiowej brzucha mięśni 17. Przepona sięga po stronie prawej lewej (W przypadkach sekcyj noworodków). 18. Śródpiersie przodowe ułożenie trzew ... 19. Osierdzie ... serce komórki ... przedsionki zastawki żyłne naczynia wieńcowe mięsień sercowy 20. Krew barwy 21. Tętnice główne naczynia na szyji 22. Płuca opłucne pod opłucniami miąższ płuc na rozkroju płuca lewe ... oskrzela płuca prawe jamy opłucnowe zawierają opłucna ścienna 23. Dolna część gardziela ... tętnica główna część (zstępująca i piersiowa) 24. Tkanka śródpiersia tylnego 25. Jama brzuszna zawiera otrzewna trzewiowa ścienna krezka gruczoły krezkowe 26. Żóładek (w przypadkach podejrzenia o otrucie należy podwiązać u wpustu i odźwiernika) powierzchnia zewnętrzna żóładka po otwarciu treść w ilości barwy ... zawiera wydaje woń błona śluzowa 27. Wątroba rozmiarów torebka na rozkroju miąższ 28. Pęcherzyk żółciowy żółć 29. Śledziona rozmiarów torebka miąższ 30. Trzustka ... 31. Dwunastnicazawiera błona śluzowa 32. Jelita cienkie powierzchnia otrzewnowa treść błona śluzowa 33. Jelito grube 34. Tkanka zaotrzewnowa 35. Nerki rozmiarów torebki istota korowa piramidy miedniczki moczowody 36. Pęcherz moczowy zawiera mocz barwy (w przypadkach otruń bywa wskazanem odprowadzić mocz czystym cewnikiem do osobnego naczynia); błona śluzowa 37. Gruczoł krokowy pęcherzyki

nasienne ... 38. Odbytnica ... 39. Po wyjęciu wszystkich trzew okazują żebra ... uszkodzone ... kręgosłup ... kości miednicy ... 40. Kości odnóg ... 41. Nacięcia tkanek na nogach wykazują ... 42. (Tylko w razie potrzeby). Po otwarciu przewodu rdzeniowego okazuje opona twarda rdzenia w wysokości kręgu ... opony miękkie ... rdzeń ...

W przypadkach sekeyj zwłok noworodków należy nadto uwzględniać, cechy donoszenia: długość zwłok (wyrażona w centymetrach, podzielona przez 5, wskazuje miesiąc życia płodowego w drugiej połowie ciąży. Płody donoszone męskie 49—53 cm., żeńskie 47—51 cm.) wymiary główki, barków, stan i rozmiary ciemion, chrząstki nosa i uszu, stan paznogi, włosy na głowce, stan jąder (u płodów męskich donoszonych oba jądra w mosznach); rozmiary jąder kostnych w dolnych nasadach kości udowych, lub rozmiary ich w kościach skokowych, wreszcie stan pępownicy. W tych przypadkach nadto wykonywa się t. z. próby życiowe (płucową, żołądkową, jelitową, uszną itd.).

Orzeczenie wydaje się najczęściej bezpośrednio po sekcji, wolno jednak, a nieraz nawet okazuje się koniecznem, wstrzymać się z orzeczeniem aż do przesłuchania świadków. Co do orzeczeń sądowo-lekarskich w przypadkach śmierci obowiązuje § 129 u. k.: „Zdanie wypowiadać powinno, co było w danym przypadku najbliższą przyczyną śmierci i co tę przyczynę wywołało. Jeżeli spostrzega się obrażenia, orzec należy w szczególności: 1. czy takowe zadane były zmarłemu czynem osoby drugiej, a w razie potwierdzenia tego pytania, 2. czy czyn ten spowodził śmierć a) już ze swej natury w ogólności; b) lub z powodu właściwego ustroju osobistego, albo z powodu szczególnego stanu obrażonego; c) z powodu okoliczności przypadkowych, wśród których został spełniony; albo d) z powodu przyczyn pośrednich, które przypadkiem nastąpiły, lecz czynem samym były wywołane lub z niego wynikły i czy wreszcie e) śmierci mogła była zapobiedz wczesna i odpowiednia pomoc lekarska.“

W przypadkach dochodzeń z powodu podejrzenia o dzieciobójstwo mają lekarze orzec nadto, czy dziecko urodziło się żywe (Ustawa o postępowaniu karn.). Pytanie co do zdolności do życia noworodka, które mieściło się w dawnej ustawie o p. k. wykreślono słusznie w ustawie obecnie obowiązującej, pomimo tego pojawia się ono dosyć często w ustach sędziów śledczych, lekarze jednak mogą się uchylić od dania odpowiedzi w tym kierunku.





NACZELNE WŁADZE SANITARNE.

Przy ministerstwie spraw wewn.
Dr Kusy Emanuel, c. k. Radca ministeryalny.

NAJWYŻSZA RADA ZDROWIA

(K. k. oberster Sanitätsrath).
na 3-lecie 1891—1894.

Przewodniczący:
Hofmann Edw., Rad. dw. Prof. Dr.

Zastępca przewodniczącego:
Vogl. August, r. d. Prof.

Członkowie zwyczajni:

Prof. Dr Albert Edw. r. d.	Dr Kusy Eman. rad. min. j. w.
Prof. Dr Böhm Karol r. d.	Prof. Dr Ludwig Ernest r. d.
Prof. Dr Braun Gustaw r. d.	Prof. Dr Polansky Stan.
Prof. Dr Drasche Antoni r. d.	Prof. Dr Weichselbaum Antoni.
Prof. Dr Gruber Maksymilian.	Prof. Dr Widerhofer Herman
Prof. Dr Kratschmer Floryan,	r. d.
1. szt.	Dr Widersperg Gustaw.

Członkowie nadzwyczajni:

Prof. Dr Gruber Franciszek.	Dr pr. Migerka Franc. r. m.
Dr Hellmann Alojzy (Aptekarz).	Plappart August r. m.
Prof. Dr Inama-Sternegg Karol,	Dr Schlosser Teodor (Aptekarz).
sz. s.	Waldhaim Antoni (Aptekarz).

WŁADZE SANITARNE w GALICYI.

Departament sanitarny c. k. Namiestnictwa galic. we Lwowie.

Dr Merunowicz Józef, c. k. radca Namiestnictwa,
referent sanitarny krajowy.
Dr Lachowicz Zdzisław, c. k. lekarz powiatowy,
p. o. inspektora sanit.
Dr Rosenbusch Leon, c. k. Koncepista sanitarny.

Dr Krokiewicz Antoni, c. k. lek, pow. (przydzielony).
 Dr Opieński Jan, c. k. asystent sanitarny.
 C. k. Weterynarz krajowy: *vacat*.
 Dr Bazyli Krwawicz, c. k. inspektor weterynaryjny.
 Langhaus Józef, c. k. Koncepista weteryn.
 Smoluchowski Jan, c. k. weterynarz pow. (przydzielony).

C. K. KRAJOWA RADA ZDROWIA.

Skład i zakres takowej, jako ciała obradującego i doradczego, oznaczony jest ustawą z dnia 30 Kwietnia 1870 r. dz. ust. p. Nr. 68 o organizacyi publicznej służby zdrowia.

Przewodniczący:

Czyżewicz Adam, Dr med. i mag. poł., c. k. prof. poł.
 i prym. szp. p. we Lwowie.

Zastępca przewodniczącego:

Opolski Wiktor, Dr med., prym. szp. p. we Lwowie.

Członkowie:

a) ze strony Rządu:

Cassina Ferdynand, Dr med., lek. pow. w Przemyślu.
 Czyżewicz Adam j. w.
 Merunowicz Józef j. w.
 Widman Oskar, Dr med. i chir., prym. szp. p.
 Opolski Wiktor j. w.

b) ze strony Wydziału krajowego:

Merczyński Emil, Dr med.
 Ziembicki Grzegorz, Dr med., oper. szp. p.

c) Delegaci Izb lekarskich:

Prof. Dr Jakubowski Maciej z Krakowa,
 Dr Eckhardt Józef z Tarnopola (Iz. lw.).

Zastępcy:

Dr Plech Aureli z Jarosławia.
 Dr Wysocki Aleksander ze Złoczowa.





IZBY LEKARSKIE

z wyborów w dniu 30 Czerwca 1893 roku.

IZBA LEKARSKA w KRAKOWIE

ukonstytuowana w dniu 25 Lipca 1893 r.

Prezes:

Prof. Dr Maciej Leon Jakubowski z Krakowa.

Wiceprezes:

Dr Aureli Plech z Jarosławia.

Członkowie Wydziału:

Prof. Dr Henryk Jordan.

Prof. Dr Józef Łazarski.

Dr Stanisław Paszkowski.

Delegat do krajowej Rady zdrowia:

Prof. Dr M. L. Jakubowski.

Zastępca:

Dr Aureli Plech.

Członkowie Izby:

Dr Jan Gawlik ze Suchy.

Dr Stan. Jabłoński z Rzeszowa.

Dr Józef Skakalski z Podgórze.

Dr Karol Sławik z N. Sącza.

Dr Jan Wain z Krosna.

Dr Józef Walczyński z Tarnowa.

Zastępcy:

Dr Maksym. Kohn z Krakowa

Dr Aug. Kwaśnicki "

Prof. Dr Przem. Pieniążek "

Doc Dr Aleks. Zarewicz "

Dr Władysław Gedl z Wadowic.

Dr Winc. Świątek z Podgórze.

Dr Eugen. Neumann z Gorlic.

Dr Lud. Cwiklicer z Dobromila.

Dr Szymon Bernadzikowski
z Brzeska.

Dr F. Sędzielowski z Sędziszowa.

Dr Adolf Ditzius z Jarosławia.

IZBA LEKARSKA we LWOWIE

ukonstytuowana w dniu 24 Lipca 1893 r.

Prezes:

Dr Józef Różański ze Lwowa.

Wiceprezes:

Dr Leon Ziemiański z Przemyśla.

Członkowie Wydziału:

Dr Edward Gerard Festenburg ze Lwowa.

Dr Hilary Schramm ze Lwowa.

Dr Michał Pluciński z Kulparkowa.

Delegat do krajowej Rady zdrowia:

Dr Józef Eckhardt z Tarnopola.

Zastępca:

Dr Aleksander Wysocki ze Złoczowa.

Członkowie Izby:

Prof. Dr A. Czyżewicz ze Lwowa.	Dr Apolinary Lachawiec ze Sta-
Dr Karol Muszkiet z Żółkwi.	niślawowa.
Dr Alfred Biegelmajer ze Sam-	Dr Lud. Lutyński z Jagielnicy.
bora.	Dr Gabryel Śysak z Kołomyi.

Zastępcy:

Dr Grzeg. Ziembicki ze Lwowa.	Dr Feliks Kretschmer z Droho-
Dr Henryk Kadyi "	wyża.
Dr Emil Merczyński "	Dr Wiktor Lachowski z Dro-
Dr Wilhelm Pisek "	hobycza.
Dr Baz. Kiebuziński z Przemyśla.	Dr Mik. Podłuski z Bolechowa.
Dr Miron Jajus ze Sokala.	Dr Edward Körner z Monaste-
Dr Stanisław Sołtysik z Brodów.	rzysk.



SŁUŻBA ZDROWIA w GALICYI.

Kraków.

Dr Bandrowski Jul., Rynek Nr 7 (dent.).
 Beck Adolf, Poselska 18 (2—4).
 Biesiadzki Antoni, Dietla 73.
 Blatteis Jakób, Krupnicza Nr 16; w lecie w Krynicy.
 Blatteis Stefan, Szp. św. Łaz.
 Bobkiewicz Henryk, Mały Rynek 3 (3—4).
 Borzęcki Eug., Floryańska 37.
 Bossowski Aleksander, Floryańska 35 (3—4).
 Braun Stanisł., Podzamecze 14.
 Braunstein Fryderyk, Krakowska 25.
 Browicz Tadeusz, Krupnicza 5 (3—4).
 Buszek Jan, Fizyk miasta, Rynek A—B 39 (2—4).
 Buzdygan Mikołaj, Bracka 8 (3—4).
 Cecha Maks., Sławkowska 4.
 Chmielecki Jul., Floryańska 49.
 Cholewicz Franciszek, ś. Jana 4 (3—4).
 Czapliński Stan., Szpit. ś. Łaz.
 Cybulski Napoleon, Szczepańska 11.
 Domański Stanisław, Szczepańska 9 (3—4).
 Doskowski Józef, Bracka 4 (9—10).
 Drobner Jak., Stradom 25 (1—3).
 Drożdż Bolesł., ś. Jana 11 (2—4).
 Elias Stan. Karmelicka.
 Eichhorn Ferd., Dietla 47.
 Filimowski Antoni, Grodzka 42 (2—4).
 Filipkiewicz Stef., Kolej. 18.
 Fragner Daniel Dietla 42.

Dr Gabryszewski Antoni, Klinika chirurgiczna.
 Gertler Norbert, Gertrudy 15.
 Gluziński Władysław Antoni, Franciszkańska 1 (3—5).
 Gwiazdomorski Jan, Łobzowska 32 (Dom zdrowia).
 Haim Leopold, Krakowska 17.
 Halban Leon, Podwale 10.
 Harajewicz Jan, Podwale 14.
 Harajewicz Władysław, Podwale 14 (2—4).
 Hirsch Herman, Jasna 4.
 Hyżycki Stanisław, Szpital św. Łazarza (3—4).
 Jakubowski Maciej Leon, Podwale 10 (3—4).
 Jarosz Wład., Batorego 1.
 Jastrzębski Aleks. Starowiślna.
 Jaworski Walery, Kopernika 2 (3—4).
 Jeż Walenty, Sławk. 25 (2—4).
 Jordan Henryk, Wiślna 5 (3—4).
 Junger Jak., Krakowsk. 7 (2—4).
 Jurowicz Izidor, Stradom 17.
 Kaden Kazimierz, Kolejowa 1 (3—4).
 Karpiński Stan., Kopernika 12.
 Kaufmann Mich., Grodzka 32.
 Kirschner Aron, Dietla 55.
 Klecki Karol, Wielopole 2.
 Kohn Maksymil., Floryańska 19 (3—4).
 Komorowski Bolesław, Zwierzyniec 24.
 Kondratowicz Andr. Krupnicza 8.
 Kopff Leon, Szczepańs. 1 (3—4); w lecie w Krynicy.
 Korczyński Edward, ś. Krzyża 5 (3—5).
 Korczyński Ludomił, Klinika.

Dr Kosiński Leopold Szp. św. Ludwika.

Koźmiński Franciszek, Szpital ś. Łazarza (3—4).

Koy Stan., Floryańs. 3 (3—4).

Kornhäuser C. ś. Gertrudy 29.

Kotz Władysław, Długa 10.

Kozłowski Bron., Kl. chirurg.

Kozłowski Sykst., Biskupia 14.

Kramarzyński Karol, Mały Rynek 6 (3—4).

Krasowski Stan., Klin. Chir.

Krongold Wilh., Dietla 49.

Kryński Leon, Klinika chir.

Krzyształowicz Franc., Basztowa 9.

Kwaśnicki August, Basztowa 4 (3—4).

Langie Adam, Garbars. 5 (3—4).
Lustgarten Ludwik, Grodzka 60.

Lustig Samuel, Krakowska 35.

Łazarski Józef, Starowiślna 8.

Łepkowski Wincenty, Straszewskiego 27 (dentysta).

Madejski Bol., Szewska 7.

Mađurowicz Maurycy, Bracka 6 (3—4).

Majer Józef, Krupnicza 9.

Malinowski Gustaw, Starowiślna 15.

Marcisiewicz Feliks, Wiślna 10 (3—5).

Mars Ant., Szpitalna 19 (2—4).

Maczka Tomasz, Floryańska 24 (2—4).

Mayzel Tadeusz, Kolejowa 12 (3—4).

Mendelsburg H., Szewska 21.

Milewski Tad., ul. Lubomirsk. 8

Momidowski Stanisław, Sławkowska 12 (3—4).

Münz Emil, Grodzka 69.

Murdziński Franciszek, Floryańska 53 (3—4).

Nowak Zygm., Starowiślna 1.

Obaliński Alfred, Kolejowa 7 (3—4).

Oettinger Józef, Rynek główny 10 (3—5).

Olszewski Bronisław, Szpitalna 20 (3—4).

Dr Paleczny Bronisław, Szewska 12 (3—4).

Pareński Stanisław, ś. Jana 1 (3—5).

Paszkowski Stanisław, ś. Anny 7 (3—4).

Pelczar Zenon, Floryańska 29.

Piasecki Wenanty, Sławkowska 31.

Piątkowski M., Sienna 3.

Pieniażek Przemysław, Bracka 10 (3—5).

Piotrowski Edw., Dietla 91.

Pohorecki Władysław, Szpital ś. Łazarza.

Ponikło Stan., dyr. Szpitala ś. Łazarza. Bracka 5 (3—4).

Puchacki Edmund, Sławkowska 24.

Raczyński Jan, Szpital św. Ludwika (3—4).

Radecki Paweł, Grodzka 39.

Regiec Jan, Straszewskiego 21.

Rokossowski Woj., Klinika. w.

Rościszewski Erazm, Baszt. 26.

Rosenzweig Józef, Klinika.

Rosenberg Antoni, Ziel. 14.

Rosenblatt Emanuel, Basztowa 25 (3—4).

Rosner Aleksander, Rynek 22.

Rosner Antoni, Rynek 22 (3—5).

Rutkowski, Pawia 20.

Rutowski Klemens, Szewsk. 6.

Rydel Lucyan, Sławkowska 22 (10—12).

Rydygier Ludwik, Wielopole 4 (3—4).

Schaitter Ign., Grodz. 62 (2—3).

Schoengut Stefan, Wiślna 10.

Šchuman Franciszek, Szpital ś. Łazarza.

Schneider Ludwik, Basztowa 18 (3—4).

Schwarz Albin, Sławkowska 8 (3—5) l. p.

Šeiborowski Wład., Franciszkańska 3 (3—4); w lecie w Szczawnicy.

Senensieb Marek, Gertrudy 11.

Siedlecki Jan, Rynek 45.

Skobel Stanisław, Rynek gł. 23 (3—5),

Dr Skórczewski Bol., Batorego 24, w lecie w Krynicy.
 Skrzyński Stef., Szczepański plac 7 (3—4).
 Sliwiński Michał, Mały Rynek 4 (3—4).
 Słapa Wilh., Kolejowa 4.
 Sokołowski Henr., Szewska 11 (2—4).
 Spira Rafał, Dietla 52.
 Sroczyński Franciszek, Floryańska 9 (3—4).
 Starachowicz Jan, Plac WW. SS. 10 (dentysta).
 Sternberg Józ., Mały Rynek 5.
 Stopczanski Aleksander, Kopernika 12, zakład chem.
 Surzycki Józef, Floryańska 13 (3—4).
 Süsskind Albert, Stradom 18 (3—4).
 Switalski Ludwik, Sławkowska 27 (3—4).
 Szewczyk Józef, Franciszkańska 1.
 Szymkiewicz Kazim., Rynek gł. 26 (dentysta).
 Szymonowicz Wł. Łobzows. 10.
 Teichmann Ludwik, Floryańska 53.
 Tislowitz Paweł, Krakows. 39.
 Torczyński Teofil, Szpital ś. Łazarza.
 Trzebicki Rudolf, św. Anny 4 (3—4).
 Tuszyński Ferd., Sławkow. 20.
 Tyszkiewicz Wincenty, Garbarska 1.
 Wachholz Leon, ś. Anny 11.
 Walentowicz Andr., pl. Dominikański 1.
 Wilkosz Aleksander, Mały Rynek 4 (3—4).
 Wiszniewski Ludw., Krupnicza 5 (3—4).
 Woszczyński Julian, Stolarska 13.
 Zanietowski Józ., Batorego 1.
 Zarewicz Aleksander, Floryańska 40 (2—4).
 Zieleniewski Michał, Szpitalna 32.

Dr Zoll Józef, Kolejowa 7.
 Żuławski Karol, Długa 82.
 Jan Dłużński, dentysta, Floryańska 12 (9—1, 3—5).
 Drd Hrebenda Władysław, lekarz - dentysta Szpitalna 17 (9—1, 2—5).
 Drd Łukaszewicz Karol, Sławkowska 16 (9—1, 3—5).
 Dr Szymkiewicz Kazimierz, Rynek gł. 26 (9—1, 3—5).
 Dr Starachowicz Jan, plac WW. SS. 10, lekarz-dentysta.

Lwów.

Dr Arnold Wincenty, Szpital ś. Zofii.
 Aschkenazy Zygmunt, Chorażczyzna 13.
 Auernbach Emanuel, Skarbk. 2.
 Bałaban Teodor, Wałowa 7.
 Barański Antoni, prof. szkoły wet. Chorażczyzna 24.
 Barącz Roman, Teatralna 11.
 Beręzowski Kazimierz, prym. w zakł. w. Brajer 6.
 Berthlef Karol, pl. ś. Ducha 3.
 Bett Maks., Skarbkowska 3.
 Bienkowski Bogumił, dent., ul. Kościuszki 8.
 Błotnicki Teod., pl. Smolki 3.
 Bogdański Wład., Blachars. 1.
 Bory Julian, Grodzickich 2.
 Bylicki Wład., Kościuszki 7.
 Braun Izidor, Sykstuska 31.
 Chądzyński Jan, e. pr. sz. p. Kopernika 3.
 Chomin Ant., Zimorowicza 3.
 Czarnik Stanisław, Łyczakowska 46.
 Czerkowski Stan., Kurkowa 8.
 Czyżewicz Ad., prof. sz. r. z. Cłowa 2.
 Dębiecki Kl., Piekarska 8.
 Dekański Stan., Czarniecki. 4.
 Dobiński Włodz., Puławs. 1.
 Dubanowicz Paweł, Ormiańska 33.
 Durst Adolf, Kaźmierz. 23.
 Ebers Henryk, w lecie w Krynicy, Mickiewicza 3.
 Ehrlich Dawid, Grodecka 58.

Dr Elektorowicz Emil, l. m. Łyczakowska 6.
 Feigel Longin, pros. sz. p., Łyczakowska 3.
 Festenburg Edward, Dominińska 11.
 Fiałkowski Lud., Syxtuska 13.
 Frankowski Walery, asys. Szp. krajow.
 Fuchs Franc., dentysta, plac Maryacki 9.
 Fuchs Leon, Jagiellońska 18.
 Głuchowski Franciszek.
 Gluziński Lesław, Wałowa 14.
 Głowacki Bol., dyr. sz. p., Batorego 24.
 Golebiowski Karol, Łyczakowska 18.
 Gońka Andrzej, dentysta, Kopernika 4.
 Gostyński Józef, lekarz sądowy ul. Kościuszki 2.
 Gross Karol, ul. Boimów 9.
 Gussmann Izaak, em. lekarz wojsk. Żółkiewska 38.
 Hellmann, ul. Jagiellońska 16.
 Hoszard Franc., czł. W. kraj. Ossolińskich 4.
 Jana Stan., Czarnieckiego 8.
 Janda Franc., Pańska 21.
 Jasiński Wł., c. k. radca rz. l. z. kar. Kurkowa 3.
 Jekeles Ludwik, Sykstuska 62.
 Jendel Teodor, Akademicka 5.
 Kadyj Henryk, prof. sz. w. ul. Zielona 15.
 Kicki Tytus, Kopernika 3.
 Kniaziołucki Zyg., Kopern. 15.
 Kobylański Ant., Strzelecka 2.
 Konarzewski Jan, Pańska 6.
 Korman Jakób, pl. Strzelecki 3.
 Kosiński Franc., em. fiz. m. ul. Skarbkowska 37.
 Kossak Leon, Wałowa 29.
 Kozierowski Eug. Czarniecki 4.
 Krobicki Tadeusz, l. m. Skarbkowska 2.
 Krokiewicz Ant., Kopernika 8.
 Krygowski Tadeusz, ulica 3ci Maja 10.
 Krzyżanowski Franciszek, pl. Bernardyński 12.

Dr Kucharski Piotr, sek. szpitala dziec. Akademicka 22.
 Kuhn Adolf, Szpital p.
 Kwiatkiewicz Stan., Pańska 6.
 Lachowicz Zdzisław, pl. Hallicki 14.
 Landau Fryderyk, Karola Ludwika 37.
 Lateiner Em., Kopernika 9.
 Legeżyński Wiktor, ś. Michała 9.
 Lukas Ad., l. sąd. Blachar. 8.
 Łopacki Ludw., l. m. Chorążczyzna 13.
 Machek Em., Wałowa 4.
 Mahl Jakób, Jagiell. 24.
 Majewski Ad., l. z, hydr. Łyczakowska 43.
 Mehrer Henr., Jagiell. 13.
 Merczyński Em., pr. s. d. Ossolińskich 10.
 Merunowicz Józef, c. k. Protomedyk, Wałowa 31.
 Mosing Kaz., Wałowa 13.
 Mukowicz Edward, Kazimierzowska 24.
 Obtułowicz Ferdynand, Plac Smolki 5.
 Opolski Wiktor, pr. szp. p. rad. zdr. Wałowa 13.
 Papée Jan, Batorego 34.
 Pawlikowski Ant., fiz. m. Chorążczyzna 2.
 Piotrowski Gustaw, Akademicka 5.
 Pisek Wilh., Jagiell. 12.
 Podlewski K., Chorążcz. 16.
 Prus Jan, Kościuszki 7.
 Rapp Leon, Wałowa 11.
 Rapaport Józef, Grodecka 10.
 Reinhold Jon., Jagiell. 2.
 Reitzes D., Skarbkowska 27.
 Roicki Ant., Sokoła 1.
 Rosenbusch L., Kopernika 14.
 Rosenzweig Leo, Sykstuska 6.
 Rosner Jan, Cłowa 2, w lecie Francensbad. (Steinhaus).
 Rosner Ig. l. m., Sykstuska 14.
 Rożański Józef, prym. szp. Sykstuska 36.
 Sawicki Edward, prym. szp. Batorego 32.

Dr Schmidt Edm., l. m., Akademicka 11.

Schney Jakób, Żółkiewska 69.

Schramm Hilary, Halicka 20.

Seifmann Piotr, dyr. sz. w.

Selzer Józef, Sykstuska 4.

Sielski Szczes., Akademicka 8

Sieradzki Antoni, Chorążczyzna 14 B.

Silberstein Samuel, Sykstuska 34.

Singer Menele, Kotlarska 1.

Skalkowski Wł., Teatralna 16.

Skalkowski Bronisław, Piekarska 4.

Smitowski Miecz., Sobieskiego 7.

Smutny K., Chorążczyzna 14.

Sochanik Stanisław, pl. Bernardyński 15.

Sochański J., Pańska 2.

Sokal Mayer, Plac Krakows. 1.

Stachiewicz Teofil, Plac Maryacki 8.

Stahlberger Teod., Sobiesk. 9.

Stanowski Karol, Podlewskiego 6.

Stark J., Pl. Gołuchowsk. 3.

Steinhaus Józef, em. lek. pow., Sykstuska 21.

Stella-Sawicki Jan, ins. szp. Kurnicka 13.

Strojnowski Edw., Plac Maryacki 6 i 7.

Świątkiewicz Mich., Grodzickich 1, pr. Szp.

Szuszkiewicz Piotr, lek. polic. Kopernika 19.

Szpilman Józef, doc. szk. wet.

Sztembarth Celestyn, sek. szp. Batorego 26.

Szulisławski Adam, Teatral. 7.

Szydłowski Zdzisław, Teatr. 5.

Taschmann Albert, Korniaaków 1.

Tatańczuch Władysław, l. m. Kołataja 6.

Teodorowicz Tadeusz, Chorążczyzna 12.

Tomanek Józef, Teatralna 21.

Tyszkowski Leon, Piekarsk. 21.

Uhma Czesław, Lindego 7.

Dr Wachtel An., Czarnieckiego 4.
Wagner Arnold, l. k. Ossolińskich 6.

Wechsler Emil, Kilińskiego 2.

Wehr Wiktor, Sykstuska 19.

Weigel Józef, Akademicka 20.

Weiss Adolf, Akademicka 3, (dentysta).

Wernicki Józ. Mickiewicza 3.

Wiczkowski Józef, chem. szp. p., Skarbowska 4.

Widman Oskar, pr. szp., Grodzickich 2.

Wiktor Jan, l. m., plac Strzelecki 2.

Willer Abr., pl. Gołuch. 3.

Zakreys Franc., Grodecka 50 B.

Zavadil Teofil, Wałowa 31.

Ziembicki Grzegorz, pr. szp. 3 Maja 5.

Zion Oswald, Kołataja 3.

C. Beschloss Manisch v. Maksym. Żółkiewska 29.

Chilf Sam., Sobieski 13.

Dokupil Jan, Halicka 54.

Gabel Hil., Sobieskiego 26.

Gallasch Józef, Janowska 32.

Gasiorowski Juliusz, l. k. Dworzec.

Grabsheid Max, pl. Krakowski 10.

Haynrich Józef, Czackiego 6.

Knopf Salom., dom inwalid.

Kraimer Eman., pl. Krakow 7.

Kurzer Lazar, pl. Krakow. 12.

Lateiner Jak., Żółkiewska 65.

Latainer Leon, Karol. Ludw. 31.

Letz Samuel, pl. Gołuchowskich 15.

Lisowski Maryan, dentysta pl. Trybunalski 1.

Mański Edward, ortoped. pl. Smolki 5.

Mark Sal., pl. Maryacki 8.

Rosenkranz Maur., Batorego 6.

Szymonowicz Jan, Teatr. 23.

Urich Sal., Pańska 27.

Weiss Ign., Akademicka 3.

Zawirski Konst., Batorego 14.

Zrogowski Jan, Batorego 6.

W. Barański Ant., Prof. Dr.

Bloch Anton.

W. Kadyi Henryk, Prof. Dr.
 Kałkowski Józef.
 Kubicki Leon, w. m. Bat. 7.
 Kretowicz Paweł, n. szk. w.
 Krwawicz Bazyli.
 Kulczycki Włodzim.
 Królikowski Stanisław.
 Langhaus Józef.
 Markowski Tomasz.
 Nowicki Józef.
 Punicki Franciszek.
 Prus Jan Dr.
 Seifman Piotr, Dyr. sz. w.
 Szpilman Joz. Dr. Prof,

1. Pow. Bialski.

D. Nycz Wincenty, Biała l. p.
 Bogdanik Józ., Biała pr. szp.
 Kapelusz Eug., Biała l. szp.
 Kwieciński Maciej, Biała.
 Długołęcki Ferd., Kęty l. m.
 Dworzański Karol „
 Łucki Sas Julian, Oświęcim.
 Marynowski Józef, „
 Schlank Maurycy „ l. m.
 Słosarczyk Antoni, „
 C. Kupka Józef, Biała l. m.
 Kunz J., Wilamowice l. g.
 W. Krwawicz B., Dr. Biała w. p.
 Orzechowski M., Oświęcim.

2. Pow. Bobrecki.

D. Głowiński Wine., Bóbrka l. p.
 Bober Jan, Chodorów.
 Jalikowski Maryan, Strzeliska
 nowe.
 C. Sochacki Fel., Chodorów l. k.
 Handt Izydor „ l. m.
 Roth Wolf, Bóbrka.
 Sternberg Bern., Strzeliska.
 W. Łucki Joz., Bóbrka w. p.

3. Pow. Bocheński.

D. Bielański Gust., Bochnia l. p.
 Fränkel Józef „
 Glücksmann Leon „
 Górski Czesław, „ l. sal.
 Nodzyński Bolesł., „ Sek. S.
 Oświęcimski Sz., „ pr. sz.
 Roth Alojzy
 Bartmański Ferdynand, Nie-
 połomice l. m.

D. Piórko Ad., Niepołomice.
 Dobruchowski Adam, Wiśnicz
 l. domu karn.
 C. Wieselman Mor., Wiśnicz l. m.
 Kohn F.
 W. Fertig Zyg., Bochnia w. p.

4. Pow. Bohorodczański.

D. Męciński Konstanty, Boho-
 rodeczany l. p.
 Urich Teofil, l. o. Bohorodecz.
 Feuerstein N., Słotwina l. m. sk.
 W. Misiura Jędrzej, w. p.

5. Pow. Borszczowski.

D. Dorożyński Jak., Borsz. l. p.
 Mosler Maks., Borszczów.
 Schmerl Alt., Jezierzany.
 Feuerstein Lejz., Korolówka.
 Kalinowicz Mikołaj, Korolów-
 ka l. m.
 Dawidowicz Emil, Mielnica.
 Szajnowski Maryan, Skała.
 Seidner Abraham, Skała.
 C. Mintzeles Lejs., ujście biskup.
 W. Rohr H., Borszczów w. p.

6. Pow. Brodzki.

D. Sobolewski Franc., Brody l. p.
 Glasgall Jakób, Brody.
 Kalach Feliks, Brody.
 Leiblinger Fel., Brody, l. m.
 Mann Józ., Brody l. sz. izr.
 Schapira Aleks., Brody l. sz.
 Sołtysik Stan., „ pr. sz.
 Strumiński Adam, „
 Madejski Wł., Pieniaki l. s.
 Zaorski Bronisł., Podkamień.
 Borysiewicz Wiktor, Załozce.
 C. Grünfeld Iz., Brody l. m.
 Leider Dawid, Toporów.
 Nussbaum Melchior, Podka-
 mień l. m.
 Rager Izydor, Załozce.
 Rosenbaum Leon, Łopatyn l. m.
 W. Harasymowicz Dyon., w. p.

7. Pow. Brzeski.

D. Pietrzycki Ant., Brzesko l. p.
 Bernacki Franc., „
 Bernadzikowski Sz., „
 Łowczowski Wiktor, Czchów.

D. Palka Konrad, Radłów l. m.
 Michalik Józef, Szczurowa.
 Jaroński Piotr, Wojnicz l. m.
 Kisielewski Józef, Zaklicz l. m.
 Kluczyński Zbig., „
 C. Czernek Henr., Wojn. l. m.
 W. Kisiel Daniel, w. p.

8. Pow. Brzeżański.

D. Skibicki Adam, lek. pow.
 Szymonowicz Winc., Brzeżany
 Teitelbaum Melech, Brzeżany.
 Urbanowicz Tadeusz, l. m. „
 Zauderer Albert, pr. szp. „
 Milerowicz Józ., Kozowa l. m.
 Fleischmann Adolf, Kozowa.
 C. Schenker E., Brzeż. sek. szp.
 W. Sigal H., w. p.

9. Pow. Brzozowski.

D. Lic Henr., Brzozów l. p.
 Niziołek Paweł.
 Meth Sz., Dynów.
 Śnieżek Ludwik, Jasienica.

10. Pow. Buczacki.

D. Hirschler Miecz., Buczacz l. p.
 Kroo Józef, „
 Krzyżanowski Edw., „ l. m.
 Nacht Fabiusz, „
 Koerner Ed., Monasterzyska.
 Bobek Jan, Potok Złoty.
 C. Mosler Mojżesz, Buczacz.
 Feder Jak., Jazłowiec l. m.
 Adler Szymon, Monaster. l. m.
 W. Majkowski B., Buczacz w. p.

11. Pow. Chrzanowski.

D. Berggrün Alfr., Chrzanów l. p.
 Klein Leon, „ l. m.
 Rieser Adolf, „
 Damski W., Jaworzno l. gór.
 Dura Józef, Krzeszowice l. s.
 Nycz H., Szczakowa.
 Schneck Karol, Szczak. l. f.
 Steinkeller Henr., Trzebin. l. m.
 Udziela, Siersza l. g.
 W. Ochnicz Michał, Chrzan. w. p.

12. Pow. Cieszanowski.

D. Jabłoński Jac., Cieszan. l. p.
 Jüngst Wacław, Narol l. o.

D. Rosenblüth Ef., Lubaczów l. m.
 Szymański Henryk, Lubaczów
 Müldner Józef, Oleszyce.
 C. Rotter As., Cieszanów l. m.
 W. Serwacki Michał w. p.

13. Pow. Czortkowski.

D. Wągrowski Karol, Czortków
 l. p.
 Bubeniczek Franc., em. lek.
 pułk. Czortków.
 Stoekl Adolf, Czortków l. m.
 Lutyński Ludw., Jagielnica l.
 fabr.
 Zrogowski Bron., Jagielnica.
 C. Oestersetzer Ad., Czortków.
 W. Machalski, Czortków w. p.

14. Pow. Dąbrowski.

D. Kramarzyński Mieczysław, Dą-
 browa l. p.
 Millet Abraham, Dąbrowa.
 Ozimek Stanisław, „
 Zaręba Ant., l. m. sąd.
 Rudnicki Karol, Szczucin l. m.
 Cymbler Walery, Żabno.
 C. Kluczycki Wit., Mendrzechów
 W. Szerba Jan, Dąbrowa w. p.

15. Pow. Dobromilski.

D. Bieńczewski Aleks., Dobro-
 mil l. p.
 Cwiklicer Ludw., Dobr. l. m. sa.
 Puchalski Szczepan, Dobromil.
 Bendel Samuel, Bircza l. m.
 Antoniewicz Eust., Malawa.
 C. Brauner Leon, Dobrom.
 W. Dötsch Fr., w. p.

16. Pow. Doliniański.

D. Peters Józef, Dolina l. p.
 Kotłowski Stan., Dolina l. m.
 Neschling Lazar, Bolechów.
 Nowak Józef, Wygoda l. f.
 Podłuski Mikołaj, Bolechów
 l. m. i kol.
 Witoszyński Teofil, Różniatów.
 C. Kujłowski Leon, Bolechów
 l. sal.
 Baumöhl Naf., Dolina.
 W. Fedorowicz Włó. w. p.

17. Pow. Drohobycki.

- D. Janowski Ignacy, Drohobycz
1. p.
Antoniewicz Włodzimierz,
Drohobycz 1. m.
Feuerstein H., Drohobycz.
Friedmann Henr., Drohobycz.
Hofner Oskar " "
Jurkiewicz Kaźm., " 1. s.
Lechowski Wik. " "
Bermann Dawid, Borysław.
Löw Bernh., Borysław 1. górn.
Penner Ignacy, Borysław.
Mayer Józef, Medenica.
C. Reich Baruch, Drohobycz 1. m.
Rosenöhl Joach. " 1. kol.
Kelhofer Sam., Borysł. 1. m.
W. Gottlieb Aleks., Droh. w. p.
Chotiner Eleazar, Borysł. w. g.

18. Pow. Gorlicki.

- D. Wroński Bartł., Gorlice 1. p.
Bielewicz Feliks, " 1. m.
Frühling Marc., " "
Grzybezyk Stan. " "
Kretowicz Walenty " "
Neumann Eugen. " "
Przesmycki Jan " "
Katyński Ludwik, Biecz 1. m.
C. Koller Jerzy, Gorlice 1. m.
W. Janowicz St. w. p.

19. Pow. Grodecki.

- D. Danielski Jan, Gródek 1. p.
Gawroński Aleksan., Gródek
1. m. i kol.
C. Landau Ad., Gródek.
Schöps Ignacy, Janów.
W. Ponicki Franc., Gródek w. p.

20. Pow. Grybowski.

- D. Kronenberg Karol, Grybów
1. p.
Déhm Rachmiel, Grybów.
Jakubowski Adam, Grybów
1. m.
Orzechowski Jan, Bobowa 1. m.
Mikołajski Stefan, Cieżkowice
1. m. i kol.
W. Hirsch Herm., w. p.

21. Pow. Horodeński.

- D. Schmidt Filip, Horodenka
as. san.
Palester Henr., " 1. m.
Roszko Antoni, Horod. 1. sz.
Bujalski Maryan, Obertyn.
C. Burnatowicz Rom., Obertyn
1. m.
Kurzer Gustaw, Horod. 1. m.
Landes Leon " "
W. Skuciński Jan w. p.

22. Pow. Husiatyński.

- D. Frydmann Zeno, Husiatyn 1. p.
Hahn Feliks, Husiatyn.
Auerhahn Wilh. Chorostków.
Sokal Józef, Kopeczyńce.
Wilson Rysz., Kopeczyńce.
C. Hladij Sz., Chorostk. 1. m.
Margules Elias, Husiatyn.
Pomeranz Filip " "
Rares Izydor, Husiatyn 1. m.
Siebner Nath., Kopyczyńce
1. m.
Sobelsohn Dawid, Probuźna
1. m.
W. Gródecki Miecz., Husiat. w. p.

23. Pow. Jarosławski.

- D. Marynowski Miecz., Jarosław
1. pow.
Dietzius Adolf, Jarosław lek.
m. kol.
Feldmann Maks., Jarosław,
Friedwald Abr., Jarosław.
Meissels Zyg., Jarosław.
Plech Aur., Jarosł. em. 1. p.
Richter Fryder., Jarosław.
Rossberger Sal. Jarosław.
Trzaskowski Bron., Jarosław.
Turzański Grzeg. 1. m.
Schmeidler Leon, Radymn. 1. k.
Jastrzębski Walery, Sieniawa.
C. Ackerbauer Schmerl., Jarosł.
Becher Salom., Jarosław.
Thalheim Joachim, Pruchnik
1. m.
Reiss Abr., Radymno 1. m.
Morecki Pink., Sieniawa 1. m.
W. Waśniewski Fr., Jarosł w. p.

24. Pow. Jasielski.

- D. Biesiadecki Jan, Jasło l. p.
 Cięglewicz Stan. " "
 Gabryszewski Tad., " "
 Hicner Aleks. " l. m.
 Kadyj Józef, Jasło s. sz.
 Macudziński Wal., Jasło pr. sz.
 Natter Wiktor, Frysztak.
 Łukasiewicz Wal., Kołaczyce.
 Morawski Szymon, Żmigród. n.
 Brill Krystyn, " "
 C. Spiegel Em., Frysztak l. m.
 W. Pawlikiewicz Jan, Jasło w. p.

25. Pow. Jaworowski.

- D. Hordyński Andrzej, Jaworów l. pow.
 Orski Jan, Jaworów.
 Gracka Józef, Krakowiec l. s.
 C. Bendel Zygm., Jaworów.
 Gabel Rubin " "
 Piotrowski Ign., Wielkie Oczy.
 W. Bernstein Józ., Jaworów w. p.

26. Pow. Kałuski.

- D. Wurst Adolf, Kałusz l. p.
 Kurowiec Jan " "
 C. Kiczeles Herm., " l. kol.
 Finkelstein Maur. " l. m.
 Hand Leop., Wojniłów.
 W. Nowak Jan, Kałusz w. p.

27. Pow. Kamionecki.

- D. Janiszewski Ant., Kamionka as. san.
 Stupnicki Wł., Kamionka l. m.
 Czerkawski Jul., Dziedziłów.
 Prochaska Teofil, Busk.
 Ciuk Aleks., Radziechów.
 C. Raps Maks., Kamionka.
 Siegelbaum Jakób, Busk.
 Brand Jul., Radziechów.
 W. Kwieciński Stanisław, w. p.

28. Pow. Kolbuszowski.

- D. Filewicz Jan, Kolbuszowa l. p.
 Billig El., " l. m.
 Lippel Jakób, Sokółów l. m.
 Szóstkiewicz St., Majdan l. m.
 W. Gnatowicz, Kolbuszowa w. p.

29. Pow. Kołomyjski.

- D. Rosner Maks., Kołomyja l. p.
 Głaczyński Wł., " pr. sz.
 Hulles Jakób " "
 Jaworski Bolesł " "
 Kobryński Włod. " "
 Piaskiewicz Wł., " l. m. i k.
 Rosenheck Sal. " "
 Sysak Gabryel " "
 Steuermark Aleks. " l. pułk.
 Schorsz Józ. " "
 Dwernicki St., l. s. ch.
 Kalinowicz, Jabłonowa l. o.
 Goldhaber J., Gwoździec.
 C. Berger, Kołomyja.
 Reder Eman., " "
 Terner Hersch " "
 Zaleski Antoni " "
 W. Wiliński, Kołomyja w. p.
 Hamerman " w. m.

30. Pow. Kosowski.

- D. Tarnawski Apol., Kosów l. p.
 Bażant Wacł., Kosów l. sal.
 Frisch Józef, Kosów.
 Skomorowski Jan., Kutry l. m.
 Pawlicki Teodor, Żabie l. o.
 C. Rudich Leon, Kosów.
 W. Gnatewicz Piotr, Kosów w. p.

31. Pow. Krakowski.

- D. Michalik, Czernichów.
 Komorowski B., Zwierzyniec.

32. Pow. Krośnieński.

- D. Coghen Antoni, Krosno l. p.
 Humiecki Mod., Krosno.
 Kocay Aleks., Krosno.
 Mazurkiewicz Dyon., Krosno l. m.
 Wain Jan, Krosno.
 Kropaczek Franc., Dukla.
 Reiss Karol, Dukla l. m.
 Przysłowski Jakób, Korczyn l. gm.
 C. Horak Karol, Dukla.
 W. Szydlowski Zenon, w. p.

33. Pow. Łańcucki.

- D. Witkowski Edward, Łańcut l. p.

- D. Fleszar Jan, Łańcut l. m.
 Mach Seb., Kańczuga.
 Nidecki Apolin., Leżajsk l. m.
 Herz Emanuel, Przeworsk.
 Howiecki Mat., Przeworsk.
 Koncewicz Jan " l. m.
 C. Arzt Ignacy, Łańcut l. sk.
 Dobiasz Teod., Przew. l. m.
 W. Duleba Maryan, Przew. w. p.
 Szymański Ant. "

34. Pow. Limanowski.

- D. Ściborowski Kazim., l. p.
 Kruk Kazim., Limanowa.
 Herzig N., Mszana.
 Odrobina Jerzy, Mszana l. k.
 Orzeł Józef, Ujanowice.
 W. Atlas Herman w. p.

35. Pow. Liski.

- D. Dembowski M., Lisko l. p.
 Edelheit Zygm. "
 Robel Wiktor, Baligród l. m.
 Jaremkiewicz Mich., Ustrzyki.
 Lenartowicz Roman "
 Duleba, Lutowisko.
 C. Freysinger Józ., Lisko l. m.
 Propst Jakób, Lutowisko l. m.
 W. Rutkowski Kaz. w. p.

36. Pow. Lwowski.

- D. Obtulowicz Ferd., Lwów l. p.
 Finkel Herm., Jaryczów.
 Rozłucki Michał, Dublany l. s. r.
 Kolhberger, Kulpark. s. sz.
 Maliszewski H. " pr. "
 Neusser Gust. " dyr. sz.
 Pluciński Mich., Kulpark. p. sz.
 Kruszyński St. " "
 Acker Sal., Szczerzec.
 Last Szym., " l. m.
 Sobolewski Kazim., l. f. Win-
 niki.
 C. Raps Maur., Jaryczów.

37. Pow. Mielecki.

- D. Warzycki Br., Mielec as. san.
 Iwański Kar., Radomyśl l. m.
 Kijas Błażej, Mielec em. l. p.
 Lorenski And., Radomyśl.
 Szafer Wład., Mielec.
 Staniszewski Wład., Mielec.

- C. Schabus Em., Mielec l. m.
 W. Łukaszewski Andr. w. p.

38. Pow. Mościski.

- D. Lebedowicz Em., Mościska
 l. p.
 Gutmann Langsam "
 Pordes Majer, Sądowa W. l. k.
 C. Korner Wilh., Mościska l. m.
 Raab Hen., Sąd. Wisznia l. m.
 W. Grochowski Kar. Mośc. w. p.

39. Pow. Myślenicki.

- Kniehynicki Klem., Myśle-
 nice, l. p.
 Łodziński Wikt., Myśl. l. m.
 Dereniowski Bol., Jordanów
 l. m.
 Uchacz Bł., Maków l. sk.
 Zduń Józef, Raba w.
 Spitzel Jakób, Rabka.
 W. Vergesslich Joz. w. p.

40. Pow. Nadworniański.

- D. Bednarski Jan a. s. Nadwórna.
 Bogdański Bronisł., Delatyn
 l. m. i sal.
 Bibring Szym., Nadwórna.
 C. Feuerstein Maur., Nadwórna
 l. m.
 W. Fischer Joachim w. p.

41. Pow. Niski.

- D. Loewy Alojz., Nisko l. p.
 Bresiewicz Stan. Nisko l. g.
 Hernich Franc., Rudnik l. m.
 Hand Jonatan, Ulanów l. g.
 C. Hand Saul, Ulanów l. m.
 W. Piskorski Jan w. p.

42. Pow. Nowosądecki.

- D. Przybylski Wacł., N. Sącz l. p.
 Głuchowski Miecz., N. Sącz.
 Kijas Tadeusz "
 Kołaczkowski J., w l. Szczawn.
 Kościelkiewicz Franc. "
 Kozubski Ludwik, N. Sącz l. k.
 Mohr Dawid "
 Richter Józef " l. m.
 Stawik Karol "
 Zengteller Luc. " pr. sz.
 Dziembowski Józef, Muszyna.

D. Kmietowicz Fr., Krynica l. g.
 Chilewski Aleks., S. Sącz l. k.
 Gawelkiewicz Leop. „ l. k.
 Lehman Józef, „
 Tabor Bron., N. Sącz (dent.).
 C. Zauderer Maur., N. Sącz.
 W. Sołtykiewicz Jan „ w. p.
 Stuber Krystyn „ w. m.

43. Pow. Nowotarski.

D. Blumenfeld Hen. N. Targ l. p.
 Schein Herman „ l. m.
 Hammerschlag Rudolf, Kroś-
 cienko.
 Chramiec And., Zakopane.
 Chwistek Bronisł. „
 Smorągiewicz Kazim. l. st. kl.
 W. Lubliner Leon, N. Targ w. p.

44. Pow. Pilzneński.

D. Januszkiewicz Ignacy (syn.),
 Pilzno as. s.
 Mydlarski Wład., Pilzno.
 Gumowski Fr., Brzostek l. m.
 Januszkiewicz Ign. (ojc.) Dul-
 czówka em. l. p.
 W. Orzechowski Mar., Pilzno.
 Reiss Samuel, Czarna w. m.

45. Pow. Podhajecki.

D. Dzikowski Zygm., Podhajce
 l. p.
 Choróbski Stan. pr. szp.
 Landau Aron, Podhajce.
 Lidehower Maur., Podhajce.
 Zirhoffer Karol, Wiśniowczyk
 l. o.
 W. Mikolaschek Jan, Podhajce
 w. p.

46. Pow. Przemyśki.

D. Cassina Ferd., Przemyśl l. p.
 rad. zdr.
 Ciechański Al. „
 Dukiet Józef, „
 Grabscheid Mojż. „
 Keller Maurycy, „
 Kiebuziński Baz., „
 Kutna Samuel, „
 Lityński Luc., „ l. k.
 Madejski Józef pr. szp.
 Mannheim M., l. k. chor.

D. Słaczka Ant. a. s. Przem.
 Schöeffer Franc., (dentysta).
 Szyszkowski Mich., Przemyśl.
 Smolarski Zygm., „ l. m.
 Trybulec Franciszek, „
 Ziemiański Leon, „
 Salay, Przem., em. l. sztab.
 Gasiorek Franc., Dubiecko.
 Rączka Stan., Niżankowice.
 C. Chliff Joach., Przemyśl (dent.).
 Schnitzer, „ „
 Biber Maur., „ sek. szp.
 i więz.
 Salwer Joachim, Przemyśl.
 W. Fried Ferd., Przemyśl w. p.
 Kruk Herm. „ w. m.

47. Pow. Przemyślański.

D. Waligórski Alb., Przemyślany
 l. p.
 Barbag Herman, „
 Dolnicki Cyryl, Gliniany.
 Moch Jan, Hanaczów.
 C. Kostmann Ign., Przemyślany
 l. m.
 Kümmermann Sal., Gliniany.
 Sternberg Józef, Przemyślany.
 W. König Pinkas, w. p.

48. Pow. Rawski.

D. Lisiński Ludw., Rawa l. p.
 Dadlez Julian, „
 Zadurówicz Emil, Uhnów l. m.
 C. Elner Mark., Niemir. l. m.
 Herold Izidor, Rawa.
 Hirsch Henryk, Lubycza.
 Kibitz Bernard, Uhnów.
 Kibitz Natan, Rawa.
 W. Weissberg Adolf, w. p.

49. Pow. Rohatyński.

D. Wasylewski Tyt., Rohatyn l. p.
 Schaff S., „
 Tarlecki Ant., „ l. m.
 Halarewicz B., Bołszowce l. m.
 Mossor Kazim., Bursztyn.
 Płochocki Tadeusz, Bursztyn.
 C. Goldschneider Jakób, Buka-
 czowce l. k.
 Frost A., Bursztyn.
 W. Weissberg Abr., Rohatyn
 w. p.

50. Pow. Ropczycki.

- D. Wyszatycki Fr., Ropcz. l. p.
 Białkowski Wład. " 1. m.
 Roller Fryd, " 1. m.
 Bentkowski Zygm., Dębica.
 Sędzieliowski Fr. Sędziszów.
 C. Benda Ant., Dębica l. m i k.
 Reiss Elias, Dębica.
 Sztolzenberg Kar., Sędzisz.
 W. Panek Jan, Dębica.
 Kałakowski Wł., Sędziszów.

51. Pow. Rudecki.

- D. Żelazowski Wiktor, l. p.
 Maciulski Józef, Kołbajówce.
 Jakliński Leon, Komarno l. sk.
 C. Bardasch M., " 1. m.
 Gizelt Józef, Rudki l. m.
 W. Andykowski Maryan, w. p.

52. Pow. Rzeszowski.

- D. Barzycki Józ., Rzeszów l. p.
 Lachowicz Eug., " a. s.
 Bujniiewicz Jakób. " "
 Elsner Hirsch " "
 Fiałkowski Wojc., " "
 Jabłoński Stan., " pr. sz.
 Kraus Herman, " "
 Niesiołowski Wł. " "
 Szczepański Włodz., " a. s.
 Segel Edward, " "
 Zagórski Ad., " 1. m.
 Sieniewicz Mich. Błazowa l. m.
 Patryn Józef, Strzyżów l. w.
 Szczepański Tyt., Strzyżów.
 Solecki Jan, Tyczyn.
 C. Bernfeld Leon, Tyczyn l. m.
 Herzum Józ., Głogów l. m.
 Reiner Iz., Rzeszów.
 Rotter Herm., " "
 W. Rasp Karol, Dr med. w. p.

53. Pow. Samborski.

- D. Skalski Wł., Sambor l. p.
 Biegelmayer Alf., " p. s.
 Chrzaszczewski Woj., Sambor.
 Dreifach Iz., " "
 Klauber Adolf " "
 Kopaczyński Wład., " "
 Markiewicz Henryk " "
 Omeis Jerzy " "

- C. Luster Herm., Sambor.
 Reis Leon, " "
 W. Rożankowski Jan, w. p.

54. Pow. Sanocki.

- D. Czyżewicz Wład., Sanok l. p.
 Drewiński M., " 1. szp.
 Kozłowski Emil, " 1. m.
 Zaleski Karol, " 1. w.
 Lemer Tytus " "
 Herzig Naftali, " "
 Wienkowski Józef, em. lek.
 sztab. Sanok.
 Bielecki Ign., Rymanów.
 Krzyszkowski Er., Rymanów.
 Galant Józef, Zagórz l. k.
 C. Stangenhau Józef, Sanok
 sek. szp.
 Atlas Sal., Bukowsko l. m.
 W. Olbrycht Piotr, San. w. p.

55. Pow. Skałacki.

- D. Najedło Feliks, Skałat l. p.
 Vorzimmer Herm., " "
 Wojtkowski Jan, Grzymałów.
 Dawid Salom., Podwołoczyska.
 Konarzewski Jan " "
 Swiderski Bruno " "
 C. Bardach T., Grzymałów.
 Freudenthal Sal., " "
 Berger Elias, Podwołocz.
 Starwer Maurycy, Skałat.
 Metal Izaak, Podwołocz. l. m.
 W. Tychowski Wikt., " w. p.
 Lille Osias, Podwołoczyska.

56. Pow. Śniatyński.

- D. Werner Kar., Śniatyn l. p.
 Lic Feliks, Zabłotów.
 Mehrer Izidor, Śniatyn l. m.
 Meller Dawid, " "
 Żukotyński Franc., " "
 C. Pomeranz Izidor Śniatyn.
 Berger Aron, Śniatyn.
 W. Faulent Karol " w. p.
 Prager Sam., Zabłot. w. m.

57. Pow. Sokalski.

- D. Broniowski Ant., Sokal l. p.
 Jajus Miron, " 1. m.
 Łuszczkiewicz J., " "
 Urech Marek, " "

D. Wyspiański Gwido, Sokal p. s.

Jastrzębski Jul., Bełż.

Feuerstein El., Krystynopol l. m.

Kuźmowicz K. l. rew., Uhrymów.

C. Markl Józef, Wareż l. m.

Pordes Sal., Krystynopol.

Blum Zygmunt, Bełż.

W. Eitelberg Br., Sokal w. p.

58. Pow. Stanisławowski.

D. Wolański Kaj., Stanisł. l. p.

Boral Henryk " as. s.

Csessenak Julian " as. s.

Drzewicki Stefan, " as. s.

Galusiński Ant. l. k. ch.

Goldhaber Jak. l. k. ch.

Gasiorowski Leodgard, l. ord.

Zak. karn.

Konkolniak Grze., Stanisł. p. s.

Lachawiec Apol., " "

Ochsenhorn Mojż., " "

Ostafiński Maryan " "

Rosenberg Oskar, " "

Sztencel Bernard " "

Wnękowiec Stanisł. " "

Żukowski Aleks. " "

Krzyształowicz Aug., Halicz l. m.

Moleczkowski Dyon., " l. k.

Bart Leopold, Maryampol l. o.

Blaustein Edw. Stanisławów.

C. Grader Maur., " "

Hoffman Jan " l. sz.

Klaar Szymon " l. k.

Rosenbaum Max., " "

Sternschuss Henr., " "

Szczepkowski Tyt., " l. kar.

W. Pawlikiewicz Jan, " w. p.

Frucht Maurycy, " w. m.

59. Pow. Staromiejski.

D. Balicki Stan., l. p.

Mężyk Jan, Chyrów lek. zakł.

wychow. OO. Jezuitów.

Ożarowski, Stara sól l. m.

C. Obuszkiewicz Stanisł., Stare

miasto l. i wet. m.

Schubert Mikołaj, Chyrów l. k.

60. Pow. Stryjski.

D. Serkowski Bol., Stryj l. p.

Jakobi Lucyan, " "

Jeż Andrzej, " l. m.

Meisels Jul., " "

Ozarkiewicz Eug. " "

Papieski Antoni, " "

Strzechowski Wil., " "

Michalski Wiktor, Skole.

Mironowicz Kor., " l. s.

C. König Iz., Stryj sek. szp.

Rosenberg Nach., Stryj.

Temple Dym., Stryj l. m.

Kräuterblüth Jak., Skole.

W. Smołuchowski Jan, w. p.

61. Pow. Tarnobrzski.

D. Momidłowski Waler., Tarno-

brzeg a. s.

Machalski Leon, Tarnobrzeg

em. lek. pow.

Orzechowski Leonard. " "

Reifer Ad., Tarnobrzeg l. m.

Dumaire Wł., Rozwadów " "

Hochstim Adolf, Rozwadów.

Bakowski Teofil, Baranów.

Ferensiewicz Mich., Radomyśl

l. m.

C. Hellmann Tob., Tarnobrzeg.

W. Zörner Ferd., w. p.

62. Pow. Tarnopolski.

D. Gładyszowski Emil, Tarno-

pol l. p.

Eckhard Józ., Tarnopol p. s.

Frisch Juda, " "

Leiblinger Izyd., " l. m.

Moszkowicz Jak. " "

Ochsenhorn Chaim.

Friedländer Mendel.

Blauer Tewel.

Münzer Maks., " "

Rosenfeld Ad., " p. s. ż.

Swistun Atan., " "

Weissberg Zygm., " "

Zgórski Kazim., " "

Brudziński Ludw., Mikulińce.

Koller Bolesław, " "

Bloch Fr. " "

C. Brauner Izidor, Tarnop. s. sz.

Planer Jakob, " "

Stein Adolf (dentysta).
W. Harasimowicz Stan., w. p.

63. Pow. Tarnowski.

D. Stanko Wojc., Tarnów. l. p.
Glaser Leopold, " "
Józefczyk Tad., " "
Trammer Abrah., " "
Kowalski Henr., " "
Lerner Wilhelm, " "
Metzger Jan, " l. m.
Pilzer Herman, " s. sz.
Pochroń Józef, " l. sk.
Schützer Leon, " l. sz. iz.
Skowronski Wł., " p. s.
Walczyński Józef, " l. m.
Wolfram Adolf, " "
Zbigniewicz Jan, " s. sz.
Kalisz Al., Tuchów l. m.
Machnowski Wacł., Ryglice.
W. Sikorski Narcyz, w. p.

64. Pow. Tłumacki.

D. Litwinowicz Orest, Tłum l. p.
Hovurka Ant., l. f.
Richter Arnold, Tłumacz l. m.
Celiewicz Al., Tyśmienic l. m.
Ebersohn M., Tyśmienica.
Laszkiewicz J., l. o. Niżniów.
C. Philip Herman, Ottynia l. k.

65. Pow. Trembowelski.

D. Jendl Sausenhofen Ignacy,
l. p.
Olpiński Jul., Trembowla.
Glücksmann Natan, Budzanów.
Kummer Leon, Strusów.
Stoklassa Józ., Budz. l. m.
C. Fischer Leon, Trembowla.
Hrazdilek Ed., Strusów.
Neustein Joach., Tremb. l. m.
Rosenstock Ign., Janów.
W. Cielenkiewicz, w. p.

66. Pow. Turczański.

D. Ciepielowski K., Turka l. p.
Friedmann Filip, Botynia l. o.
C. Kelhofer Sal., Turka.
W. Panek Jan, w. p.

67. Pow. Wadowicki.

D. Zawadziński Stanisław, Wadowice l. p.

D. Bukowski August, Wadowice.
Gedl Władysław, " "
Opydo Franciszek, " "
Zborowski Józef, Andrychów.
Żędzianowski Stan., " l. m.
Lewandowski, Tłuczan.
Keller Rajmund, Zator.
Tarchalski Józ., " l. m.
Gęslak Jan, Zebrzydowice l. s.
C. Erychleb Jan, Kalwarya.
Weczerka August, Wadowice.
W. Hryniewiecki Em. " w. p.

68. Pow. Wielicki.

D. Kownacki J., Wieliczka l. p.
Lerner Szymon, " "
Podobiński Ant., " l. m.
Steiner Stan. " l. sal.
Malinowski Kasp., Dobczyce.
Morawiecki Józef, Gdów.
Aronsohn Sam., Podgórze.
Goldberger Izaak, " "
Pancewicz Izidor, Podgórze.
Skakalski Eu., Podgórze l. m.
Świątek Winc., " l. k.
Nawrat Stanisł., Skawina.
W. Sochaniewicz Teofil.

69. Pow. Zaleszczycki.

D. Friedberg Józef, a. s.
Blutreich Izaak, Zaleszczyki.
Sołowski Jan, " p. sz.
Kretz Ber., Tłuste l. m.
Pawlikiewicz J., Uścieczko.
C. Reischer Ignacy, Zaleszczyki
sek. sz. i l. m.
W. Gałek Józ., Zaleszcz. w. p.

70. Pow. Zbarański.

D. Węgrzynowski W., Zbar. a. s.
Baczyński Eust. " "
Berger Michał, Zbaraż l. m.
C. Mantel Maur., " l. sz.
Reisner Wilh., " l. m.
W. Horodnicki Mikołaj w. p.

71. Pow. Złoczów.

D. Zaleski Eust., Złoczów l. p.
Gold Józef, " "
Heyne Bolesław " l. m.
Stein Elias " l. k.
Wysocki Aleks., " p. s.

D. Wójtowicz Edm. Olszanica.
 l. sz. w Nowosiólkach.
 Skórski Marj., Zborów l. m.
 C. Aderschläger Izaak, Biały
 Kamień l. m.
 Hirschhorn F., Jezierna l. m.
 Fuchs Mojż., Olesko l. m.
 Raps Mayer, Pomorzany l. m.
 Tokayer Jak., Pomorzany.
 Bienenwald S., Sasów l. m.
 Tischner Dion, Złoczów s. sz.
 Nagler Maur., " "
 Deutsch Hen., Złoczów l. m.
 Eskreis Markus " s. sz.
 W. Dorożyński T., Złoczów w. p.

72. Pow. Żółkiewski.

D. Krzyształowicz Adam, Żół-
 kiew l. p.
 Drzymalik Sylw., Żółkiew.
 Muszkiet Karol " p. sz.
 Fischer Henryk, Kulików.
 Olejnik Michał, Mosty.
 Radlmesser Karol, Żółkiew.
 C. Bardon Em., Kulików l. m.


C. Elner Sal., Żółkiew s. sz.
 W. Raff Chaskel, Żółkiew w. p.

73. Pow. Żydaczowski.

D. Goldhaber Adolf l. p.
 Ortyński Włodz., Żydaczów.
 Kraetschmar Fel., Drohowyż.
 Kurasiewicz Józ., Rozdół l. s.
 Gozdecki Józ., Żurawno l. m.
 C. Petersil Józef, Rozdół l. m.
 Sakler Elias, Żurawno l. m.
 Wehrn Leon, Mikołajów l. m.
 W. Stupnicki A., Żydaczów w. p.

74. Pow. Żywiecki.

D. Szajna Józ., Żywiec as. s.
 Idziński Wiktor, " l. szp.
 Kulczycki Maryan, "
 Seidler Ant., Żywiec l. sk.
 Czop Zygm., Milówka l. m.
 Gawlik Jan, Sucha l. sk. i kol.
 Niezabitowski Ad., Sucha l. m.
 Janota Rud., Węg. górka.
 Blumenfeld Joa., Zabłocie.
 C. Klein Ad., Raječa l. sk.
 W. Bogdan Grzeg., Żywiec w. p.





ALFABETYCZNY SPIS LEKARZY.

Skrócenia przy końcu nazwisk :

Kr. oznacza **Kraków**.

L. „ **Lwów**.

Numerą odnoszą się do powiatów.

Acker S. 36
Antoniewicz W. 17
Antoniewicz E. 15
Arnold. W. **L.**
Aronsohn S. 68
Aschkenazy Z. **L.**
Auerbach E. **L.**
Auerhahn W. 22

Baczyński E. 70
Balicki S. 59
Bałaban T. **L.**
Bandrowski J. **Kr.**
Barański A. **L.**
Barącz R. **L.**
Barbag H. 47
Bart L. 58
Bartmański F. 3
Barzycki J. 52
Bażant W. 30
Bąkowski T. 61
Beck A. **Kr.**
Bednarski J. 40
Bendel S. 15
Bentkowski Z. 50
Berezowski K. **L.**
Berger M. 70
Berggrün A. 11
Bermann D. 17
Bernacki F. 7
Bernadzikowski S. 7
Berthleff K. **L.**
Bett M. **L.**

Białkowski W. 50
Bibring S. 40
Bielański Z. 3
Bielecki J. 54
Bielewicz F. 18
Biegelmajer A. 53
Bieńczowski A. 15
Bieńkowski W. **L.**
Biesiadecki J. 24
Biesiadzki A. **Kr.**
Billig E. 28
Blaner T. 62
Blatteis J. **Kr.**
Blatteis S. **Kr.**
Blumenfeld H. 43
Blumenfeld J. 74
Blutreich J. 69
Błoch Fr. 62
Błotnicki T. **L.**
Bobek J. 10
Bober J. 2
Bobkiewicz H. **Kr.**
Bogdanik. 1
Bogdański W. **L.**
Bogdański B. 40
Boral H. 58
Borzęcki **Kr.**
Bory J. **L.**
Borysiewicz W. 6
Bossowski Al. **Kr.**
Braun J. **L.**
Braun S. **Kr.**
Braunstein. **Kr.**

Bresiewicz S. 41
Brill K. 24
Broniowski A. 57
Browicz T. **Kr.**
Brudziński L. 62
Bubeniczek F. 13
Bujalski M. 21
Bujniewicz J. 52
Bukowski A. 67
Buszek J. **Kr.**
Buzdygan M. **Kr.**
Bylicki W. **L.**

Cassina F. 46
Celewicz A. 64
Cercha M. **Kr.**
Chadzyński J. **L.**
Chilewski A. 42
Chmielecki J. **Kr.**
Cholewicz F. **Kr.**
Chomin A. **L.**
Ciechański A. 46
Choróbski S. 45
Chramiec A. 43
Chrzaszczewski W.
53
Chwistek Br. 43
Cięglewicz S. 24
Ciepielowski K. 66
Ciuk A. 27
Coghen A. 32
Csessnak J. 58
Cwiklicer L. 15

Czapliński S. **Kr.**
 Czarnik S. **L.**
 Czerkawski J. **L.** (27)
 Czop Z. 74
 Czyżewicz A. **L.**
 Czyżewicz W. 54
 Cybulski N. **Kr.**
 Cymbler W. 14.

Dadlez J. 48
 Damski W. 11
 Danielski J. 19
 Dawid S. 55
 Dawidowicz E. 5
 Dębicki K. **L.**
 Dekański S. **L.**
 Dehm R. 20
 Dembowski M. 35
 Dereniowski B. 39
 Dietzius A. 23
 Długolecki F. 1
 Dobiński W. **L.**
 Dobruchowski A. 3
 Dolnicki C. 47
 Domański S. **Kr.**
 Dorożyński J. 5
 Doskowski J. **Kr.**
 Dreifach I. 53
 Drewiński M. 54
 Drobner E.
 Drobner J. **Kr.**
 Drożdż B. **Kr.**
 Drzewicki S. 58
 Drzymalik S. 72
 Dubanowicz P. **L.**
 Dukiet J. 46
 Duleba. 35
 Dumaire W. 61
 Dura S. 11
 Durst A. **L.**
 Dwernicki S. 29
 Dworzański K. 1
 Dziembowski J. 42
 Dzikowski Z. 45.

Ebers H. **L.**
 Ebersohn M. 64
 Eckhard J. 62
 Edelheit 35
 Ehrlich D. **L.**
 Eichhorn F. **Kr.**
 Elias S. **Kr.**

Elektrowicz E. **L.**
 Elsner H. 52.

Feigel L. **L.**
 Feldmann M. 23
 Feuerstein L. 5
 Ferensiewicz M. 61
 Festenburg E. **L.**
 Feuerstein E. 57
 Feuerstein N. 4
 Feuerstein H. 17
 Fiałkowski L. **L.**
 Fiałkowski N. 52
 Filewicz J. 28
 Filimowski A. **Kr.**
 Filipkiewicz S. **Kr.**
 Finkel H. 36
 Fischer H. 72
 Fleischmann A. 8
 Fleszar J. 33
 Fraenkel J. 3
 Fragner D. **Kr.**
 Frankfurter J.
 Frankowski W. **L.**
 Friedländer M. 62
 Friedberg J. 69
 Friedmann T. 66
 Friedmann H. 17
 Friedwald A. 23
 Frisch Juda 62
 Frisch J. 30
 Frühling M. 18
 Frydmann Z. 22
 Fuchs F. **L.**
 Fuchs L. **L.**

Gabryszewski A. **Kr.**
 Gabryszewski T. 24
 Galant J. 54
 Galusiński A. 58
 Gąsiorek F. 46
 Gąsiorowski L. 58
 Gawalkiewicz L. 42
 Gawlik J. 74
 Gawroński A. 19
 Gertler N. **Kr.**
 Gedl W. 67
 Geślak J. 67
 Glaser L. 63
 Glasgall J. 6
 Gładyszowski E. 62
 Głuchowski F. **L.**

Gluziński A. **Kr.**
 Gluziński L. **L.**
 Glücksmann N. 65
 Glücksmann L. 3
 Głaczyński W. 29
 Głowacki B. **L.**
 Głowiński W. 2
 Gold J. 71
 Goldberger I. 69
 Goldhaber A. 73
 Goldhaber I. 29
 Goldhaber I. 58
 Goldhammer J.
 Gołębiowski K. **L.**
 Gońka A. **L.**
 Górski C. 3
 Gostyński J. **L.**
 Gozdecki J. 73
 Grabscheid M. 46
 Gracka J. 25
 Gross K. **L.**
 Grünhaut B. 65
 Grzybezyk S. 18
 Gumowski F. 44
 Gussmann J. **L.**
 Guttmann L. 38
 Gwiazdomorski J. **Kr.**

Hahn F. 22
 Haim L. **Kr.**
 Halarewicz B. 49
 Halban L. **Kr.**
 Hammerschlag R. 43
 Hand J. 41
 Harajewicz J. **Kr.**
 Harajewicz W. **Kr.**
 Hellmann. **L.**
 Hernich F. 41
 Herz E. 33
 Herzig N. 34
 Heyne B. 71
 Hicner A. 24
 Hirsch H. **Kr.**
 Hirschler M. 10
 Hochstim A. 61
 Hofner O. 17
 Hordyński A. 25
 Hoszard F. **L.**
 Hovurka A. 64
 Hulles J. 29
 Humiecki M. 31
 Hyżycki S. **Kr.**

- Jabłoński J.** 12
Jabłoński S. 52
Jajus M. 57
Jakliński L. 51
Jakobi L. 60
Jakubowski A. 20
Jakubowski M. Kr.
Jalikowski M. 2
Jarosz W. 1
Jana S. L.
Janda F. L.
Janiszewski A. 27
Janota R. 74.
Janowski J. 17
Januszkiewicz J. o.
 44
Januszkiewicz J. s.
 44
Jaremkiewicz M. 35.
Jarocki P. 7
Jarosz W. Kr.
Jasilkowski M. 2
Jasiński W. L.
Jastrzębski A. Kr.
Jastrzębski J. 57
Jastrzębski W. 23
Jaworski W. Kr.
Jaworski B. 29
Jekeles L. L.
Jendl J. 65
Jendl T. L.
Jeż A. 60
Jeż W. Kr.
Jdziński W. 74
Jłowicki M. 33
Jodłowski J. 5
Jordan H. Kr.
Józefczyk T. 63
Junger J. Kr.
Jüngst W. 12
Jurkiewicz K. 17
Jurowicz J. Kr.
Jwański K. 37.

Kaden K. Kr.
Kadyj J. 24
Kadyj H. L.
Kalach F. 6
Kalinowicz M. 5
Kalinowicz 29
Kalisz A. 63
Kapelusz E. 1

Karpiński S. Kr.
Katyński L. 18
Kaufmann M. Kr.
Karmin J.
Keller M. 46
Keller R. 67
Kicki T. L.
Kiebuziński B. 46
Kijas B. 37
Kijas T. 42
Kirschner A. Kr.
Kisielewski J. 7
Klauber A. 53
Klecki K. Kr.
Klein L. 11
Kluczyński Z. 7
Kmietowicz F. 42
Kniaziołucki Z. L.
Kniehyniecki K. 39
Kobryński W. 29
Kobylański A. L.
Kocay A. 31
Koerner E. 10
Kohn M. Kr.
Kolberger 36
Koller B. 62
Kończakowski J. 42
Komorowski B. Kr.
Konarzewski J. 55
Konarzewski J. L.
Koncowicz J. 33
Kondratowicz A. Kr.
Kopff L. Kr.
Konkolniak G. 58
Kopaczyński W. 53
Korczyński E. Kr.
Korczyński L. Kr.
Korman J. L.
Korngrün J. 62
Kornhauser C. Kr.
Kosterkiewicz F. 42
Kosiński F. L.
Kosiński L. Kr.
Kośmiński F. Kr.
Kossak L. L.
Kotłowski S. 16
Kotulecki Tom. Kr.
Kotz Wł. Kr.
Kownacki J. 68
Kowalski H. 63
Kowski K.
Kozierowski E. L.

Kozłowski B. Kr.
Kozłowski S. Kr.
Kozłowski E. 54
Koy S. Kr.
Kozubski L. 42
Kraus H. 52
Kraetschmar F. 73
Kramarzyński M. 14
Kramarzyński K. Kr.
Krasowski S. Kr.
Kretowicz W. 18
Kretz B. 69
Krobicki T. L.
Krokiewicz A. L.
Kropaczek F. 32
Krongold W. Kr.
Kronenberg K. 20
Kroó J. 10
Kruk K. 34
Kruszyński K. 36
Kryński L. Kr.
Krzyształowicz A. 72
Krzyształowicz An.
 58
Krzyształowicz F. Kr.
Krzyżanowski E. 10
Krzyżanowski T. L.
Krzyszkowski E. 54
Krygowski T. L.
Kudas J.
Kucharski P. L.
Kuhn A. L.
Kulezycki M. 74
Kummer L. 65
Kurasiewicz J. 73
Kurowiec J. 26
Kutna S. 46
Kuźmowicz K. 57
Kwaśnicki A. Kr.
Kwiatkiewicz S. L.
Kwieciński M. 1.

Lachawiec A. 58
Lachowicz E. 52
Lachowicz Z. L.
Landau S. L.
Landau A. 45
Langie A. Kr.
Langsam.
Laskiewicz A. 64
Last S. 36
Lateiner E. L.

- Lebedowicz E. 38
 Lechowski W. 17
 Legeżyński W. **L.**
 Lehmann. 42
 Lemer T. 54
 Leiblinger F. 6
 Leiblinger J. 62
 Lenartowicz R. 35
 Lerner S. 68
 Lerner W. 63
 Lewandowski J. 67
 Lic F. 56
 Lic H. 9
 Lippel J. 28
 Loewy A. 41
 Lorentski A. 37
 Löw B. 17
 Lidchower M. 45
 Lityński L. 46
 Lisiński L. 48
 Litwinowicz O. 64
 Lukas A. **L.**
 Lustig S. **Kr.**
 Lustgarten L. **Kr.**
 Lutyński L. 13.

Łazarski J. **Kr.**
 Łepkowski W. **Kr.**
 Łodziński W. 39
 Łopacki L. **L.**
 Łowczowski W. 7
 Łucki J. 1
 Łukasiewicz W. 24
 Łuszczkiewicz J. 57.

Mach S. 33
 Machalski L. 61
 Machnowski W. 63
 Machek E. **L.**
 Maciulski J. 51
 Macudziński W. 24
 Marcisiewicz F. **Kr.**
 Markiewicz H. 53
 Mars A. **Kr.**
 Mączka T. **Kr.**
 Madejski B. **Kr.**
 Madejski W. 6
 Madejski J. 46
 Madurowicz M. **Kr.**
 Mahl J. **L.**
 Majer J. **Kr.**
 Majewski A. **L.**

 Malinowski K. 68
 Małinowski G. **Kr.**
 Maliszewski H. 36
 Mann J. 6
 Mannheim M. 46
 Marynowski J. 1.
 Marynowski M. 23
 Mazurkiewicz D. 32
 Mayer J. 17
 Mayzel T. **Kr.**
 Męciński K. 4
 Meisels J. 60
 Meisels Z. 23
 Mehrer H. **L.**
 Mehrer J. 56
 Meller D. 56
 Mendelsburg H. **Kr.**
 Merezyński E. **L.**
 Merunowicz J. **L.**
 Meth S. 9
 Metzger J. 63
 Meżyk J. 59
 Michałik 31
 Michałik J. 7
 Michalski W. 60
 Mikołajski S. 20
 Mildner J. 12
 Milerowicz J. 8
 Milewski T. **Kr.**
 Millet A. 14
 Mironowicz K. 60
 Moch J. 47
 Mohr D. 42
 Mołczkowski D. 58
 Momidłowski S. **Kr.**
 Momidłowski W. 61
 Morawiecki J. 68
 Morawski S. 24
 Mossing K. **L.**
 Mosler M. 5
 Mossor K. 49
 Moszkowicz J. 62
 Mukowicz E. **L.**
 Murdziński F. **Kr.**
 Muszkiet K. 72
 Münz E. **Kr.**
 Münzer M. 62
 Mydlarski W. 44.

Nacht F. 10
 Najedło F. 55
 Natter W. 24

 Nawrat S. 68
 Neschling L. 16
 Neumann E. 18
 Neusser G. 36
 Nidecki A. 33
 Niesiołowski W. 52
 Niezabitowski A. 74
 Niziołek P. 9
 Nodzyński B. 3
 Nowak J. 16
 Nowak Z. **Kr.**
 Nycz W. 1
 Nycz H. 11

Obaliński A. **Kr.**
 Obtulowicz F. **L.**
 Ochsenhorn M. 58
 Ochsenhorn Ch. 62
 Odrobina J. 34
 Oettinger J. **Kr.**
 Olejnik M. 72
 Olpiński J. 65
 Olszewski B. **Kr.**
 Omeis J. 53
 Opiński J.
 Opolski W. **L.**
 Opydo F. 67
 Orski J. 25
 Orzechowski J. 20
 Orzechowski L. 61
 Orzeł J. 34
 Ortyński W. 73
 Ostafiński M. 58
 Oświecimski S. 3
 Ozarkiewicz E. 60
 Ozimek S. 14
 Ożarowski 59

Paleczny B. **Kr.**
 Palesten H. 21
 Papee J. **L.**
 Papiński A. 61
 Palka K. 7
 Panciewicz J. 68
 Pareński S. **Kr.**
 Paszkowski S. **Kr.**
 Patryn J. 52
 Pawlicki T. 30
 Pawlikiewicz J. 69
 Pawlikowski A. **L.**
 Pelczar Z. **Kr.**
 Penner J. 17

- Peszkowski A. 33
 Peters J. 16
 Piasecki W. Kr.
 Piaskiewicz W. 29
 Piątkowski M. Kr.
 Pięiążek P. Kr.
 Pietrzycki A. 7
 Pilzer H. 63
 Piotrowski E. Kr.
 Piotrowski G. L.
 Piotrowski L.
 Piórko A. 3
 Pisek W, L.
 Plech A. 23
 Pluciński M. 36
 Płochocki T. 49
 Pochroń J. 63
 Podlewski K. L.
 Podłuski M. 16
 Podobniński A. 68
 Pohorecki W. Kr.
 Ponikło S. Kr.
 Pordes M. 38
 Prochaska T. 27.
 Prus J. L.
 Przesmycki J. 18
 Przybylski W. 42
 Przysłowski J. 32
 Puchacki E. Kr.
 Puchalski S. 15

Raczyński J. Kr.
 Radecki P. Kr.
 Radlmesser R. 72
 Rapaport J. L.
 Rapp L. L.
 Reifer A. 61
 Reinhold J. L.
 Reiss K. 32
 Regiec J. Kr.
 Reitzes D. L.
 Richter A. 64
 Richter F. 23
 Richter J. 42
 Rieser 11
 Riwezes F.
 Robel W. 35
 Roicki A. L.
 Rokossowski W. Kr.
 Roller F. 50
 Rościszewski E. Kr.
 Rosenberg A. Kr.
 Rosenberg O. 58
 Rosenblatt E. Kr.
 Rosenfeld A. 62
 Rosenzweig A. Kr.
 Rosenzweig L. L.
 Rosner Al. Kr.
 Rosner An. Kr.
 Rosner Ig. L.
 Rosner J. L.
 Rosner M. 29
 Rosenbusch L. L.
 Rosenblüth E. 12
 Rosenheck S. 29
 Rossberger S. 23
 Roszko A. 21
 Roth A. 3
 Rozłucki M. 36
 Rożański J. L.
 Ruczka S. 46
 Rudnicki K. 14
 Rutkowski Kr.
 Rutowski K. Kr.
 Rydel L. Kr.
 Rydygier L. Kr.

Salay 46
 Sawicki E. L.
 Sawicki S. L.
 Schaitter J. Kr.
 Schaff S. 49
 Schaffer W. 37
 Schapira A. 6
 Schein H. 43
 Schlank M. 1
 Schmeidler L. 23
 Schmerl A. 5
 Schmidt E. L.
 Schmidt F. 21
 Schoeffer F. 46
 Schneck K. 11
 Schneider L. Kr.
 Sehney J. L.
 Schöngut S. Kr.
 Schorsch J. 29
 Schramm H. L.
 Schumann F. K.
 Schützer L. 63
 Schwarz A. Kr.
 Seiborowski K. 34
 Seiborowski W. Kr.
 Segiel E. 52
 Seifmann P. L.
 Seidler A. 74
 Seidner A. 5
 Sędzieliowski F. 50
 Sélzer J. L.
 Senensieb W. Kr.
 Serkowski B. 60
 Siedlecki J. Kr.
 Sielski S. L.
 Sieniewicz M. 52
 Sieradzki A. L.
 Silbermann E.
 Silberstein J.
 Silberstein S. L.
 Singer M. L.
 Skakalski E. 68
 Skalski W. 53
 Skalkowski B. L.
 Skalkowski W. L.
 Skibiński A. 8
 Skobel S. Kr.
 Skomorowski J. 30
 Skórczewski B. Kr.
 Skowroński W. 63
 Skórski M. 71
 Skrzyński S. Kr.
 Sławik K. 42
 Słaczka A. 46
 Sliwiński M. Kr.
 Słosarczyk A. 1
 Słapa W. Kr.
 Smitowski M. L.
 Smolarski Z. 46
 Smorągiewicz K. 43
 Smutny K. L.
 Snieżek L. 9
 Sobolewski F. 6
 Sobolewski K. 36
 Sochanik S. L.
 Sochański J. L.
 Sokołowski H. Kr.
 Sokal M. L.
 Sokal J. 22
 Solecki J. 52
 Sołtysik S. 6
 Spira R. Kr.
 Spitzel J. 39
 Sroczyński F. Kr.
 Stachiewicz T. L.
 Stanowski K. L.
 Starachowicz J. Kr.
 Sternberg J. Kr.
 Stopczanski A. Kr.

- Strojnowski E. **L.**
 Strumiński A. 6
 Steuermark 29
 Stein E. 71
 Steiner S. 68
 Stahlberger T. **L.**
 Stanko W. 63
 Staniszewski W. 37
 Stark J. **L.**
 Steinhaus J. **L.**
 Stokłosiński F.
 Steinkeller H. 11
 Stoeckl A. 12
 Stupnicki W. 27
 Stoklassa J. 65
 Strzechowski W. 60
 Surzycki J. **Kr.**
 Süsskind A. **Kr.**
 Świątek W. 68
 Świątkiewicz M. **L.**
 Switalski L. **Kr.**
 Swiderski B. 55
 Swistun A. 62
 Szafer W. 37
 Szajna J. 74
 Szajnowski W.
 Szewczyk J. **Kr.**
 Szymkiewicz K. **Kr.**
 Szpilmann J. **L.**
 Szymański H. 12
 Szymonowicz W. 8
 Szymonowicz W. **Kr.**
 Stenzel B. 58
 Szyszkowski W. 46
 Sysak G. 29
 Szczepański W. 52
 Szczepański T. 52
 Szostkiewicz S. 28
 Sztembarth C. **L.**
 Szulistawski R. **L.**
 Szuszkiewicz P. **L.**
 Szydłowski Z. **L.**
 Szujnowski M. 5

Tabor B. 42
 Tarchalski J. 67
 Tarnawski A. 30
 Taschmann A. **L.**
 Tataarczuch W. **L.**

 Teichmann L. **Kr.**
 Teitelbaum M. 8
 Teodorowicz T. **L.**
 Terlecki A. 49
 Tislowitz P. **Kr.**
 Tomanek J. **L.**
 Torezyński T. **Kr.**
 Trammer A. 63
 Trybulec F. 46
 Trzaskowski B. 23
 Trzebicki R. **Kr.**
 Turzański G. 23
 Tuszyński F. **Kr.**
 Tyszkiewicz W. **Kr.**
 Tyszkowski L. **L.**

Uchacz B. 39
 Udziela 11
 Uhma Cz. **L.**
 Uranowicz T. 8
 Urech 57
 Ulrich T. 4

Vincenz A.
 Vorzimmer H. 55

Wachholtz J. Kr.
 Wachtel A. **L.**
 Wagner A. **L.**
 Wain J. 32
 Walentowicz A. **Kr.**
 Warzycki B. 37
 Wągrowski K. 13
 Wąlczyński J. 63
 Waligórski A. 47
 Wasylewski T. 49
 Wechsler E. **L.**
 Wehr W. **L.**
 Weigel J. **L.**
 Weiss A. **L.**
 Weissberg Z. 62
 Węgrzynowski W. 70
 Werner K. 56
 Wernicki J. **L.**
 Wiczkowski J. **L.**
 Widmann O. **L.**
 Wienkowski J. 54
 Wiktor J. **L.**
 Wilkosz A. **Kr.**

 Willer A. **L.**
 Wilson R. 22
 Wiszniewski L. **Kr.**
 Witkowski E. 33
 Witoszyński T. 16
 Wnękowicz S. 58
 Wojtkowski J. 55
 Wójtowicz E. 71
 Wolański K. 58
 Wolfram A. 63
 Woszczyński J. **Kr.**
 Wroński B. 18
 Wnrost A. 26
 Wysocki A. 71
 Wyspiański G. 57
 Wyszatycki F. 50

Zadurowicz E. 48
 Zagórski A. 52
 Zakreys F. **L.**
 Zaleski E. 71
 Zaleski K. 54
 Zanietowski J. **Kr.**
 Zaorski B. 6
 Zaremba A. 14
 Zarewicz A. **Kr.**
 Zauderer A. 8
 Zavadil T. **L.**
 Zawadziński S. 67
 Zbigniewicz J. 63
 Zborowski J. 67
 Zduń J. 39
 Zengteller L. 42
 Zennermann W. 52
 Zgórski K. 62
 Zieleniewski M. **Kr.**
 Ziembicki G. **L.**
 Ziemiański L. 46
 Zion O. **L.**
 Zirhofer K. 45
 Zoll J. **Kr.**
 Zrogowski B. 13

Żelazowski W. 51
 Żedzianowski S. 67
 Żukotyński F. 2
 Żukowski A. 58
 Żuławski K. **Kr.**

SPIS CHIRURGÓW.

Ackerbauer S. 23
Aderschlager J. 71
Adler S. 10
Arzt J. 33
Atlas S. 54

Bandl Z. 25
Bardach T. 55
Bardasz D. 6
Bardasz M. 51
Bardon E. 72
Baumöhl N. 16
Becher S. 23
Benda A. 50
Bendel Z. 25
Berger A. 56
Berger E. 55
Berger 29
Bernfeld L. 52
Beschloss M. L.
Biber M. 46
Bienenwald S. 71
Blaustein E. 58
Blum Z. 57
Brand J. 27
Brauner J. 62
Brauner L. 15
Burnatowicz R. 21

Chilf J. 46
Chilf S. L.
Czernek H. 7

Deutsch H. 71
Dobijasz T. 33
Dokupil J. L.

Elner M. 48
Ellner S. 72
Erychleb J. 67
Eskreis M. 71
Feder J. 10
Feuerstein M. 40
Finkelstein M. 26
Fischer L. 65
Freudenthal S. 55
Freysinger J. 34
Fuchs M. 71

Gabel H. L.
Gabel R. 25
Gallasch J. L.
Gasiowski J. L.
Giselt J. 51
Goldscheider J. 49
Grabscheid M. L.
Grader M. 58
Grünfeld J. 6

Hand S. 41
Hand L. 26
Handt J. 2
Heinrich J. L.
Hellman T. 61
Herold J. 48
Herzum J. 52
Hirsch H. 48
Hirschhorn F. 71
Hladij S. 22
Hoffman J. 58
Horak K. 32
Hradilek E. 65

Kelhofer S. 66
Kehlhofer S. 17
Kibitz B. 48
Kibitz N. 48
Kiczales H. 26
Klaar S. 58
Klein D. 74
Kluczycki W. 14
Knopf S. L.
Kohn F. 3
Koller J. 18
König J. 60
Korner W. 38
Kostmann J. 47
Kräuterblüth J. 60
Kreiner E. L.
Kujowski L. 16
Kunz J. 1
Kupka J. 1
Kurzer G. 21
Kurzer L. 58

Landau A. 19
Landes L. 21
Lateiner L. L.
Leider D. 6
Letz S. L.
Lisowski M. L.
Luster H. 53

Madejski E. L.
Margulles E. 22
Mantel M. 70
Mark S. L.
Markiel J. 57

- Metal J. 55
 Minceles L. 5
 Morecki P. 23
 Mosler M. 10

Nagler M. 71
 Neustein J. 65
 Nussbaum M. 6

Obuszkiewicz S. 59
 Ostersetzer A. 13

Petersil J. 73
 Philipp H. 64
 Piotrowski J. 25
 Plahner J. 62
 Pöller H.
 Pomeranz F. 22
 Pomeranz J. 56
 Pordes S. 57
 Probst J. 35.

Raab H. 38
 Rager J. 6
 Raps M. 27
 Raps M. 71
 Rares J. 22
 Reich B. 17
 Reiner J. 52

 Reiss A. 23
 Reiss E. 50
 Reiss L. 53
 Reischer J. 69
 Reisner W. 70
 Röder E. 29
 Rosenbaum L. 6
 Rosenbaum M. 58
 Rosenberg N. 60
 Rosenkranz M. **L.**
 Rosenstock A. 65
 Rosenstock J. 65
 Rosenöhl J. 17
 Roth W. 2
 Rotter A. 12
 Rotter H. 52
 Rudich L. 30

Sakler E. 72
 Salver J. 46
 Schabbus E. 37
 Schenker E. 8
 Scheps J. 19
 Schnitzer P. 46
 Schubert M. 59
 Siebner N. 22
 Siegelbaum J. 27
 Sobelsohn D. 22

 Sochacki F. 2
 Spiegel E. 24
 Stangenhaus J. 54
 Starwer M. 55
 Sternberg B. 2
 Sternberg J. 47
 Sternschuss H. 58
 Stolzenberg K. 50
 Szymonowicz J. **L.**
 Szczepkowski T. 58

Temple D. 60
 Terner H. 29
 Thalheim J. 23
 Tischner D. 71
 Tokayer J. 71
 Trost A. 49.

Urich S. 2.

Weczerka A. 67
 Wehrn L. 73
 Weiss J. **L.**
 Wieselmann M. 3.

Zaleski A. 29
 Zauderer M. 42
 Zawirski K. **L.**
 Zrogowski J. **L.**



OGÓLNE PRZEPISY POCZTOWE.

Należytość za listy zwyczajne w całym państwie austr. do wagi 20 gr. ($\frac{9}{10}$ ł. cł.) jest 5 ct., nad 20 do 250 gr. (15 ł. cł.) 10 ct., listy takie mogą być przy oddaniu opłacone lub nie, a wtenczas za listy niefrankowane do 20 gr. 10 ct., od 20 do 250 gr. 15 ct., listy za mało frankowane podlegają tej samej opłacie, z tą różnicą, że wartość przyklepionych marek odlicza się.

Za listy, które w miejscu doręczane bywają, opłaca się: do 20 gr. 3 ct., od 20 do 250 gr. 6 ct. Za nieopłacone, opłaca odbiorca 6 ct. do 20 gr.; 9 ct. do 250 gr.

Listy kartkowe po 3 ct. dla doręczenia adresatom w miejscu nadania zamieszkałym, jakoteż listy kartkowe po 5 ct., które do wszystkich krajów monarchii austriackiej, Prus i Niemiec przesyłane być mogą.

Karty korespondencyjne po 2 ct. mogą być przesyłane do wszystkich krajów monarchii austriackiej, Prus i Niemiec — karty te można wysłać zagranicę z dolepieniem odpowiedniej należytości. Karty korespondencyjne mogą być rekomendowane jak listy za opłatą 10 ct. za rekomendację, lub przyklepieniem marki 10 ct.

Na listy rekomendowane otrzymuje się receptis. Należytość rekomendacyjna do wszystkich krajów europejskich wynosi 10 ct., zaś 5 ct. w miejscu nadania (loco).

Jeżeli nadawca po upływie pewnego czasu nie otrzymał odpowiedzi, natenczas ma prawo przy urzędzie nadawczym zrobić zapytanie (reklamację) za opłatą 10 ct. Jeżeli zaś był dołączony receptis zwrotny, natenczas reklamacja nie podlega żadnej opłacie; jeżeli pokaże się, że list zaginął, wtenczas ma prawo żądać wynagrodzenia 20 złr., gdy list był do miejsca w obrębie monarchii położonego adresowany, zaś 21 złr., gdy był za granicę wysłany.

Za granicę muszą być pieczętowane jedną lub dwiema pieczętkami, w kraju zaś mogą być tylko zalepiane. Listy rekomendowane do Prus i Niemiec mogą być posyłane na koszt adresata.

Druki. Do państwa Austriackiego, Bośni, Hercegowiny, ks. Lichtenstein oraz Niemiec wynosi opłata: do 50 gr. 2 ct., do 150 gr. 3 ct., do 250 gr. 5 ct., do 500 gr. 10 ct.; do 1 kilogr. 15 ct. Waga nie może przenosić kilogr. (2 fnt. cł.). Niedostatecznie opłaconych druków nie wysyła się, lecz zwrócone są oddawcom.

Listy pilne. Jeżeli oddawca życzy sobie, ażeby list natychmiast po odejściu do miejsca przeznaczenia był doręczonym, winien dopisać na kopercie po lewej stronie u dołu „*doręczyć zaraz przez umyślnego posłańca*“ (expres). Za to dopłaca się 15 ct., jeśli adresat mieszka w miejscu, gdzie się znajduje urząd

pocztowy. Za każde $7\frac{1}{2}$ kilometra (milę) odległości od urzędu pocztowego płaci się posłańcowi 50 ct., zawsze jednak adresat jest odpowiedzialny za uiszczenie przypadającej kwoty. Na kopercie można i godzinę oznaczyć, o której list musi być koniecznie wręczony. — Należność uiszcza się przylepianiem marek odpowiedniej wartości, zaś przy pieniężnych, gotówką. Za doręczenie awiza razem z przesyłką opłata wynosi 30 ct.

Taryfa opłaty listów.

Do	Należność za opłatę				
	Listy		kor. kart.	Druki	
	za każde gr.	ct.		za każde gr.	ct.
Belgii, Bułgarii, Chin (p. Rosyę)	15	10 5		50	3
Danii i Islandyi	"	10 5		50	3
Egiptu	do "	" "		do "	"
Niemiec z Alzacyą i Lotarynią,	do 15	5		do 50	2
Helgoland i Luxemburg . . .				" 250	5
	nad 15	10 2		" 500	10
	— 250			" 1000	15
Francyi z Algierem	15	10 5		50	3
Gibraltar przez Niemcy	15	10 5		50	3
Grecyi i wysp Japońskich, Korfu,					
Cefalonia, Zante	15	10 5		50	3
Wielkiej Brytanii i Irlandyi . .	15	10 5		50	3
Włoch	15	10 5		50	3
Czarnogóry	15	7 4		50	2
Niderlandów	15	10 5		50	3
Norwegii	15	10 5		50	3
Persyi przez Rosyę	"	" "		"	"
Portugalii z Maderą i w. Azorskich	15	10 5		50	3
Rumunii (Mołdawii i Wołoszczyzny)	15	10 5		50	3
Rosyi z Polską	15	10 5		50	3
Stany Zjednocz. Północn. Ameryki	"	" "		"	"
Szwajcaryi	15	10 5		50	3
Serbii (z Węgier)	15	5 4		50	2
(z Austrii)	15	7 3		50	2
Hiszpanii	15	10 5		50	3
Tureyi europ. i azyatyckiej przez					
Tryest, Belgrad, Orsowę . . .	15	10 5		50	3

Listy z pieniędzmi winny być zaopatrzone w kopercie trwałej pięcioma pieczęciami, w urzędowej zaś kopercie dwiema, lub też jeżeli wartość przenosi 500 złr., a waga 250 gramów, przynieść je można na pocztę, ale nie zapieczętowane, aby urzędnik mógł sprawdzić kwotę znajdującą się w nich, wten-

czas jednak portoryum musi być zaraz uiszczone i wynosi 50% więcej, niż zwyczajne.

Gotówkę brzęczącą posyłając, należy obwinać w papier i przypieczętować wewnątrz koperty, aby się nie poruszała.

Opakowanie. Przedmioty małej wartości, którym przyciśnięcie nie szkodzi, nie przepuszczające tłuszczu lub wilgoci, nie przenoszące ciężaru 5 kilogr., na nie wielką odległość pakować można w papier mocny i obwiązać sznurkiem.

Powziątki pocztowe w kraju (Nachnahme). Wolno wysyłać przesyłki do wszystkich w kraju poczt monarchii austr., jakoteż węgierskiej za pobraniem do wysokości 500 zfr.

Przekazy pieniężne (Postanweisungen). Za pośrednictwem urzędów pocztowych można przekazywać wypłaty w kraju do wysokości 500 zfr. w. a.

Przesyłający opłaca porto przyklepieniem marki do 10 zfr. 5 cnt., od 10 do 50 zfr. 10 cnt., do 150 zfr. 20 cnt., od 150 do 300 zfr. 30 cnt., od 300 do 500 zfr. 50 cnt.

Drogą zaś telegraficzną przyjmują i wypłacają przekazy pieniężne i znaczki pocztowe (Postanweisungen) do wysokości 500 zfr. w. a. Przy przesyłkach przekazów drogą telegraficzną opłata pocztowa jest ta sama, co przy przekazach zwykłych, z dodatkiem opłaty depeszy zawisłej od ilości słów.

Przekazy za granicę mogą być przesyłane do całych Niemiec, Szwajcaryi, Bawaryi i Wirtembergu, Bułgarii, Rumunii, Turcji i Egiptu, jako też do Stanów zjednoczonych Ameryki, jak również ze wszystkich tych krajów do Monarchii austr. i węgierskiej. Blankiety są inne jak w kraju. Kwoty mogą być przesyłane do wysokości 200 zfr. albo 400 marek czyli 500 franków.

Zlecenia pocztowe. Za pośrednictwem urzędów pocztowych można ściągać od innych osób drobne wierzytelności do wysokości 500 zfr. Blankietów nabywa się w urzędach pocztowych po cenie $\frac{1}{2}$ centa; a dołączywszy dokument (n. p. weksel, rachunek lub kwit itp., przesyła się w kopercie zapieczętowanej, jako opłacony list polecony pod adresem urzędu pocztowego, gdzie debent mieszka.

W razie uiszczenia kwoty na blankiecie wyrażonej, wydaje poczta adresatowi załączone dokumenta, a pieniądze przesyła wierzycielowi za przekazem, po straceniu zwykłej należności przekazowej.

Zlecenia pocztowe są do Niemiec dozwolone i do Bośni i Hercegowiny, Belgii, Egiptu, Francji, Włoch, Luxemburgu, Nederland, Norwegii, Rumunii, Szwecji, Tunisu i Turcji; w takim razie wierzytelności obliczają się na austriacką monetę wedle kursu wiedeńskiego.

Na jednym blankiecie można najwyżej 5 zleceń naraz wysyłać, ale nie trzeba zapomnieć o dołączeniu dokumentu każdego zlecenia, gdyż w takim razie zlecenie musiałoby być zwrócone bez skutku po upływie dni 14.

PORADNIK TELEGRAFICZNY.

W depeszach europejskich 15, w poza europ. 10 liter stanowi jedno słowo, wyraz więcej liter liczący, liczy się za dwa. Pięć cyfer w europ., 3 cyfry w poza europ. depeszach, stanowią słowo.

Bliższe oznaczenie, w jaki sposób chce oddawca przesłać depeszę, można w sposób skrócony oznaczać, dwie takie zgłoski liczą się za słowo.

Mp. Depesza do rąk własnych adresata.

D. Pilno. Depesza taka ma pierwszeństwo przed innemi; (taksa potrójna).

Rp. Odpowiedź zapłacona. Należytość zależy od ilości żądanej odpowiedzi.

Rpd. Odpowiedź zapłacona pilna. Należytość jak przy depeszy pilnej.

Xp. Posłaniec zapłacony.

Na żądanie nadawcy, można otrzymać receptis za opłatą 5 ct.

Nadawca może zażądać wstrzymania depeszy, lub jeżeli już wysłana, wstrzymać doręczenie tejże, w pierwszym przypadku otrzymuje zwrot opłaty po straceniu 25 ct., w drugim przypadku musi nadać nową depeszę.

Opłata składa się:

- I. W monarchii austro-węg., do ks. Lichtenstein, Bośni, Hercegowiny i do Niemiec za każde słowo 3 ct., opłata musi wynosić najmniej 30 ct., czyli że depesza złożona z mniej niż 10 słów kosztuje tak samo jak 10 słów 30 ct.
- II. Taksa ogólna przy depeszach zagranicznych wynosi 30 ct. a prócz tego za pojedyncze słowo:

Algier i Tunis	13 ct.
Ameryka północna	57 "
" południowa	4 Złr. 45 "
Anglia	13 "
Belgia, Dania i Niderlandy	11 "
Czarnogóra, Niemcy Szwajcarya i Serbia	4 "
Bułgaria	9 "
Egipt	84 "
Francya	8 "
Grecya	22 "
Hiszpania i Turcyja eur.	14 "
Holandya	11 "
Portugalia	17 "
Rumunia	6 "
Rosya i Szwecya	12 "
Włochy	8 "

SKALA STEMPLOWA.

SKALA I.

na weksle.

			Do	złr. et.
nad	75 złr.	"	150	złr. —05
"	150	"	300	" —10
"	300	"	450	" —20
"	450	"	600	" —30
"	600	"	750	" —40
"	750	"	900	" —50
"	900	"	1050	" —60
"	1050	"	1200	" —70
"	1200	"	1350	" —80
"	1350	"	1500	" —90
"	1500	"	3000	" 1—
"	3000	"	4500	" 2—
"	4500	"	6000	" 3—
"	6000	"	7500	" 4—
"	7500	"	9000	" 5—
"	9000	"	10500	" 6—
"	10500	"	12000	" 7—
"	12000	"	13500	" 8—
"		"		" 9—

Od każdych zaś następnych 1500 złr. o 1 złr. więcej, przyczem jednak kwoty poniżej 1500 złr. uważane będą za pełne.

SKALA II.

kwity i dokumenta w sprawach prawnych.

			Do	złr. et.
nad	20 złr.	"	40	złr. —07
"	40	"	60	" —13
"	60	"	100	" —19
"	100	"	200	" —32
"	200	"	300	" —63
"	300	"	400	" —94
"	400	"	800	" 1·25
"	800	"	1200	" 2·50
"	1200	"	1600	" 3·75
"	1600	"	2000	" 5—
"	2000	"	2400	" 6·25
"	2400	"	3200	" 7·50
"	3200	"	4000	" 10—
"	4000	"	4800	" 12·50
"	4800	"	5600	" 15—
"	5600	"	6400	" 17·50
"	6400	"	7200	" 20—
"	7200	"	8000	" 22·50
"		"		" 25—

Nad 8000 złr. od każdych 400 złr. opłaconą być ma należność wraz z nadzwyczajnym dodatkiem po złr. 1 ct. 25, przyczem sumy niżej 400 złr. uważają się jako pełne.

SKALA III.

ugody pożyczkowe, kontrakty służbowe, kwity na wygrane loteryjne.

			Do	złr. et.
nad	10 złr.	"	20	złr. —07
"	20	"	30	" —13
"	30	"	50	" —19
"	50	"	100	" —32
"	100	"	150	" —63
"	150	"	200	" —94
"	200	"	400	" 1·25
"	400	"	600	" 2·50
"	600	"	800	" 3·75
"		"		" 5—

			Do	złr. et.
nad	800 złr.	"	1000	złr. 6·25
"	1000	"	1200	" 7·50
"	1200	"	1600	" 10—
"	1600	"	2000	" 12·50
"	2000	"	2400	" 15—
"	2400	"	2800	" 17·50
"	2800	"	3200	" 20—
"	3200	"	3600	" 22·50
"	3600	"	4000	" 25—

Nad 4000 złr. od każdych 200 złr. opłaconą być ma należność wraz z nadzwyczajnym dodatkiem po 1 złr. 25 ct., przyczem sumy niżej 200 złr. uważają się jako pełne.

Zakład wodoleczniczy „Klemensówka“

Dra W. Piaseckiego

w ZAKOPANEM.

Uroczyste ustronie wśród lasów świerkowych, przeciętych drogą krajową i rzeką Bystrą. Kuchnia wyborna w własnym zarządzie. Łazienki i pokoje kompletne i z komfortem urządzone. Naokoło dworu leczniczego kryte galerie do przechadzek podczas deszczu. Osobna sala gimnastyczna, osobny park spacerowy przy zakładzie, a w nim oddział do chodzenia boso po rosie. W sali gościnnej dobór gazet najpoczytniejszych, fortepiany, bilard i kręgielnia do użytku gości bezpłatnie. Środki lecznicze: hydroterapia, kąpiele słoneczne i parowe, gimnastyka lecznicza z ortopedją i mięsieniem, elektroterapia i hipnoza.



Ceny bardzo umiarkowane.



W DOMU.



Każdej chwili wygodnie i tanio urządzać można naturalne solne kąpiele, wzięwania, rozpylania i t. p.

za pomocą C. K. HALLEŃSKIEGO ŁUGU SOLNEGO

sporządzonego w c. k. kopalniach soli przez Dra Sedlitzky'ego c. k. aptekarza nadwornego w Salzburgu. Wskazania takie, jak dla naturalnych uzdrowisk solnych, szczególnie **choroby narządów brzusznych** u kobiet, **choroby dzieci** (zołży) itd. Od r. 1878 polecają go PP. Profesorowie: **K. i G. Braun, Chrobak, Rokitansky, Späth, Wiederhofer** itd.

Stosują go we wszystkich klinikach i szpitalach.

W Wiedniu: Główny skład u **Henryka Mattoniego i S. Ungara** i we wszystkich aptekach i składach wód mineralnych oraz drogueriach w **Galicji i na Bukowinie.**

1 kg. 60 ct., paczka 5 kg. 2 złr. 70 ct.

W celu uniknienia pomyłek należy zwracać uwagę na firmę „Hallein“ gdyż według chemicznej analizy tylko ten ług solny zawiera **najważniejsze lecznicze sole**, podczas gdy inne t. z. ługi solne są tylko spłóczynami soli i zawierają 99, % soli kuchennej.

Analiza i próby bezpłatnie.

DOM ZDROWIA DLA UMYSŁOWO CHORYCH

Dra Karola Żuławskiego

Docenta Psychiatrii

w Krakowie, ulica Długa L. 82

konc. przez Wys. c. k. Namiestnictwo galic.

Przyjmuje osoby dotknięte chorobą umysłową, alkoholistów, morfinistów, jakoteż osoby dotknięte wszelkiego rodzaju nerwicami, połączonemi ze zбочeniem umysłu.

Leczenie odpowiednio do postępów nauki, hydro- i elektroterapia w miarę potrzeby.

Dom zdrowia urządzony z komfortem, nieustępuje w niczem pierwszorzędnym podobnym Zakładom zagranicznym, położony w najzdrowszej dzielnicy miasta wśród ogrodów. Dla przyjemności chorych jest czytelnia, fortepian, rozmaite gry, wspólna sala jadalna. Staranna opieka, wszelkie wygody i towarzyskie życie wśród rodziny są zapewnione.

Ceny wraz z opieką lekarską i zupełnem utrzymaniem od 5 do 10 Złr. dziennie, stósownie do umowy i wymagania.

Właściciel zakładu przesyła na żądanie program, jakoteż udziela wyjaśnień ustnych lub pisemnych.

Pierwsza krajowa fabryka
opatrunków chirurgicznych
M. L. DOBROWOLSKIEGO

magistra farmacyi,
w Nowej Wsi przy Krakowie,
pocztą Łobzów,
nagrodzona medalem srebrnym na Wystawie krajowej
1887 roku,

premiowana dyplomem honorowym
na Wystawie przyrodniczo-lekarskiej 1888 roku,
zostająca pod kontrolą

Komisji Przemysł. krak. Tow. lekarskiego,
polecona przez

krakowskie Towarzystwo Lekarskie,
wyrabia i sterylizuje wszystkie opatrunki
antyseptyczne, a dostarcza je niżej cen fa-
bryk zagranicznych. Sporządza też niektóre
przetwory farmaceutyczne oraz środki dez-
infekcyjne. jak: **wapno karbolowe, torf**
karbolowy i sublimatowy, a oblicza je
przy hurtownym odbiorze nadzwyczaj tanio.

Cennik przesyła na żądanie.

PP. Aptekarzom, Lekarzom i Zarządcom szpi-
tali przy znacznych stałych odbiorach opa-
trunków robi specjalne niskie oferty.

Konstantego Wiszniewskiego

Aptekarza w Krakowie

Wyroby farmaceutyczno-lekarskie:

Kołaczyki (Tabletki) z wyciągiem **Kaskarowym** polecane przez Towarzystwo lekarskie Krakowskie na wniosek komisji tegoż Towarzystwa pismem z dnia 4 kwietnia 1888 r. L. 308 i odznaczone na wystawach krakowskiej i lwowskiej. Jako lek przeczyszczający odszczególnia się od innych środków zawierających aloes, że nie sprawia bólesci i nie osłabia, a pobudza apetyt.

Zażywać można trzy razy dnia po 1, 2 do 3 jednorazowo.

Następnie: **Krażki sublimatowe** po pół i jednym gramie.

Dalej: **Kołaczyki** z różnych przetworów leczniczych stałych, tak organicznych jakoteż i nieorganicznych, przyrządzone na odpowiednim aparacie, przez silne zgniecenie, bez dodatku jakiejkolwiek materji kleistej. Kołaczyk z powodu gładkiej powierzchni położony na języku i popiwszy wodą, łatwo prześliznie się przez gardło bez doznania wstrętnego niekiedy smaku.

Gotowe zawsze na składzie kołaczyki są różnego ciężaru:

Z Antipiryny, Phenacetyny, Dwuwęglanu sody, Bromku, Sody, Węglanu Lityny, Kwasu salicylowego, Chininy, Chloranu potażu, Węglanu Guajakolu, Pyrofosforanu żelaza i sody burzące, z Peptonem żelaza, Morfiny, Korzenia rzewieniowego, Wyciągu Kruszyny, Korzenia Pięciorniku (Tomentilla), Proszku mięsnego, Proszku Kurelli, Pepsyny, Hemoglobiny, Proszku Dowera, z Senesu Aleksandryjskiego, pozbawionego żywicy przez

wymoczenie w spirytusie, które wyrabiam tak małe, że można i dzieciom podawać.

Następnie **stożki kakaowe** próżne, które mogą być napełnione gliceryną czystą lub też połączone z jodkiem potażu, karbolanem cynku, octanem ołowiu, Ichtyolem, Taliną i t. d.

Również **pręciki kakaowe** bardzo cienkie, do których można dodać Jodoformu lub jakikolwiek przetwór leczniczy.

Także **wina lecznicze**, wyrabiane na Maladze lub winie Lakryma Christi, jako to: wino chinowe, wino żelaziste, wino chinowo-żelaziste, wino rzewieniowe, wino rzewieniowo-chinowe, wino kondurangowe, wino peptonowe, wino pepsynowe, wino pięciornikowe, także wino kaskarowe, nie gorzkie i t. d.

Dalej **Odwaniacz** (Płyn desinfekcyjny) środek do usunięcia wszelkiej woni cuchnącej, a bezwonny.

Trommsdorffa sole-sozjodolowe

(Sole kwasu Dijodparafenolsulfonowego).

Do użycia w miejsce jodoformu, **bezwonne**, łatwo **rozpuszczalne**, **nie trujące**. Łatwe do użycia w każdej postaci: np. jako zasypka jużto szczerej soli Soz. lub z talkiem, w maści z Lanoliną, jako wata lub gaza Sozjodolowa, w postaci pręcików i roztworów w rozmaitem stężeniu, we wodzie, Collodium itp. Wielkiej wartości, do **antisept. opatrunku ran**, w chorobach skóry, nosa, połyku i krtani, w chorobach chronicznych przewodu usznego, w owrzodzeniach gruźliczych krtani, zapaleniach oka, w wiewiörze, chorobach kobiecych. Dobre usługi oddaje też w **zapaleniach stawowych i reumatyzmach**, w chorobach żołądka, cukrzycy i raku.

Opisów naukowych o dotychczasowych znakomitych skutkach udziela bezpłatnie:

H. TROMMSDORFF, Chemische Fabrik in Erfurt.

Skład: Wiedeń, I., Rathausstrasse 2.

C. k. Zakład zdrojowy

Stacya kolei
Muszyna-Krynica:

z Krakowa 8 g.
ze Lwowa 12 „
z Budapesztu 12 „

KRYNICA

W miejscu:
Poczta trzy razy
dziennie,
Telegraf,
Apteka.

(w Galicyi)

najobfitsza szczawa żelazista.

W Karpatach 590 metr. n. p. m. Od stacyi kolejowej godzina drogi bitej, znakomicie utrzymanej.

Srodki lecznicze: klimat podalpejski, kąpiele żelaziste, nader obfite w wolny kwas węglowy, ogrzewane metodą Schwarza.

Kąpiele borowinowe parą ogrzewane.

Kąpiele gazowe z czystego kwasu węglowego.

C. k. Zakład hydropatyczny pod kierunkiem specjalisty Dra K. Ebersa.

Picie wód mineralnych miejscowych i zagranicznych. **Żentyca**, kefir, gimnastyka lecznicza.

Lekarz zdrojowy Dr L. Kopfl cały sezon stale ordynujący. — Nadto 12 lekarzy wolnopraktykujących.

Spacery: bardzo rozległy park szpilkowy, znakomicie utrzymany. Bliższe i dalsze wycieczki w uroczu Karpaty.

Mieszksnia: przeszło 1500 pokoi z komfortem urządzonych, z pościelą kompletną, usługą, dzwonekami elektrycznemi, piecami i t. d.

Kościół katolicki i cerkiew. Wspaniały **Dom zdrojowy**, kilka restauracyj. Kilka pensyonatów prywatnych. Mleczarnie. Cukiernie.

Muzyka zdrojowa, pod kierunkiem A. Wrońskiego od 21 maja. Stały **Teatr**. **Koncerta**. — **Frekwencya** w r. 1893 — 4.600 osób.

Sezon od 15 maja do 30 września.

W maju, czerwcu i wrześniu ceny kąpiel, pomieszkań i potraw w głównej restauracyi niższe.

Rezsyłka wody mineralnej: od kwietnia do listopada, składy we wszystkich większych miastach w kraju i za granicą.

W miesiącu lipcu i sierpniu ubogim żadne ulgi, jak: uwolnienie od taks zdrojowych i t. d., udzielone nie zostaną.

Na żądanie udziela wyjaśnień

c. k. Zarząd zdrojowy w Krynicy.

ŻEGIESTÓW

Zakład zdrojowo-kąpielowy nad Popradem

miejsceowość odślonieta tylko od południa, wyniesiona 486 mtr. nad poziom morza.

Stacya kolei żelaznej, poczta i telegraf w miejscu.

Najsilniejsza szczawa żelazista, kąpiele borowinowe, mineralne, popradowe i hydropatyczne, znakomita górska stacya klimatyczna, mleko, żentyca.

Pora kąpielowa trwa od 20 Maja do końca Września.

Wskazania lecznicze.

Zboczenia w odżywianiu i przemianie pierwiastków, choroby układu nerwowego, dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, narządu moczopłciowego, **choroby kobiece**, przewłoczne zatrucia (Rtecica, alkoholizm, morfinica) przewłoczne choroby zakaźne.

Woda Żegiestowska przyjemna jako napój zastępuje Francensbadską

jest do nabycia we wszystkich składach wód mineralnych i aptekach tak w Galicyi jak i w Królestwie polskim.

Wysyłka rozpoczyna się z dniem 15 Marca i trwa aż do zimy.

Skrzynia zawierająca 40 flaszek kosztuje na dworcu w Żegiestowie 7 Zlr. 50 ct., skrzynia o 20 flaszkach 4 zlr.

Woda Żegiestowska zawiera w 1000 częściach:

Dwuwęglanu litowego	0,0244
„ „ wapniowego	1,5828
„ „ żelazowego	0,0544
Kwasu węglowego istotnie wolnego	2,9661




Wszelkich bliższych wyjaśnień udziela na żądanie *Zarząd Zakładu.*

Notatnik

na rok

1894.

KWARTAŁ I.



STYCZEŃ.

Poniedziałek. **Nowy Rok.**

2. Wtorek.

STYCZEŃ.

3. Środa.

4. Czwartek.

STYCZEŃ.

5. Piątek.

6. Sobota. **Trzech Króli.**

STYCZEŃ.

7. Niedziela.

8. Poniedziałek.

STYCZEŃ.

9. Wtorek.

10. Środa.

STYCZEŃ.

11. Czwartek.

12. Piątek.

STYCZEŃ.

13. Sobota.

14. Niedziela.

STYCZEŃ.

15. Poniedziałek.

16. Wtorek.

STYCZEŃ.

17. Środa.

18. Czwartek.

STYCZEŃ.

19. Piątek.

20. Sobota.

STYCZEŃ.

21. Niedziela.

22. Poniedziałek.

STYCZEŃ.

23. Wtorek.

24. Środa.

STYCZEŃ.

25. Czwartek.

26. Piątek.

STYCZEŃ.

27. Sobota.

28. Niedziela.

STYCZEŃ.

29. Poniedziałek.

30. Wtorek.

LUTY.

1. Czwartek.

2. Piątek. **Oczysz. N. M. P.**

LUTY.

3. Sobota.

4. Niedziela.

LUTY.

5. Poniedziałek.

6. Wtorek.

LUTY.

7. Środa.

8. Czwartek.

LUTY.

9. Piątek.

10. Sobota.

LUTY.

11. Niedziela.

12. Poniedziałek.

LUTY.

13. Wtorek.

14. Środa.

LUTY.

15. Czwartek.

16. Piątek.

LUTY.

17. Sobota.

18. Niedziela.

LUTY.

19. Poniedziałek.

20. Wtorek.

LUTY.

21. Środa.

22. Czwartek.

LUTY.

23. Piątek.

24. Sobota.

LUTY.

25. Niedziela.

26. Poniedziałek.

LUTY.

27. Wtorek.

28. Środa.

MARZEC.

1. Czwartek.

2. Piątek.

MARZEC.

3. Sobota.

4. Niedziela.

MARZEC.

5- Poniedziałek.

6. Wtorek.

MARZEC.

7. Środa.

8. Czwartek.

MARZEC.

9. Piątek.

10. Sobota.

MARZEC.

11. Niedziela.

12. Poniedziałek.

MARZEC.

13. Wtorek.

14. Środa.

MARZEC.

15. Czwartek.

16. Piątek.

MARZEC.

17. Sobota.

18. Niedziela.

MARZEC.

19. Poniedziałek.

20. Wtorek.

MARZEC.

21. Środa.

22. Czwartek.

MARZEC.

23. Piątek.

24. Sobota.

M A R Z E C.

25. Niedziela. Zmartw. P.	26. Poniedziałek. Wielkan.
----------------------------------	-----------------------------------

MARZEC.

27. Wtorek.

28. Środa.

MARZEC.

29. Czwartek.

30. Piątek.

MARZEC.

31. Sobota.

ADRESA.

ADRESA.

Pierwsza krajowa fabryka
opatrunków chirurgicznych
M. L. DOBROWOLSKIEGO

magistra farmacyi,
w Nowej Wsi przy Krakowie,
poczta Łobzów,

nagrodzona medalem srebrnym na Wystawie krajowej
1887 roku,

premiowana dyplomem honorowym
na Wystawie przyrodniczo-lekarskiej 1888 roku,
zostająca pod kontrolą

Komisji Przemysł. krak. Tow. lekarskiego,
polecona przez

krakowskie Towarzystwo Lekarskie,
wyrabia i sterylizuje wszystkie opatrunki
antyseptyczne, a dostarcza je niżej cen fa-
bryk zagranicznych. Sporządza też niektóre
przetwory farmaceutyczne oraz środki dez-
infeekcyjne. jak: **wapno karbolowe, torf**
karbolowy i sublimatowy, a oblicza je
przy hurtownym odbiorze nadzwyczaj tanio.

Cennik przesyła na żądanie.

PP. Aptekarzom, Lekarzom i Zarządcom szpi-
tali przy znacznych stałych odbiorach opa-
trunków robi specjalne nizkie oferty.

Konc. Zakład fabr. wód min. sztucz.

K. RZĄCY i CHMURSKIEGO

W KRAKOWIE,

przyrządza pod kontrolą komisji przemysłowej
Towarzystwa lekarskiego

Wody sztuczne:

Selterska	flaszka	16	ct.
Bilińska	"	15	"
Gieshüblerska	"	10	"
Vichy, Grande-Grille i Celestins			
	flaszka duża	40	ct., mała 25 ct.

Wody lecznicze:

Bromowa mocn. i słabsza,	flaszka	28 i 20	ct.
Jodowa	"	20	"
Litowa	"	15	"
Zelazista (pyrofosforanowo-żelazista)	mocn.		
	i słabsza,	flaszka	25 i 22 ct.
Kwaśna sodowa moc. i słabsza,	flaszka	15	ct.
Hygieniczna sodowa	"	10	"

Przy większych zamówieniach
przyrządza się i inne wody, tudzież Kumys
i limonadę magnezyową.


**Skład win szampańskich
i Koniaku musującego.**

Notatnik

na rok

1894.

KWARTAŁ II.



KWIECIEŃ.

1. Niedziela.

2. Poniedziałek. Zw. N. M. P.

KWIECIEŃ.

3. Wtorek.

4. Środa.

KWIECIEŃ.

5. Czwartek.

6. Piątek.

KWIECIEŃ.

7. Sobota.

8. Niedziela.

KWIECIEŃ.

9. Poniedziałek.

10. Wtorek.

KWIECIEŃ.

11. Środa.

12. Czwartek.

KWIECIEŃ.

13. Piątek.

14. Sobota.

K W I E C I E Ń.

15. Niedziela.

16. Poniedziałek.

K W I E C I E Ń.

17. Wtorek.

18. Środa.

KWIECIEŃ.

19. Czwartek.

20. Piątek.

K W I E C I E Ń.

21. Sobota.

22. Niedziela.

K W I E C I E Ń.

23. Poniedziałek.

24. Wtorek.

K W I E C I E Ń.

25. Środa.

26. Czwartek.

K W I E C I E Ń.

27. Piątek.

28. Sobota.

K W I E C I E Ń.

29. Niedziela.

30. Poniedziałek.

1. Wtorek.

2. Środa.

3. Czwartek. **Wniebow. P.**

4. Piątek.

M A J.

5. Sobota.

6. Niedziela.

M A J.

7. Poniedziałek.

8. Wtorek. **Stanisława b.**

M A J.

9. Środa.

10. Czwartek.

11. Piątek.

12. Sobota.

13. Niedziela. Zesł. D. św.

14. Poniedziałek. Świąt.

15. Wtorek.

16. Środa.

17. Czwartek.

18. Piątek.

19. Sobota.

20. Niedziela.

M A J.

21. Poniedziałek.

22. Wtorek.

23. Środa.

24. Czwartek. **Boże Ciało.**

25. Piątek.

26. Sobota.

27. Niedziela.

28. Poniedziałek.

M A J.

29. Wtorek.

30. Środa.

M A J.

31. Czwartek.

CZERWIEC.

1. Piątek.

2. Sobota.

CZERWIEC.

3. Niedziela.

4. Poniedziałek.

CZERWIEĆ.

5. Wtorek.

6. Środa.

CZERWIEC.

7. Czwartek.

8. Piątek.

CZERWIEC.

9. Sobota.

10. Niedziela.

C Z E R W I E C.

11. Poniedziałek.

12. Wtorek.

CZERWIEC.

13. Środa.

14. Czwartek.

CZERWIEC.

15. Piątek.

16. Sobota.

CZERWIEC.

17 Niedziela.

18. Poniedziałek.

CZERWIEC.

19. Wtorek.

20. Środa.

CZERWIEC.

21. Czwartek.

22. Piątek.

CZERWIEC.

23. Sobota.

24 Niedziela.

CZERWIEC.

25. Poniedziałek.

26. Wtorek.

CZERWIEC.

27. Środa.

28. Czwartek.

CZERWIEC.

29. Piątek. **Piotra i Pawła.**

30. Sobota.

ADRESA.

ADRESA.

CIEPLICE TRENCZYŃSKIE

zakład zdrojowy na górnych Węgrzech

20 minut odległy od stacy Tepla-Trencsén-Teplitz.

Termy siarczano-wapienne ciepłoty 36·6—40·2 Cels. Kąpiele wannowe, basenowe, natryski, inhalacye. Mieszkania od 50 ct. do 3 Zhr. na dobę. Kuchnia francuska. Z Krakowa via Oderberg, Żolna, Tepla-Trencsén-Teplitz 9 godz. drogi. Frekwencya 5600 osób.

Pora zdrojowa od 1 Maja do końca Września.

W maju i wrześniu pensjon 3 Zhr.

Bliższych szczegółów udziela **Dr Filipkiewicz** (zimą w Krakowie, Kolejowa 18).

Prospekty rozsyła bezpłatnie

Dyrekcya kąpielowa.

Szczawnica

w powiecie Nowotarskim w Galicyi.
powszechnie znany Zakład zdrojowo-kąpielowy,
klimatyczny, żętyczny i kefirowy

położony w pięknej górskiej okolicy, w pobliżu Pienin,
otoczony górami, odznaczający się orzeźwiającem po-
wietrzem z 7 źródłami silnej szczawy **sodowo-solnej**
i **sodowo-żelazistej**.

Liczne, niedrogie a porządnie urządzone mie-
szkania zakładowe i w domach prywatnych
właścicieli, około **1000** pokoi, trzy główne
restauracye i kilka drugorzędnych.

Lekarzem zakładowym jest **Dr. Władysław**
Ściborowski, prócz niego kilku lekarzy udziela
chorym rady lekarskiej. **Stała apteka** w miej-
scu; **mleko, żętyca, kefir. Zakład inhalacyjny, so-**
lankowy, tudzież powietrza zawierającego czę-
ści balsamiczne igliwiowe. **Zakład wodoleczni-**
czy Dra Kołaczковского, łazienki z kąpielami
ciepłymi, żelazistymi i borowinowymi, oraz
natryskami letniemi i zimnemi, **kąpiele rzeczne**
w Dunajcu i bliższym Zakładu **Ruskim Potoku.**
Czytelnia czasopism, **wypożyczalnia książek.** **Klub**
szczawnicki kierujący zabawami. **Muzyka kon-**
certowa. Zebrania towarzyskie, koncerty. **Za-**
kład artystyczno-fotograficzny A. Szuberta. **Poczta**
i **telegraf** w miejscu. **Sklepy** wszelkiego ro-
dzaju. **Wycieczki** w uroczę okolice Szczawnicy.
Komunikacya z **Krakowem** i **Lwowem** koleją
żelazną do **Starego Sącza**, z kądem 41 kilome-
trów **wybornym gościńcem** na miejsce.

Pora zdrojowa trwa od 20 Maja do 20 Września.

Zamówienia na mieszkania przyjmuje **Zarząd Zakładu**
zdrojowego przez **Stary Sącz** w **Szczawnicy.**

Zamówienia na wodę mineralną adresować wprost do
Zarządu Zakładu zdrojowego w Szczawnicy.

Dzierżawca Feliks Wiśniewski.

Notatnik

na rok

1894.

KWARTAŁ III.

L I P I E C.

1. Niedziela.

2 Poniedziałek.

LIPIEC.

3. Wtorek.

4. Środa.

LIPIEC.

5. Czwartek.

6. Piątek.

LIPIEC.

7. Sobota.

8. Niedziela.

L I P I E C.

9. Poniedziałek.

10. Wtorek.

LIPIEC.

11. Środa.

12. Czwartek.

LIPIEC.

13. Piątek.

14. Sobota.

LIPIEC.

15. Niedziela.

16. Poniedziałek.

LIPIEC.

17. Wtorek.

18. Środa.

LIPIEC.

19. Czwartek.

20. Piątek.

LIPIEC.

21. Sobota.

22. Niedziela.

L I P I E C.

23. Poniedziałek.

24. Wtorek.

LIPIEC.

25. Środa.

26. Czwartek.

LIPIEC.

27. Piątek.

28. Sobota.

LIPIEC.

29. Niedziela.

30. Poniedziałek.

L I P I E C.

31. Wtorek.

SIERPIEŃ.

1. Środa.

2. Czwartek.

SIERPIEŃ.

3. Piątek.

4. Sobota.

SIERPIEŃ.

5. Niedziela.

6. Poniedziałek.

SIERPIEŃ.

7. Wtorek.

8. Środa.

SIERPIEŃ.

9. Czwartek.

10. Piątek.

SIERPIEŃ.

11. Sobota.

12. Niedziela.

SIERPIEŃ.

13. Poniedziałek.

14. Wtorek.

SIERPIEŃ.

15. Środa. Wniebow. N. M. P.

16. Czwartek.

SIERPIEŃ.

17. Piątek.

18. Sobota.

SIERPIEŃ.

19. Niedziela.

20. Poniedziałek.

SIERPIEŃ.

21. Wtorek.

22. Środa.

SIERPIEŃ.

23. Czwartek.

24. Piątek.

SIERPIEŃ.

25. Sobota.

26. Niedziela.

SIERPIEŃ.

27. Poniedziałek.

28. Wtorek.

SIERPIEŃ.

29. Środa.

30. Czwartek.

SIERPIEŃ.

31. Piątek.

WRZESIEŃ.

1. Sobota.

2. Niedziela.

WRZESIEŃ.

3. Poniedziałek.

4. Wtorek.

WRZESIEŃ.

5. Środa.

6. Czwartek.

WRZESIEŃ.

7. Piątek.

8. Sobota. **Narodz. N. M. P.**

WRZESIEŃ.

9. Niedziela.

10. Poniedziałek.

WRZESIEŃ.

11. Wtorek.

12. Środa.

WRZESIEŃ.

13. Czwartek.

14. Piątek.

WRZESIEŃ.

15. Sobota.

16. Niedziela.

WRZESIEŃ.

17. Poniedziałek.

18. Wtorek.

WRZESIEŃ.

19. Środa.

20. Czwartek.

WRZESIEŃ.

21. Piątek.

22. Sobota.

WRZESIEŃ.

23. Niedziela.

24. Poniedziałek.

WRZESIEŃ.

25. Wtorek.

26. Środa.

WRZESIEŃ.

27. Czwartek.


28. Piątek.

WRZESIEŃ.

29. Sobota.

30. Niedziela.

ADRESA.



Notatnik

na rok

1894.

KWARTAŁ IV.

PAŹDZIERNIK.

1. Poniedziałek.

2. Wtorek.

PAŹDZIERNIK.

3. Środa.

4. Czwartek.

PAŹDZIERNIK.

5. Piątek.

6. Sobota.

PAŹDZIERNIK.

7. Niedziela.

8. Poniedziałek.

PAŹDZIERNIK.

9. Wtorek.

10. Środa.

PAŹDZIERNIK.

11. Czwartek.

12. Piątek.

PAŹDZIERNIK.

13. Sobota.

14. Niedziela.

PAŹDZIERNIK.

15. Poniedziałek.

16. Wtorek.

PAŹDZIERNIK.

17. Środa.

18. Czwartek.

PAŹDZIERNIK.

19. Piątek.

20. Sobota.

PAŹDZIERNIK.

21. Niedziela.

22. Poniedziałek.

PAŹDZIERNIK.

23. Wtorek.

24. Środa.

PAŹDZIERNIK.

25. Czwartek.

26. Piątek.

PAŹDZIERNIK.

27. Sobota.

28. Niedziela.

PAŹDZIERNIK.

29. Poniedziałek.

30. Wtorek.

PAŹDZIERNIK.

31. Środa.

LISTOPAD.

1. Czwartek. **Wszyst. Św.**

2. Piątek.

LISTOPAD.

3. Sobota.

4. Niedziela.

LISTOPAD.

5. Poniedziałek.

6. Wtorek.

LISTOPAD.

7. Środa.

8. Czwartek.

LISTOPAD.

9. Piątek.

10. Sobota.

LISTOPAD.

11. Niedziela.

12. Poniedziałek.

LISTOPAD.

13. Wtorek.

14. Środa.

LISTOPAD.

15. Czwartek.

16. Piątek.

LISTOPAD.

17. Sobota.

18. Niedziela.

LISTOPAD.

19. Poniedziałek.

20. Wtorek.

LISTOPAD.

21. Środa.

22. Czwartek.

LISTOPAD.

23. Piątek.

24. Sobota.

LISTOPAD.

25. Niedziela.

26. Poniedziałek.

LISTOPAD.

27. Wtorek.

28. Środa.

LISTOPAD.

29. Czwartek.

30. Piątek.

GRUDZIEŃ.

1. Sobota.

2. Niedziela.

GRUDZIEŃ.

3. Poniedziałek.

4. Wtorek.

GRUDZIEŃ.

5. Środa.

6. Czwartek.

GRUDZIEŃ.

7. Piątek.

8. Sobota. **N. Pocz. N. M. P.**

GRUDZIEŃ.

9. Niedziela.

10. Poniedziałek.

GRUDZIEŃ.

11. Wtorek.

12. Środa.

GRUDZIEŃ.

13. Czwartek.

14. Piątek.

GRUDZIEŃ.

15. Sobota.

16. Niedziela.

GRUDZIEŃ.

17. Poniedziałek.

18. Wtorek.

GRUDZIEŃ.

19. Środa.

20 Czwartek.

GRUDZIEŃ.

21. Piątek.

22. Sobota.

GRUDZIEŃ.

23. Niedziela.

24. Poniedziałek.

GRUDZIEŃ.

25. Wtorek. Boże Narodz.	26. Środa. Św. Szczepana.
--	---

GRUDZIEŃ.

27. Czwartek.

28. Piątek.

GRUDZIEŃ.

29. Sobota.

30. Niedziela.

GRUDZIEŃ.

31. Poniedziałek.

ADRESA.



Ludwik Knapiński

w Krakowie

Rynek Nr. 44. (Linia A — B).

PIERWSZA KRAJOWA FABRYKA

narzędzi chirurgicznych,

bandaży,

przyrządów ortopedycznych.

Odznaczona wielkim medalem srebrnym

na WYSTAWIE LEKARSKIEJ w KRAKOWIE

w r. 1891.

Posiada największy aparat do niklowania.

Przyjmuje wszelkiego rodzaju narzędzia ostre i tępe: do ostrzenia, niklowania i przerabiania w oprawy metalowe.

Podejmuje się najdokładniejszego wykonania nowych narzędzi, według rysunków lub wzorów.

Wszelkie miejscowe i zamiejscowe zamówienia, reparacye, uskutecznia po cenach umiarkowanych, w jak najkrótszym czasie, ręcząc za dobroć i dokładność wykonania.

Andrzej
c. i k. dostawca
nadworny



Saxlehner
właściciel
źródła słynnego

„Hunyadi János.”

Saxlehner'a

wody gorzkiej

według orzeczenia powag lekarskich:

Szybkie, pewne, łagodne działanie.

Przy dłuższem stosowaniu łatwo się znosi.

Jednostajny i trwały skutek.

Mała dawka. — Łagodny smak.

Skarb ten natury rozbierany i uznany
przez **Liebig'a, Bunsena, Fresenius'a**

jest jedynym w swoim rodzaju.

W celu uchronienia się przed naśladownictwem

uprasza się zwolenników

naturalnej wody „Hunyadi Janos”

zwrócić uwagę,

czy na etykiecie i korku jest firma:

„Andreas Saxlehner.”